




با درخت دانش، گام به گام پیشرفت خود را ارزیابی کنید.

گام اول: میزان تسلط خود را با رنگ مشخص کنید.
آبی: خیلی خوب
سبز: متوسط
زرد: مسلط نیستیم.
گام‌های بعدی: اگر در گام اول به آن مبحث مسلط نیستید و دانش خود را در حد رنگ زرد ارزیابی کردید، در نوبت‌های بعدی مطالعه و تمرین، در صورتی که پیشرفت کردید می‌توانید خانه‌های سبز یا آبی را رنگ کنید.

کار، انرژی و توان

در این فصل ۱۷۷ تست از مبحث کار، انرژی و توان آورده‌ایم. یعنی برای هر تست کنکور ۱۷۷ تست را تمرین خواهید کرد.



● انرژی جنبشی:

انرژی جنبشی جسمی به جرم m که با تندی v در حال حرکت باشد از رابطه زیر به دست می آید.

$$K = \frac{1}{2}mv^2$$

$$\begin{cases} K : (J) & \text{انرژی جنبشی بر حسب ژول} \\ m : (kg) & \text{جرم بر حسب کیلوگرم} \\ v : (\frac{m}{s}) & \text{تندی بر حسب متر بر ثانیه} \end{cases}$$

◀ **نکته:** اگر تندی جسم بر حسب کیلومتر بر ساعت ($\frac{km}{h}$) داده شود برای تبدیل آن به متر بر ثانیه ($\frac{m}{s}$) کافیست آن را بر $\frac{3}{6}$ تقسیم کنیم.


◀ **نکته:** یکای انرژی جنبشی و هر نوع دیگری از انرژی، $kg \cdot \frac{m^2}{s^2}$ است که به افتخار جیمز ژول، فیزیکدان انگلیسی، **ژول (J)** نامیده می شود.

◀ **نکته:** برای مقایسه انرژی جنبشی دو جسم با جرمها و تندیهای متفاوت داریم:

$$K = \frac{1}{2}mv^2 \Rightarrow \frac{K_2}{K_1} = \frac{m_2}{m_1} \times (\frac{v_2}{v_1})^2$$

◀ **نکته:** انرژی جنبشی **کمیتی نردهای و همواره مثبت** است. این کمیت تنها به جرم و تندی جسم بستگی دارد و به جهت حرکت جسم وابسته نیست.

● **مثال:** انرژی جنبشی دو جسم در شکل زیر با هم برابرند:



$$K_1 = \frac{1}{2}mv^2$$

$$K_2 = \frac{1}{2}mv^2$$

انرژی جنبشی

۱. شهاب سنگی به جرم $4 \times 10^6 \text{ kg}$ و تندی $15 \frac{km}{s}$ وارد جو زمین می شود، اگر این شهاب سنگ تقریباً با همین تندی به زمین برخورد کند، انرژی جنبشی آن چند برابر انرژی آزاد شده به وسیله یک تن TNT است؟ (انرژی آزاد شده هر تن TNT برابر 4×10^9 ژول است).

(مشابه پرسش و مسئله ۲ کتاب درسی)

۱۰۰۰۰۰ (۴)


۹۳۷۵۰ (۳)

۸۳۷۵۰ (۲)

۴۵۰۰۰۰ (۱)

۲. جرم خودرویی به همراه راننده اش 800 کیلوگرم است. مطابق شکل تندی خودرو در دو نقطه از مسیری که روی آن در حال حرکت است نشان داده شده است. تغییرات انرژی جنبشی خودرو بر حسب کیلوژول بین این دو نقطه کدام است؟

(مشابه خود را بیازمایید ۲-۲ کتاب درسی)



$$v_1 = 72 \frac{km}{h}$$

$$v_2 = 108 \frac{km}{h}$$

۴۰۰ (۱)

۴۰۰۰۰۰ (۲)

۲۰۰ (۳)

۲۰۰۰۰۰ (۴)


۳. نسبت انرژی جنبشی جسمی به جرم m که با تندی V در حرکت است، به انرژی جنبشی جسم دیگری که جرم آن $2m$ و تندی اش $\frac{1}{2}V$ می باشد، چقدر است؟
(سراسری تجربی ۷۹)

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ ۱ ④ ۲

۴. هرگاه انرژی جنبشی جسمی به جرم m که با تندی V در حرکت است، با انرژی جنبشی جسم دیگری به جرم $2m$ که با تندی V' در حال حرکت است برابر باشد، در این صورت $\frac{V'}{V}$ برابر است با:
(سراسری تجربی ۶۴)

- ① $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ② $\sqrt{2}$ ③ ۱ ④ ۲

۵. در کدام گزینه مقایسه بین انرژی جنبشی جسم های زیر به درستی انجام گرفته است؟
(مشابه پرسش ۲-۱ کتاب درسی)



- ① $k_3 > k_2 > k_1 > k_4$
② $k_2 = k_3 > k_1 > k_4$
③ $k_1 > k_2 = k_3 > k_4$
④ $k_2 > k_3 > k_1 > k_4$

۶. انرژی جنبشی گلوله ای $4J$ و تندی آن $4m/s$ است. تندی آن را به چند متر بر ثانیه برسانیم تا انرژی جنبشی آن $5J$ شود؟
(سراسری تجربی ۸۴)

- ① ۵ ② ۸ ③ $2\sqrt{5}$ ④ $5\sqrt{2}$

۷. اتومبیلی که با تندی $72km/h$ در حرکت است، تقریباً چه تندی ای بر حسب متر بر ثانیه باید داشته باشد، تا انرژی جنبشی آن دو برابر شود؟
(سراسری تجربی ۷۲)


- ① ۲۵ ② ۲۸ ③ ۳۲ ④ ۴۰

۸. جرم جسمی $2kg$ و تندی آن در یک مسیر مستقیم V_1 است. اگر تندی آن به اندازه $8m/s$ افزایش یابد، انرژی جنبشی آن ۴ برابر می شود. V_1 چند متر بر ثانیه است؟
(سراسری ریاضی ۸۳)

- ① ۸ ② ۱۶ ③ ۲۴ ④ ۳۲

۹. ماهواره ای به جرم $20kg$ و با تندی ثابت $3 \frac{km}{s}$ مطابق شکل به دور زمین می چرخد. انرژی جنبشی ماهواره بر حسب مگاژول

(مشابه تمرین ۲-۱ کتاب درسی)



- کدام است؟
① ۹۰
② ۹
③ 9×10^7
④ ۴۵

۱۰. اتومبیلی با تندی $90km/h$ در حال حرکت است. تندی اتومبیل تقریباً چند متر بر ثانیه افزایش یابد، تا انرژی جنبشی آن ۲ برابر شود؟
(خارج از کشور تجربی ۹۰)

- ① ۱۰ ② ۲۵ ③ ۳۵ ④ ۵۰

۱۱. جسمی در مسیر مستقیم با تندی V در حال حرکت است. اگر تندی این جسم $5 \frac{m}{s}$ افزایش یابد، انرژی جنبشی آن ۴۴ درصد

(خارج از کشور تجربی ۹۳)

- افزایش می یابد. V چند متر بر ثانیه است؟
① ۵ ② ۱۰ ③ ۲۰ ④ ۲۵

۱۲. اگر تندی اتومبیلی ۲۰ درصد افزایش یابد، انرژی جنبشی آن چند درصد افزایش می یابد؟ (آزمون کانون - چهارم ریاضی - ۲۲ اسفند ۹۳)

- ① ۲۰ ② ۴۰ ③ ۴۴ ④ ۱۴۴

۱۳. پدری با پسرش در حال مسابقه دادن است. انرژی جنبشی پدر نصف انرژی جنبشی پسر و جرم وی، دو برابر جرم پسرش است.

اگر پدر تندی اش را به اندازه $1 \frac{m}{s}$ افزایش دهد، انرژی جنبشی اش با انرژی جنبشی پسرش یکی می شود. تندی اولیه پدر تقریباً

(مکمل پرسش ۲-۱ کتاب درسی)

چند $\frac{m}{s}$ بوده است؟

- ① ۲ ② $2/4$ ③ $4/8$ ④ $3/6$

۱۴. گلوله‌ای به جرم ۴۲ گرم با تندی $500 \frac{m}{s}$ به تنه درختی برخورد کرده و با تندی $100 \frac{m}{s}$ از آن خارج شده است. اگر $0/1$ انرژی جنبشی از دست رفته، گلوله را گرم کند، تقریباً چند کالری گرما به گلوله رسیده است؟ (هر کالری گرما برابر $4/2$ ژول است).

(آزمون کانون- سوم تجربی- ۹۱)

۱۲۰ (۴)

۵۰۴ (۳)

۲۱۱۲ (۲)

۵۰۴۰ (۱)

۱۵. در شکل مقابل، نمودار انرژی جنبشی جسمی به جرم $2/5$ کیلوگرم بر حسب تندی آن نشان داده شده است. v_1 چند متر بر

(آزمون کانون- چهارم تجربی- ۲۸ فروردین ۹۴)


ثانیه است؟

۲ (۱)

۶ (۲)


۱۰ (۳)

۱۶ (۴)




● کار انجام شده توسط نیروی ثابت F :

الف) حالتی که نیرو (F) و جابه‌جایی (d) در یک جهت باشند:



$$W_F = Fd$$

W : کار انجام شده بر حسب ژول (J)
 F : اندازه‌ی نیرو بر حسب نیوتن (N)
 d : اندازه‌ی جابه‌جایی بر حسب متر (m)




$$W_F = Fd$$

◀ **نکته:** کار یک کمیت نرده‌ای (عددی) است و طبق تعریف یکای آن، یک ژول، برابر است با یک نیوتن در متر $1J = 1N.m$
ب) حالتی که نیرو (F) و جابه‌جایی (d) با هم زاویه‌ی θ می‌سازند.

◀ یادآوری از تجزیه بردار:

اگر R_x و R_y مؤلفه‌های بردار $\vec{R}$ روی محورهای x و y و $\vec{i}$ و $\vec{j}$ بردارهای یکه باشند، آن‌گاه داریم:



$$\vec{R} = R_x \vec{i} + R_y \vec{j}$$


از طرفی با توجه به روابطی که برای نسبت‌های مثلثی داریم، می‌توان نوشت:

$$\cos \theta = \frac{\text{ضلع مجاور}}{\text{وتر}} = \frac{R_x}{R} \Rightarrow R_x = R \cos \theta$$

$$\sin \theta = \frac{\text{ضلع مقابل}}{\text{وتر}} = \frac{R_y}{R} \Rightarrow R_y = R \sin \theta$$

بدین ترتیب بردار $\vec{R}$ بر حسب مؤلفه‌های آن و بردارهای یکه $\vec{i}$ و $\vec{j}$ به صورت زیر است:

$$\vec{R} = R \cos \theta \vec{i} + R \sin \theta \vec{j}$$



مؤلفه عمودی نیرو ($F_y = F \sin \theta$) بر جابه‌جایی عمود است و کار روی جسم انجام نمی‌دهد بنابراین کار انجام شده روی جسم تنها ناشی از مؤلفه‌ای از نیرو است که با جابه‌جایی موازی است ($F \cos \theta$) بنابراین کاری که نیروی ثابت $\vec{F}$ به‌ازای جابه‌جایی $\vec{d}$ روی جسم انجام می‌دهد از رابطه‌ی زیر به دست می‌آید.

$$W_F = F \cos \theta d$$

◀ **نکته:** اگر نیرو بر راستای جابه‌جایی جسم عمود باشد ($\theta = 90^\circ \Rightarrow \cos \theta = 0$)، کار انجام شده توسط نیرو برابر صفر است.

$$W = F d \cos \theta \xrightarrow{\theta=90^\circ, \cos \theta=0} W = 0$$


◀ **نکته:** اگر $0^\circ \leq \theta < 90^\circ$ باشد، $\cos \theta > 0$ بوده و کار انجام شده توسط نیرو مثبت است.

◀ **نکته:** اگر $90^\circ < \theta \leq 180^\circ$ باشد، $\cos \theta < 0$ بوده و کار انجام شده توسط نیرو منفی است.

در زیر به بررسی کار برخی از نیروهای ثابت خاص می‌پردازیم:


● کار نیروی عمودی سطح (W_{F_N}):

هنگامی که یک جسم روی سطح افقی و یا یک سطح شیب‌دار حرکت می‌کند با توجه به این‌که نیروی عکس‌العمل عمودی سطح (F_N) بر سطح عمود است می‌توان گفت زاویه بین این نیرو و جابه‌جایی $\theta = 90^\circ$ بوده و بنابراین کار آن صفر است.



● کار نیروی اصطکاک (W_{f_k}):


هنگامی که یک جسم روی یک سطح افقی و یا یک سطح شیب‌دار دارای اصطکاک حرکت می‌کند همواره نیروی اصطکاک در خلاف جهت حرکت جسم بر آن وارد می‌شود بنابراین:



◀ **نکته:** معمولاً کاری که نیروی اصطکاک انجام می‌دهد به صورت گرما تولید می‌شود و مقدار این گرما برابر قدرمطلق کار نیروی اصطکاک است.

● کار نیروی عکس‌العمل سطح (W_R):

مطابق شکل نیروی عکس‌العمل سطح (R) دارای دو مؤلفه‌ی F_N و f_k است، بنابراین داریم:



$$W_R = W_{F_N} + W_{f_k}$$

$$\begin{cases} W_{F_N} = 0 \\ W_{f_k} = -f_k d \end{cases} \Rightarrow W_R = -f_k d$$

بنابراین کار نیروی عکس‌العمل سطح همواره با کار نیروی اصطکاک برابر است.

$$W_R = W_{f_k} = -f_k d$$

تذکره: این رابطه برای سطح شیب‌دار نیز صادق است. یعنی داریم:

کارانجام شده توسط نیروی ثابت

۱۶. کار چه نوع کمیتی است و یکای آن در SI کدام است؟ (آزاد ریاضی ۸۴ خارج از کشور)

۱ برداری - N.m

۲ نرده‌ای - N.m

۳ نرده‌ای - $\frac{N}{m}$

۴ برداری - $\frac{N}{m}$

۱۷. یک قایق به جرم 500 kg روی یک دریاچه بدون اصطکاک ساکن است. در لحظه‌ای که بادی ناگهانی با نیروی ثابت $\vec{F}$ به قایق

شتابی به بزرگی $40 \frac{m}{s}$ می‌دهد، این قایق در جهت نیرو به اندازه 8 m جابه‌جا می‌شود. کار انجام شده توسط نیروی $\vec{F}$ چند ژول است؟

(مسئله ۱۳ کتاب درسی)

۱ ۱۶۰۰۰۰

۲ ۱۶۰۰۰

۳ ۱۶۰۰۰۰

۴ ۱۶۰۰

۱۸. برای کشیدن جعبه‌ای روی سطح افقی 40 نیوتن نیرو لازم است. کار لازم برای 80 سانتی‌متر جابه‌جایی جسم چند ژول است؟ (سراسری ریاضی ۷۴)

۱ ۳۲

۲ ۵۰

۳ ۳۲۰

۴ ۵۰۰

۱۹. جسمی بر روی یک سطح افقی تحت اثر نیروی F با تندی ثابت 4 m/s حرکت می‌کند. اگر نیروی اصطکاک جنبشی 200 N باشد، کار نیروی F در هر دقیقه، چند کیلو ژول است؟ (سراسری تجربی ۷۱)

۱ ۰/۸

۲ ۳

۳ ۴۸

۴ ۴۸۰

۲۰. در شکل مقابل نیروی ثابت F در راستای قائم به یک جسم 2 کیلوگرمی وارد می‌شود. اندازه‌ی (قدر مطلق) کار این نیرو در ثانیه‌های متوالی یک بازه‌ی زمانی معین ...


(سراسری ریاضی ۸۳)

۱ افزایش می‌یابد.

۲ کاهش می‌یابد.


۳ ابتدا کاهش، سپس افزایش می‌یابد.

۴ بسته به شرایط، هر کدام ممکن است درست باشد.



۲۱. در شکل داده شده، نیروی $F = 6 \text{ N}$ تحت زاویه‌ی 60° به جسم وارد می‌شود، کار نیروی F در 10 متر جابه‌جایی چند ژول است؟ (آزاد تجربی غیرپزشکی ۹۰)

(آزاد تجربی غیرپزشکی ۹۰)



۱ $30\sqrt{3}$


۲ ۶۰

۳ $60\sqrt{3}$

۴ ۳۰

۲۲. در شکل زیر، نیروی $F = 4 \text{ N}$ وزنه‌ی M را روی سطح افقی در هر ثانیه 2 متر جابه‌جا می‌کند، کار این نیرو در مدت 10 ثانیه برابر چند ژول است؟ (آزاد ریاضی بعدازظهر ۸۲)

(آزاد ریاضی بعدازظهر ۸۲)



۱ ۴


۲ $4\sqrt{3}$

۳ ۴۰

۴ $40\sqrt{3}$

۲۳. مطابق شکل زیر، در صفحه‌ی xOy ، نیروی ثابت $F = 10\text{ N}$ به جسمی اثر می‌کند و آن را به‌اندازه‌ی $d = 20\text{ m}$ جابه‌جا می‌کند.

(آزمون کانون- دوم دبیرستان- ۲۱ بهمن ۹۰)



کار نیروی F طی این جابه‌جایی چند ژول است؟

۱) ۲۰۰

۲) $100\sqrt{2}$

۳) ۱۰۰

۴) $100\sqrt{3}$

۲۴. بر جسم ساکنی تنها دو نیروی عمود بر هم $F_1 = 4\text{ N}$ و $F_2 = 2\text{ N}$ وارد می‌شود. پس از 10 متر جابه‌جایی جسم، کار نیروی F_1

(آزمون کانون- دوم دبیرستان- ۲۵ بهمن ۹۲)

چند برابر کار نیروی F_2 است؟

۱) ۲

۲) ۳

۳) ۶

۴) ۴

۲۵. جسمی به جرم 2 kg روی سطح افقی بر حالت سکون قرار دارد. نیروی ثابت $\vec{F} = 15\vec{i} + 20\vec{j}$ (در SI) بر جسم وارد می‌شود و جسم بر روی محور x ، 10 متر جابه‌جا می‌شود. کار نیروی F در این جابه‌جایی چند ژول است؟ (سراسری ریاضی ۹۳ خارج از کشور)

۱) ۲۵۰


۲) ۲۰۰

۳) ۹۰

۴) ۱۵۰

۲۶. اگر جسمی به جرم M تحت اثر نیروی ثابت $\vec{F}$ از نقطه‌ی A تا B در مسیرهای شکل روبه‌رو جابه‌جا شود، کار انجام شده

به‌وسیله این نیرو:



۱) در مسیر (۲) کم‌ترین مقدار را دارد.

۲) در مسیر (۱) کم‌ترین مقدار را دارد.

۳) در هر سه مسیر یکسان است.

۴) در مسیر (۳) کم‌ترین مقدار را دارد.

۲۷. جسمی به جرم 500 g ، روی یک سطح افقی به‌وسیله‌ی نیروی F که تحت زاویه‌ی 37° درجه بر جسم اثر می‌کند، به‌اندازه‌ی 10

متر با تندی ثابت تغییر مکان می‌دهد. کار انجام شده توسط نیروی عمودی سطح چند ژول است؟ ($g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$)

(سراسری ریاضی ۷۴ با اندکی تغییر)

۱) ۱/۲۵

۲) ۲/۵

۳) ۱۲/۵

۴) صفر

۲۸. جسمی به جرم 5 کیلوگرم به‌اندازه‌ی 2 متر روی سطح افقی جابه‌جا می‌شود. اگر نیروی اصطکاک در مقابل حرکت 10 نیوتون

باشد، کار نیروی اصطکاک بر حسب ژول برابر است با: ($g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$)

(سراسری تجربی ۷۴ با اندکی تغییر)

۱) -۲۰

۲) ۲۰


۳) ۱۰

۴) -۱۰

۲۹. در شکل روبه‌رو وزنه‌ی M با تندی ثابت روی سطح افقی جابه‌جا می‌شود، کار نیروی اصطکاک در هر متر جابه‌جایی چند ژول

(آزاد پزشکی ۸۱)

است؟ ($\sin 37^\circ = 0.6$)



۱) -۶/۴

۲) -۴/۸

۳) ۶/۴

۴) ۴/۸

۳۰. صندوقی به جرم 50 kg با تندی ثابت $1 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ توسط یک نیروی افقی روی کف اتاق کشیده می‌شود. اگر نیروی اصطکاک در مقابل

حرکت 200 نیوتن باشد، مقدار گرمایی که در هر متر جابه‌جایی جسم در اثر اصطکاک تولید می‌شود چند ژول است؟

(فرض می‌کنیم کار نیروی اصطکاک تماماً به گرما تبدیل می‌شود.) ($g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$)

(مکمل مثال ۲-۲ کتاب درسی)

۱) ۲۰


۲) ۲۰۰

۳) ۱۰

۴) ۱۰۰

۳۱. در مجموعه مقابل، بسته از حال سکون شروع به حرکت می‌کند. اگر نیروی اصطکاک در طول مسیر برابر 12 N باشد، کار انجام

شده توسط نیروی عکس‌العمل سطح در طول 15 متر جابه‌جایی جسم چند ژول است؟ (سراسری ریاضی ۸۱ خارج از کشور با اندکی تغییر)



۱) 120

۲) -120

۳) -180

۴) صفر

۳۲. جسمی به وزن W از بالای سطح شیب‌دار به طول L که با افق زاویه‌ی θ می‌سازد به پایین می‌لغزد. اگر سطح بدون اصطکاک

باشد، کار نیروی عکس‌العمل سطح شیب‌دار در این جابه‌جایی برابر با کدام یک از مقادیر زیر خواهد بود؟ (مکمل مثال ۲-۵ کتاب درسی)

۱) صفر


۲) $W.L$

۳) $W.L \sin \theta$

۴) $W.L \cos \theta$

• کار نیروی وزن (W_{mg}):


الف) جسم در راستای افقی جابه‌جا شود:



$$\Rightarrow W_{mg} = mgd \cos 90^\circ = 0$$


ب) جسم در راستای قائم جابه‌جا شود:

- جسم در راستای قائم به طرف بالا حرکت کند.




$$\theta = 180^\circ \Rightarrow W_{mg} = mgd \cos 180^\circ = -mgh$$

- جسم در راستای قائم به سمت پایین حرکت کند.



$$W_{mg} = mgd \cos 0^\circ = mgh$$

◀ نکته: کار نیروی وزن مستقل از مسیر حرکت است و فقط به اختلاف ارتفاع (Δh) دو نقطه‌ای که بین آن‌ها جابه‌جا می‌شود بستگی دارد.



$$\begin{cases} (W_{mg})_1 = (W_{mg})_2 = (W_{mg})_3 = mg\Delta h \\ \Delta h = h_B - h_A \end{cases}$$


❖ **تذکره:** در نکته‌ی بالا اگر جسم از A به B جابه‌جا شود، آن‌گاه داریم:

$$(W_{mg})_1 = (W_{mg})_2 = (W_{mg})_3 = -mg\Delta h$$

❖ **نکته:** کار لازم برای غلبه بر نیروی وزن (W') برابر قدر مطلق کار نیروی وزن W_{mg} است

$$W' = |W_{mg}|$$

❖ **نکته:** هرگاه جسمی از نقطه‌ی A تا B روی سطح شیب‌دار مطابق شکل جابه‌جا شود کار نیروی وزن برابر است با:



$$\begin{cases} W_{mg} = -mgh \Rightarrow W_{mg} = -mgd \sin \alpha \\ \sin \alpha = \frac{h}{d} \end{cases}$$

❖ **تذکره:** اگر جسم از نقطه‌ی B تا نقطه‌ی A جابه‌جا شود، داریم:

$$W_{mg} = +mgd \sin \alpha$$

کارنیروی وزن

۳۳. نخ‌ی را به یک وزنه‌ی یک کیلوگرمی بسته و آن را با نیروی کشش ۴ نیوتون روی سطح افقی به اندازه‌ی یک متر جابه‌جا می‌کنیم.

(سراسری تجربی ۷۷)

کار نیروی وزن در این جابه‌جایی چند ژول است؟

۱۹/۶ ④

۹/۸ ③

۴ ②

صفر ①

۳۴. جسمی به وزن ۸ نیوتون از بالای سطح شیب‌دار بدون اصطکاک‌ی که با افق زاویه‌ی ۳۰ درجه می‌سازد، به طرف پایین سطح می‌لغزد.

(سراسری تجربی ۶۶)

اگر ارتفاع سقوط جسم ۲/۵ متر باشد، کار نیروی وزن بر روی جسم چند ژول است؟

۵۰ ④

۴۰ ③


۲۰ ②

۱۰ ①

۳۵. اگر در سطح شیب‌دار مطابق شکل، اندازه‌ی نیروی اصطکاک برابر ۱/۱ وزن جسم باشد و جسم از نقطه‌ی A (ارتفاع ۵ متر) به

نقطه‌ی B برسد، کار نیروی گرانش (جاذبه) زمین روی جسم در این جابه‌جایی چند ژول است؟ ($g = 10 \text{ N/kg}$)

(سراسری تجربی ۷۷)



۴۰ ①

۵۰ ②


۶۰ ③

۱۰۰ ④

۳۶. وزنه‌ای به جرم ۰/۵kg روی سطح شیب‌دار شکل مقابل به اندازه‌ی ۶۰ سانتی‌متر به پایین می‌لغزد، کار نیروی گرانش (جاذبه)

(آزاد ریاضی ۸۰)

زمین در این جابه‌جایی چند ژول است؟ ($g = 10 \text{ N/kg}$)



۱۵ ①

۱/۵ ②

۳ ③

۳۰ ④

۳۷. اتومبیلی به جرم یک تن روی سطح شیب‌داری به شیب ۵ درصد ($\sin \alpha = 0.05$) با تندی ثابت ۱۰ m/s بالا می‌رود. کار نیروی

(آزاد تجربی ۷۳)

گرانش زمین در مدت یک دقیقه چند کیلوژول است؟ ($g = 10 \text{ N/kg}$)

۶۰۰ ④

۵۰۰ ③

-۶۰۰ ②

-۳۰۰ ①

۳۸. وزنه‌ای به جرم m درون نیمکره‌ای به شعاع R از نقطه‌ی B می‌لغزد. کار نیروی وزن در این تغییر مکان برابر است با:

(سراسری ریاضی ۶۳)




① صفر $\frac{1}{2}mgR$ ②

③ $\frac{\sqrt{3}}{2}mgR$ ④ $\frac{1}{4}mgR$

۳۹. جسم m به جرم $100g$ درون نیم‌کره صیقلی به قطر 60 سانتی‌متر به پایین می‌لغزد. کار نیروی وزن جسم از A تا B چند ژول

(سراسری تجربی ۷۸)



است؟ ($g = 10 m/s^2$, $\sin 37^\circ = 0.6$)

① 0.12

② 0.18


③ $1/2$

④ $1/8$

۴۰. مطابق شکل زیر، گلوله‌ای به جرم $3kg$ از انتهای یک نخ سبک به طول 2 متر آویزان است. اگر آونگ را از حالت عمودی A به

نقطه‌ی B برسانیم، کار نیروی وزن گلوله در این جابه‌جایی چند ژول می‌شود؟ ($g = 10 \frac{N}{kg}$)

(آزمون کانون-چهارم ریاضی-۲۲ اسفند ۹۳)



① 12

② -12

③ 36

④ -36

۴۱. شخصی چمدانی به جرم 5 کیلوگرم را یک متر در امتداد افق و سپس یک متر در امتداد قائم حمل می‌کند. کاری که این شخص

(سراسری تجربی ۶۳)


در غلبه بر وزن چمدان انجام می‌دهد تقریباً برابر است با:

① 5 ژول ② 10 ژول ③ 50 ژول ④ 100 ژول

۴۲. ورزشکاری وزنه‌ای به جرم $40kg$ را به‌طور یکنواخت، $50cm$ بالای سر خود می‌برد (مطابق شکل). کاری که این ورزشکار روی

وزنه انجام می‌دهد چند ژول است؟ (اندازه‌ی شتاب گرانشی زمین را $9/8 \frac{N}{kg}$ در نظر بگیرید.)

(مشابه تمرین ۲-۳ کتاب درسی)



① -200

② 200

③ -196

④ 196

۴۳. شکل روبه‌رو شخصی را در حال هل‌دادن یک گاری حمل بار روی سطحی هموار و بدون اصطکاک با نیرویی به بزرگی $F = 66N$

نشان می‌دهد. اگر گاری $m = 18/4$ در جهت نیرو جابه‌جا شود، کاری که شخص روی گاری انجام می‌دهد چند ژول است؟

(مشابه تمرین ۲-۴ کتاب درسی)



① $1214/4$


② $121/44$

③ $1312/2$

④ $131/22$


● کار کل (W_t):

اگر به جای یک نیرو، چند نیرو به یک جسم وارد شود، برای محاسبه کار کل به یکی از دو روش زیر می‌توان عمل کرد:
(۱) کار انجام شده توسط هر نیرو به‌طور جداگانه محاسبه شود در نهایت کار کل (W_t) برابر جمع جبری کار انجام شده توسط تک‌تک نیروهاست.



❖ تذکر: جمع جبری به این معناست که ممکن است کار برخی نیروها منفی شود و برای محاسبه کار کل، علامت منفی کار باید در جمع کردن در نظر گرفته شود.

(۲) ابتدا نیروهایی که در امتداد جابه‌جایی بر جسم وارد می‌شوند شناسایی شوند. سپس اندازه‌ی نیروی خالص (F_t) موازی با بردار جابه‌جایی وارد بر جسم تعیین شود و در نهایت کار کل انجام شده برابر است با:



❖ تذکر: نیروهایی که عمود بر جابه‌جایی هستند سهمی در محاسبه کار کل وارد شده بر جسم (W_t) نخواهند داشت.

● کار و انرژی جنبشی:

قضیه‌ی کار-انرژی جنبشی: همواره کار کل انجام شده روی یک جسم (W_t) با تغییرات انرژی جنبشی آن (ΔK) برابر است.
 $W_t = \Delta K = K_f - K_i$

❖ نکته: هنگامی که $W_t > 0$ است، انرژی جنبشی آن افزایش می‌یابد (بنابراین تندی جسم در پایان جابه‌جایی بیش‌تر از تندی آن در ابتدای حرکت است ($V_f > V_i$)).

❖ نکته: هنگامی که $W_t < 0$ است، انرژی جنبشی جسم کاهش می‌یابد (بنابراین تندی جسم در انتهای جابه‌جایی کم‌تر از تندی آن در آغاز حرکت است ($V_f < V_i$)).

❖ نکته: هنگامی که $W_t = 0$ است، انرژی جنبشی جسم در آغاز و پایان جابه‌جایی یکسان است ($k_f = k_i$) بنابراین تندی جسم در این دو نقطه یکسان است ($V_f = V_i$)).

❖ تذکر: قضیه‌ی کار-انرژی جنبشی نه تنها برای حرکت یک جسم روی مسیر مستقیم معتبر است بلکه اگر جسم روی مسیر خمیده‌ای نیز حرکت کند می‌توان از آن استفاده کرد.


❖ تذکر: قضیه‌ی کار-انرژی جنبشی، قانون جدیدی در فیزیک نیست بلکه صرفاً کار ($W = Fd \cos \theta$) و انرژی جنبشی ($k = \frac{1}{2}mv^2$) را به هم مرتبط می‌سازد و به سادگی می‌توان آن‌را از قانون دوم نیوتون به‌دست آورد.

کلرکل

۴۴. کشاورزی توسط تراکتور، سورتمه‌ای پر از هیزم را در راستای یک زمین هموار به‌اندازه‌ی ۲۳۵m جابه‌جا می‌کند (شکل زیر) وزن

کل سورتمه و بار آن $mg = 1/47 \times 10^3 \text{ N}$ است. تراکتور نیروی ثابت $F_1 = 4\sqrt{2} \times 10^3 \text{ N}$ را در زاویه‌ی $\theta = 45^\circ$ بالای افق به سورتمه وارد می‌کند. نیروی اصطکاک جنبشی $f_k = 3/4 \times 10^3 \text{ N}$ است که بر خلاف جهت حرکت به سورتمه وارد می‌شود.

کار کل انجام شده روی سورتمه کدام است؟ ($\cos 45 = \frac{\sqrt{2}}{2}$) (مشابه تمرین ۲-۶ کتاب درسی)




۱۴۱۰۰۰J ①

۹۴۰۰۰۰ ②

-۱۴۱۰۰۰J ③

-۹۴۰۰۰۰ ④

۴۵. نیروی افقی $F_a = 20\text{ N}$ بر جسمی به جرم 3 kg که روی یک سطح شیبدار بدون اصطکاک به زاویه $\theta = 30^\circ$ قرار گرفته، وارد می‌شود. اگر جسم به اندازه $d = 0.5\text{ m}$ جابه‌جا شود. در طول این جابه‌جایی، کار خالص انجام شده روی جسم چند ژول است؟
($\sin 30^\circ = 0.5$ و $\cos 30^\circ = 0.8$) (مکمل مثال ۲-۵ کتاب درسی)



- ۱) ۸
۲) ۰/۵
۳) -۸
۴) -۰/۵

قضیه کار- انرژی جنبشی بدون حضور اصطکاک

۴۶. تندی جسمی به جرم 8 kg تحت تأثیر نیروی F از 4 m/s به 6 m/s می‌رسد، کار این نیرو چند ژول است؟
(سراسری ریاضی ۷۳ و ۶۵)

- ۱) ۱۶
۲) ۳۲
۳) ۴۰
۴) ۸۰

۴۷. توپ فوتبالی به جرم 0.5 kg از طریق یک ضربه ایستگاهی با تندی $12\frac{\text{m}}{\text{s}}$ به سمت دروازه، شوت می‌شود. اگر توپ با تندی $10\frac{\text{m}}{\text{s}}$ به تیرک دروازه برخورد کند، کار کل انجام شده روی توپ چند ژول است؟
(مطابق با مثال ۲-۶ کتاب درسی)

- ۱) -۱۱
۲) ۱۱
۳) -۲۲
۴) ۲۲


۴۸. اگر کار کل نیروهای وارد بر جسمی به جرم 2 kg برابر 21 J ژول و تندی جسم در ابتدا برابر $2\frac{\text{m}}{\text{s}}$ باشد، پس از انجام این کار بر روی جسم، تندی آن به چند متر بر ثانیه می‌رسد؟
(آزاد ریاضی بعد از ظهر ۸۲)

- ۱) ۴
۲) ۵
۳) ۳
۴) ۷

۴۹. به جسمی به جرم 2 kg که با تندی V_0 بر مسیر مستقیم در حرکت است، نیروی ثابت 4 N هم‌جهت با V_0 وارد می‌شود. اگر پس از طی مسافت 24 m متر انرژی جنبشی جسم به 132 J ژول برسد، V_0 چند متر بر ثانیه است؟
(آزاد ریاضی ۷۵)

- ۱) ۳
۲) ۴
۳) ۶
۴) ۱۲

۵۰. دو قایق مخصوص حرکت روی سطوح یخ‌زده مطابق شکل، دارای جرم‌های m و $4m$ و بادبان‌های مشابه‌اند. قایق‌ها روی دریاچه‌ای افقی و بدون اصطکاک قرار دارند و نیروی ثابت و یکسان $\vec{F}$ با وزیدن باد به هر دو وارد می‌شود. هر دو قایق از حال سکون شروع به حرکت می‌کنند و از خط پایان به فاصله d می‌گذرند. نسبت تندی قایق ۲ به تندی قایق ۱ درست پس از عبور از خط پایان کدام است؟
(مشابه تمرین ۲-۷ کتاب درسی)




- ۱) $\sqrt{2}$
۲) $\frac{\sqrt{2}}{2}$
۳) ۲
۴) $\frac{1}{2}$

۵۱. برای آن‌که تندی خودرویی از حال سکون به v برسد، باید کار کل W_{1t} روی آن انجام شود. هم‌چنین برای آن‌که تندی خودرو از v به $2v$ برسد، باید کار کل W_{2t} روی آن انجام شود (شکل زیر). نسبت $\frac{W_{1t}}{W_{2t}}$ چقدر است؟ (مشابه پرسش ۲-۳ کتاب درسی)

- ۱) $\frac{1}{3}$
۲) ۳
۳) $\frac{2}{3}$
۴) $\frac{3}{2}$



۵۲. شکل‌های الف و ب دو جسم به جرم‌های $m_1 = m$ و $m_2 = 2m$ را نشان می‌دهند که بر روی یک سطح افقی بدون اصطکاک در حالت سکون قرار گرفته‌اند اگر کار انجام شده در هر دو حالت یکسان باشد، تندی نهایی این دو جسم در کدام گزینه به درستی مقایسه شده است؟



① $V_1 > V_2$


② $V_2 > V_1$

③ $V_1 = V_2$

④ هر سه حالت می‌توان اتفاق بیافتد.

۵۳. جرم یک خودروی الکتریکی به همراه راننده‌اش 800 kg است. وقتی این خودرو از موقعیت A به موقعیت B می‌رود، کار کل انجام شده روی خودرو $6/391 \times 10^7 \text{ J}$ است. اگر تندی خودرو در موقعیت A برابر $54 \frac{\text{km}}{\text{h}}$ باشد، تندی آن در موقعیت B چند متر بر ثانیه است؟

(مشابه تمرین ۲-۸ کتاب درسی)



① ۴۰۰


② ۳۰۰

③ ۲۰۰

④ ۱۰۰

۵۴. ماهواره‌ها در مدارهای معین و با تندی ثابت به دور زمین می‌چرخند. شکل زیر حرکت ماهواره را به دور زمین مدل‌سازی کرده است. کدام گزینه نادرست است؟

(مشابه و مکمل با پرسش و مسئله ۱۴ پایان فصل کتاب درسی)



① تغییرات انرژی جنبشی ماهواره در طول حرکت آن صفر است.

② کار کل انجام شده روی ماهواره در طول حرکت آن صفر است.

③ نیروی جاذبه‌ی گرانشی که از طرف زمین به ماهواره وارد می‌شود معادل وزن ماهواره است.

④ نیروی جاذبه‌ی گرانشی که از طرف زمین به ماهواره وارد می‌شود روی آن کار انجام می‌دهد.

۵۵. شخصی به جرم 75 kg ، چمدانی به جرم 10 kg را از روی زمین برداشته و در داخل صندوق عقب اتومبیل خود قرار می‌دهد. اگر ارتفاع کف صندوق عقب از سطح زمین 1 m باشد، کدام گزینه نادرست است؟ $(g = 10 \frac{\text{N}}{\text{kg}})$

(مشابه با پرسش و مسئله ۴ پایان کتاب درسی)

① کار نیروی وزن در این جابه‌جایی -100 J است.

② کاری که شخص برای غلبه بر نیروی وزن انجام می‌دهد برابر 100 J است.

③ انرژی جنبشی چمدان در این جابه‌جایی تغییر نمی‌کند.

④ انرژی جنبشی چمدان در این جابه‌جایی 100 J تغییر کرده است.

۵۶. انرژی جنبشی جسمی 20 J ژول است، نیروی ثابت F هم‌راستا و هم‌سو با حرکت بر آن وارد می‌شود و پس از 10 m متر جابه‌جایی انرژی جنبشی جسم به 32 J ژول می‌رسد. F چند نیوتون است؟

(آزاد ریاضی ۷۴)

① ۱۶


② ۱۲/۵

③ ۳/۲

④ ۱/۲

۵۷. جسمی از حال سکون تحت تأثیر نیرویی که اندازه و جهت آن ثابت است به حرکت درمی‌آید. اگر این نیرو در تمام طول مسیر بر جسم اثر کند و نیروی مقاومی در مقابل حرکت وجود نداشته باشد، کدام نمودار تغییرات کار نیرو را بر حسب تندی جسم درست نشان می‌دهد؟

(سراسری ریاضی ۶۷)



۵۸. جسمی با تندی 10 m/s در جهت مثبت محور xها حرکت می‌کند و انرژی جنبشی آن 100 J است. پس از مدتی تندی این جسم تغییر کرده و در جهت منفی محور xها به 20 m/s می‌رسد. کار کل انجام شده بر این جسم در این مدت چند ژول است؟

(سراسری تجربی ۸۰)

① ۵۰۰

② ۳۰۰

③ -۳۰۰

④ -۵۰۰

۵۹. جسمی به جرم 8 kg با تندی $10 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ روی خط راست حرکت می‌کند. چه نیرویی بر حسب نیوتون و در کدام جهت باید در

- راستای حرکت به آن وارد شود، تا پس از طی مسافت 8 متر انرژی جنبشی آن به 1200 ژول برسد؟ (سراسری تجربی ۷۲)
- ① 100 و در جهت حرکت
② 50 و در جهت حرکت
③ 50 و در خلاف جهت حرکت
④ 100 و در خلاف جهت

۶۰. دو نیروی $F_1 = 20 \text{ N}$ و F_2 تماماً بر جسمی اثر می‌کنند و آن را از حال سکون بر مسیر مستقیم به حرکت درمی‌آورند، پس از طی مسافت 8 متر انرژی جنبشی جسم به 120 ژول می‌رسد، F_2 چند نیوتون و در چه جهتی است؟ (آزاد پزشکی ۷۶)

- ① 5 نیوتون و هم‌جهت با F_1
② 40 نیوتون و در خلاف جهت F_1
③ 5 نیوتون و در خلاف جهت F_1
④ 40 نیوتون و هم‌جهت با F_1

۶۱. دو نیروی عمود بر هم با اندازه‌های مساوی جسمی به جرم 4 کیلوگرم را از حال سکون به حرکت درمی‌آورند. اگر پس از 16 متر جابه‌جایی انرژی جنبشی جسم به 32 ژول برسد، اندازه‌ی هر یک از نیروها چند نیوتون است؟ (آزاد تجربی ۷۷)

- ① $\sqrt{2}$
② 1
③ 2
④ $\frac{\sqrt{2}}{2}$

۶۲. اتومبیلی به جرم 2 تن در یک جاده‌ی شیب‌دار که با سطح افق زاویه‌ی 30° درجه می‌سازد، رو به بالا در حرکت است. اگر تندی اتومبیل در مدت 20 ثانیه از $2 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ به $12 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ برسد، کار کل انجام شده بر روی اتومبیل در این بازه‌ی زمانی چند کیلوژول است؟


- (خارج از کشور تجربی ۸۷)
- ① 140
② 148
③ 210
④ 218

۶۳. جسمی به جرم 20 کیلوگرم را بر روی سطح شیب‌داری که اصطکاک آن ناچیز است و زاویه‌ی آن با سطح افق 30° درجه می‌باشد با تندی ثابت به اندازه‌ی 5 متر به طرف بالا می‌بریم. کار انجام شده چند ژول است؟ $(g = 10 \frac{\text{N}}{\text{kg}})$ (آزاد ریاضی ۸۷)

- ① 500
② $500\sqrt{3}$
③ 50
④ $50\sqrt{3}$

۶۴. نیروی ثابت F_a به یک جعبه به جرم 5 kg تحت زاویه‌ی $\theta = 37^\circ$ مطابق شکل وارد می‌شود. اگر جعبه تحت این نیرو و با تندی ثابت بر روی سطح شیب‌دار بدون اصطکاک تا ارتفاع عمودی 1 m جابه‌جا شود، کار انجام شده توسط F_a چند ژول است؟

(مکمل تمرین ۲-۹ کتاب درسی) $(\sin 53^\circ = 0.8, g = 10 \frac{\text{N}}{\text{kg}})$



- ① 40
② -40
③ -50
④ 50

۶۵. شکل روبه‌رو شخصی را نشان می‌دهد که با واردکردن نیروی ثابت 52 N ، جعبه‌ای به جرم 4 kg را از حال سکون تا ارتفاع 150 cm در امتداد قائم جابه‌جا می‌کند. تندی نهایی جعبه کدام است؟ $(g = 10 \frac{\text{N}}{\text{kg}})$ (مشابه تمرین ۲-۹ کتاب درسی)




- ① $1 \frac{\text{m}}{\text{s}}$
② $2 \frac{\text{m}}{\text{s}}$
③ $3 \frac{\text{m}}{\text{s}}$
④ $4 \frac{\text{m}}{\text{s}}$

۶۶. وزنه‌ای به جرم m را با تندی ثابت تا ارتفاع h بالا می‌بریم، کار انجام شده بر روی جسم در این جابه‌جایی کدام است؟ (سراسری تجربی ۷۶)

- ① $-mgh$
② صفر
③ mgh
④ $2mgh$

۶۷. مطابق شکل سه گلوله مشابه از بالای ساختمان به ارتفاع h با تندی یکسان توسط یک توپ شلیک می‌شوند. گلوله‌ی اول (۱) در امتداد افقی، گلوله دوم (۲) با زاویه‌ای بالاتر از افق و گلوله سوم (۳) با زاویه‌ای زیر امتداد افق. اگر تندی گلوله اول، دوم و سوم در هنگام برخورد به زمین به ترتیب V_1 ، V_2 و V_3 باشد کدام گزینه صحیح است؟ (مشابه پرسش و مسئله ۸ پایان فصل کتاب درسی)



① $V_3 > V_1 > V_2$

② $V_2 > V_1 > V_3$

③ $V_1 > V_3 > V_2$

④ $V_1 = V_2 = V_3$

۶۸. جسمی به جرم 20 گرم از ارتفاع 80 متری سطح زمین بدون تندی اولیه سقوط می‌کند و با تندی 30 متر بر ثانیه به زمین می‌رسد. کار برآیند نیروهای وارد بر آن در طول مسیر چند ژول است؟ (آزاد تجربی ۷۵)

④ 48

③ $4/8$

② 16

① 9

۶۹. گلوله‌ای از ارتفاع 20 متری سطح زمین، با تندی اولیه‌ی $4 \frac{m}{s}$ در راستای قائم رو به پایین پرتاب می‌شود. انرژی جنبشی این گلوله بعد از 4 متر پایین آمدن چند برابر می‌شود؟ ($g = 10 \frac{m}{s^2}$ و از مقاومت هوا صرف‌نظر شود). (خارج از کشور تجربی ۹۲)

④ 6

③ 5

② 4

① 3

قضیه‌ی کار-انرژی جنبشی در حضور نیروی اصطکاک

۷۰. جسمی به جرم $500g$ از بالای ساختمان به ارتفاع $20m$ از سطح زمین، با تندی $20 \frac{m}{s}$ پرتاب می‌شود. اگر جسم با تندی $10 \frac{m}{s}$ به زمین برخورد کند در طول حرکت جسم، کار نیروی مقاومت هوا چند ژول است؟ ($g = 10 \frac{N}{kg}$) (مشابه با پرسش و مسئله ۹ پایان فصل کتاب درسی)

④ 175

③ -175

② 150

① -150

۷۱. چتربازی که مجموع جرم او و چترش $140kg$ است، از ارتفاع 600 متری سطح زمین با تندی ثابت سقوط می‌کند. کار نیروی مقاومت هوا بر روی چتر و شخص از لحظه‌ی سقوط تا لحظه‌ای که به سطح زمین می‌رسد، چند کیلوژول می‌باشد؟ ($g = 10 \frac{N}{kg}$) (آزمون کانون-چهارم تجربی-۲۲ اسفند ۹۳)

④ -840

③ 840

② -640

① 640

۷۲. چتربازی از ارتفاع 800 متری از حال سکون رها می‌شود. جرم چترباز به همراه چترش $80kg$ است. اگر او با تندی $5 \frac{m}{s}$ به زمین برسد، کار نیروی مقاومت هوا در مسیر سقوط چند کیلوژول است؟ ($g = 10 \frac{m}{s^2}$) (آزمون کانون-چهارم تجربی-۲۲ اسفند ۹۴)



① -639

② -625

③ -675

④ -685

۷۳. جسمی به جرم $2/0$ کیلوگرم از ارتفاع 15 متری سطح زمین بدون تندی اولیه رها می‌شود و با تندی $15 \frac{m}{s}$ به زمین می‌رسد. اندازه کار نیروی مقاوم (مقاومت هوا) در مقابل حرکت جسم چند ژول است؟ (آزاد ریاضی ۸۲ و ۷۷)

④ $22/5$

③ 12

② 18

① $7/5$

۷۴. توپی به جرم 200 گرم را با تندی 10 متر بر ثانیه در راستای قائم به طرف بالا پرتاب می‌کنیم. تندی توپ موقع رسیدن به نقطه پرتاب 9 متر بر ثانیه است. چند ژول گرما به محیط و توپ داده شده است؟ (سراسری تجربی ۶۹)

④ 1900

③ 38

② 19

① $1/9$

۷۵. راننده اتومبیلی به جرم 2 تن با ترمز اتومبیل موفق می‌شود تندی آن را در طی مسافت $20m$ از $25m/s$ به $15m/s$ برساند، کار برآیند نیروهای وارد بر اتومبیل در این مدت چند ژول است؟ (سراسری تجربی ۷۲)

④ 4×10^5

③ 6×10^6


② -4×10^5

① -6×10^6

۷۶. اتومبیلی به جرم ۸۰۰ کیلوگرم که با تندی ۱۰ m/s در جاده افقی در حرکت است، ترمز می‌کند و پس از طی مسافتی متوقف می‌گردد. کار انجام شده روی بر اتومبیل در مدت ترمز کردن چند ژول است؟
(سراسری تجربی ۷۳)
- ① -۸×۱۰^۳ ② -۴×۱۰^۴ ③ ۸×۱۰^۳ ④ ۴×۱۰^۴
۷۷. اتومبیلی به جرم ۶۰۰ کیلوگرم با تندی ۵۴ کیلومتر بر ساعت در حال حرکت است. اگر در اثر ترمز، اتومبیل متوقف شود، کار نیروی اصطکاک (بر حسب کیلوژول) کدام است؟
(سراسری ریاضی ۶۹)
- ① ۱۳۵ ② $۶۷/۵$ ③ $-۶۷/۵$ ④ -۱۳۵
۷۸. اتومبیلی به جرم ۸۰۰ کیلوگرم و تندی ۱۰ متر بر ثانیه ترمز کرده و متوقف می‌شود، چه مقدار انرژی بر حسب ژول به حرارت تبدیل می‌شود؟
(سراسری تجربی ۶۹)
- ① ۴×۱۰^۳ ② ۸×۱۰^۴ ③ ۴×۱۰^۴ ④ باید نیروی اصطکاک معلوم باشد.
۷۹. گلوله‌ای به جرم ۲۰ گرم با تندی $۱۰۰ \frac{\text{m}}{\text{s}}$ به مانعی برخورد می‌کند و با تندی $۴۰ \frac{\text{m}}{\text{s}}$ از طرف دیگر آن خارج می‌شود. کار کل انجام شده روی گلوله در این برخورد چند ژول است؟
(آزاد تجربی ۷۴)
- ① ۶۰ ② ۱۲۰ ③ -۸۰ ④ -۸۴
۸۰. گلوله‌ای به جرم ۲۰ گرم در راستای افقی با تندی $۶۰۰ \frac{\text{m}}{\text{s}}$ به تنه درختی برخورد کرده و به اندازه ۲۰ سانتی‌متر در آن فرو رفته و متوقف می‌شود، کار درخت بر روی گلوله چند ژول است؟
(آزاد تجربی ۷۸)
- ① -۳۶۰۰ ② -۲۴۰۰ ③ ۱۸۰۰ ④ ۱۴۴۰
۸۱. گلوله‌ای به جرم ۲۰۰ g با تندی $۴۰ \frac{\text{m}}{\text{s}}$ به صورت افقی به یک دیوار قائم برخورد کرده، ۲۰ سانتی‌متر در آن فرو رفته و سپس متوقف می‌شود. اندازه‌ی نیروی متوسطی که دیوار در راستای افق بر گلوله وارد می‌کند، چند نیوتون است؟
(آزمون کانون - چهارم ریاضی - ۲۱ آذر ۹۳)
- ① ۲۰۰ ② ۴۰۰ ③ ۶۰۰ ④ ۸۰۰
۸۲. چکشی به جرم ۱۰ kg با تندی $۱۰ \frac{\text{m}}{\text{s}}$ به میخی برخورد می‌کند و باعث می‌شود میخ به اندازه‌ی ۲ cm درون چوبی فرو رود. نیروی متوسط وارد شده از طرف چوب بر میخ در این جابه‌جایی چند نیوتون است؟ (چکش بعد از ضربه ساکن می‌شود و از اتلاف انرژی صرف‌نظر شود).
- (آزمون کانون - چهارم تجربی - ۲۲ اسفند ۹۳)
- ① ۲۰۰۰۰ ② ۲۵۰۰۰ ③ ۲۰۰۰ ④ ۲۵۰۰
۸۳. گلوله‌ای به جرم ۲۰۰ گرم با تندی افقی ۷ به تنه‌ی درختی برخورد کرده و با تندی افقی $۱۰ \frac{\text{m}}{\text{s}}$ از طرف دیگر آن خارج می‌شود. اگر اتلاف انرژی گلوله به هنگام عبور از درخت معادل ۶۰ درصد انرژی اولیه‌ی آن در لحظه‌ی برخورد باشد، اندازه‌ی تندی ۷ چند متر بر ثانیه است؟
(آزمون کانون ۹۱ - سوم ریاضی ۹۱)
- ① $۵\sqrt{۱۰}$ ② $۱۰\sqrt{۵}$ ③ ۲۵ ④ ۴
۸۴. مکعبی به جرم ۲ کیلوگرم را روی سطح افقی، با تندی اولیه به حرکت درمی‌آوریم. در لحظه‌ای که کار نیروی اصطکاک به ۴۵ ژول می‌رسد، تندی جسم ۵ m/s کم‌تر از تندی اولیه‌ی آن است. تندی اولیه‌ی جسم چند متر بر ثانیه بوده است؟ (آزاد ریاضی ۷۱)
- ① ۱۰ ② ۷ ③ ۱۴ ④ معلومات داده شده کافی نیست.
۸۵. روی یک سطح افقی بر جسمی به جرم M که با سطح دارای اصطکاک است نیروی افقی F را وارد می‌کنیم. جسم از حال سکون به حرکت درآمده و پس از مدتی به تندی V می‌رسد. اگر کار نیروی F در این مدت W و انرژی جنبشی جسم در این لحظه K باشد، کدام گزینه درست است؟
(سراسری تجربی ۷۱)
- ① $W \leq K$ ② $W > K$ ③ $W = K$ ④ $W < K$

۸۶. جسم $M = 2\text{ kg}$ از نقطه‌ی A بدون تندی اولیه به پایین لغزیده و پس از طی مسیر افقی $BC = 4\text{ m}$ در نقطه‌ی C متوقف شده است. اصطکاک قسمت AB مسیر ناچیز است. نیروی اصطکاک طول BC چند نیوتون است؟ ($g = 10\text{ m/s}^2$)


(سراسری ریاضی ۷۸)



- ① ۰/۷۵
② ۰/۸
③ ۷/۵
④ ۸

۸۷. جسمی به جرم 0.8 kg مطابق شکل، از نقطه‌ی A بدون تندی اولیه شروع به حرکت می‌کند و با تندی 5 m/s به نقطه‌ی C می‌رسد، اگر اندازه‌ی کار نیروی اصطکاک در مسیر ABC برابر 22 J و $g = 10\text{ N/kg}$ باشد، ارتفاع h چند متر است؟


(آزاد تجربی ۷۸)



- ① ۲
② ۶
③ ۸
④ ۳/۵

۸۸. جسمی درون سطح نیم‌کره‌ای مطابق شکل، از نقطه‌ی A رها می‌شود و بعد از چند حرکت رفت و برگشت لغزشی، روی سطح در پایین سطح می‌ایستد. نسبت کار نیروی اصطکاک به کار نیروی جاذبه‌ی زمین کدام است؟


(سراسری ریاضی ۷۹)



- ① -۲
② -۱
③ ۱
④ ۲


۸۹. در شکل زیر نیروی F وزنه 200 N نیوتونی را با تندی ثابت 2 m/s روی سطح شیب‌دار بالا می‌برد. اگر نیروی اصطکاک در مقابل حرکت جسم 30 N نیوتون باشد، کار نیروی F در مدت 10 s ثانیه چند ژول است؟

(آزاد تجربی ۸۰)



- ① ۱۱۰۰
② ۶۴۰۰
③ ۲۴۰۰
④ ۳۰۰۰

۹۰. جسمی به جرم 4 kg روی سطح شیب‌داری مطابق شکل به سمت بالا حرکت می‌کند، اگر تندی آن در نقطه‌ی A برابر 6 m/s و در نقطه‌ی B برابر 2 m/s باشد، اندازه‌ی برآیند نیروهای وارد بر جسم بین A و B چند نیوتون است؟ (آزاد ریاضی ۷۶)




- ① ۱/۲
② ۳/۲
③ ۲/۴
④ ۲

۹۱. جسمی روی سطح شیب‌دار و دارای اصطکاکی که با سطح افق زاویه‌ی 30° درجه ساخته است، بدون تندی اولیه به پایین سطح می‌لغزد. اگر جرم جسم 200 g و طول سطح 5 m و تندی آن در پایین سطح 5 m/s باشد، کار نیروی اصطکاک چند ژول است؟ ($g = 10\text{ m/s}^2$)

(سراسری تجربی ۷۴)

- ① -۵
② -۲/۵
③ ۲/۵
④ ۵


۹۲. جسمی به جرم 2 kg را مطابق شکل با تندی اولیه‌ی 5 m/s مماس بر سطح رو به پایین پرتاب می‌کنیم. اگر تندی جسم پس از 12 m متر جابه‌جایی روی سطح به 8 m/s برسد، کار نیروی اصطکاک چند ژول است؟ ($g = 10\text{ m/s}^2$) (سراسری ریاضی ۸۵)



- ① -۴۲
② -۴۵
③ -۶۳
④ -۸۱

۹۳. در شکل مقابل، جسم متحرک به جرم 2 kg پس از رسیدن به نقطه‌ی A در امتداد سطح شیب‌دار بالا می‌رود. اگر تندی جسم در نقاط A و B به ترتیب برابر 20 m/s و 10 m/s باشد، کار نیروی اصطکاک روی سطح شیب‌دار چند ژول است؟

(سراسری ریاضی ۸۳)



$$(g = 10\text{ m/s}^2)$$

① صفر

② -۵۰

③ -۱۲۵

④ -۲۵۰

۹۴. جسمی به جرم m را از پایین سطح شیب‌داری با تندی اولیه V_0 به طرف بالای سطح پرتاب می‌کنیم. تندی در برگشت به نقطه‌ی پرتاب نصف تندی اولیه V_0 است. چه کسری از انرژی جنبشی اولیه به صورت اصطکاک تلف شده است؟

(سراسری ریاضی ۷۰)

④ $0/75$


③ $0/375$

② $0/5$

① $0/25$

۹۵. جسمی به جرم m را مطابق شکل از پایین یک سطح شیب‌دار با تندی 4 m/s رو به بالا پرتاب می‌کنیم، جسم در نقطه‌ی A متوقف می‌شود و دوباره برمی‌گردد. اگر تندی آن در نقطه‌ی پرتاب 2 m/s باشد، طول OA چند متر است؟ ($g = 10\text{ m/s}^2$)

(سراسری ریاضی ۷۶)



① ۱

② $1/5$

③ $0/8$

④ ۲

۹۶. جسمی به جرم 2 kg را از پایین سطح شیب‌داری که با افق زاویه‌ی 30° درجه می‌سازد، با تندی اولیه‌ی 5 m/s مماس با سطح رو به بالا پرتاب می‌کنیم. جسم روی سطح به اندازه‌ی 2 m بالا می‌رود و سپس به نقطه‌ی پرتاب برمی‌گردد. کار نیروی اصطکاک در این مسیر رفت و برگشت چند ژول است؟ ($g = 10\text{ m/s}^2$)

(خارج از کشور ریاضی ۸۶)

④ -۲۰

③ -۱۰

② -۵

① صفر

• انرژی پتانسیل:

انرژی پتانسیل، کمیتی مربوط به یک سامانه (دستگاه یا سیستم) است. بنابراین وقتی دو یا چند جسم به یک‌دیگر نیرو وارد می‌کنند به دلیل موقعیت مکانی‌شان در سامانه، انرژی پتانسیل دارند. این نوع انرژی می‌تواند به شکل‌های مختلفی، بسته به این‌که چه نیروهایی در سامانه وجود دارد، مانند گرانشی، کشسانی و الکتریکی در سیستم ذخیره شود.


❖ **نکته:** هر سامانه می‌تواند حداقل از دو جسم یا تعداد بیش‌تری از اجسام تشکیل شده باشد مانند، انرژی پتانسیل گرانشی در سامانه شخص- زمین، انرژی پتانسیل کشسانی در سامانه‌ی گلوله- فنر و انرژی پتانسیل الکتریکی در سامانه‌ی دو جسم باردار

❖ **نکته:** انرژی پتانسیل بر خلاف انرژی جنبشی که به حرکت یک جسم وابسته است، ویژگی یک سامانه است تا ویژگی یک جسم منفرد، به عبارت دیگر انرژی پتانسیل به مکان اجسام یک سامانه نسبت به یک‌دیگر بستگی دارد.

❖ **نکته:** وقتی انرژی پتانسیل یک سامانه تغییر می‌کند به شکل‌های دیگری از انرژی تبدیل می‌شود.

• انرژی پتانسیل گرانشی:

انرژی پتانسیل گرانشی سامانه‌ی متشکل از زمین و جسمی به جرم m که در ارتفاع h از سطح زمین قرار دارد به‌صورت زیر تعریف می‌شود:




❖ **نکته:** انرژی پتانسیل گرانشی، یک ویژگی مشترک جسم و زمین است و برای سامانه‌ی متشکل از این دو تعریف می‌شود. توجه

کنید که رابطه $U = mgh$ شامل هر دو ویژگی جسم (m) و زمین (مقدار g) است.

❖ **نکته:** اگر گلوله به‌اندازه‌ی Δh به سطح زمین نزدیک شود، انرژی پتانسیل گرانشی آن به‌اندازه‌ی $mg\Delta h$ کاهش می‌یابد


$(\Delta U = -mg\Delta h)$ و اگر به اندازه Δh از سطح زمین دور شود به اندازه $mg\Delta h$ افزایش می‌یابد $(\Delta U = +mg\Delta h)$.

همچنین در حالتی که جسم حرکت افقی دارد انرژی پتانسیل گرانشی آن تغییر نمی‌کند $(\Delta U = 0)$.



● **مبدأ انرژی پتانسیل گرانشی:** مبدأ انرژی پتانسیل گرانشی نقطه‌ای است که در آن جا $U = 0$ ($h = 0$) قرار داده می‌شود و انرژی پتانسیل گرانشی نقاط دیگر نسبت به آن نقطه سنجیده می‌شود که این نقطه کاملاً اختیاری است زیرا آن چه در فیزیک اهمیت دارد مقدار U در یک نقطه خاص نیست بلکه تنها تغییرات انرژی پتانسیل گرانشی (ΔU) بین دو نقطه مهم است. بنابراین می‌توانیم U را در نقطه‌ای که بخواهیم برابر صفر تعریف کنیم بدون آن که تأثیری در فیزیک مسئله داشته باشد.

◀ **نکته:** اگر جسم بالای مبدأ انرژی پتانسیل $(U = 0)$ قرار داشته باشد، انرژی پتانسیل گرانشی آن مثبت و در صورتی که زیر آن قرار گیرد انرژی پتانسیل گرانشی‌اش منفی است.



● کار و انرژی پتانسیل گرانشی:

تغییرات انرژی پتانسیل گرانشی یک جسم، منفی کار نیروی وزن است.


$$\Delta U = -W_{mg} \quad \text{یا} \quad W_{mg} = -\Delta U$$

◀ **نکته:** هنگامی که جسمی به جرم m توسط یک نیروی خارجی به آرامی و با تندی ثابت به اندازه Δh در راستای قائم جابه‌جا می‌شود (مانند جراثیل) کار انجام شده توسط نیروی خارجی (W_F) برابر تغییرات انرژی پتانسیل گرانشی جسم است.

$$\begin{cases} W_{mg} = -mg\Delta h \\ \Delta U = -W_{mg} = -(-mg\Delta h) = mg\Delta h \end{cases} \Rightarrow W_F = mg\Delta h$$

● کار و انرژی پتانسیل کشسانی سامانه‌ی فنر- فنر:

در صورتی که یک فنر از وضعیت تعادلش $(x = 0)$ به اندازه x فشرده یا کشیده شود نیرویی در خلاف جهت جابه‌جایی به عامل واردکننده‌ی نیرو وارد می‌شود، بنابراین کار نیروی فنر در این جابه‌جایی منفی و تغییرات انرژی پتانسیل کشسانی سامانه‌ی جسم- فنر مثبت است.



کار و انرژی پتانسیل

۹۷. با صرف ۱۰ ژول انرژی، وزنه‌ای به جرم یک کیلوگرم را تا ارتفاع چند متری می‌توان بالا برد؟ $(g = 10 \frac{N}{kg})$

(مکمل مثال ۲-۹ کتاب درسی)

۲۰ (۴)

۱۰ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

۹۸. موتورسواری به جرم کل 120 kg از بالای تپه‌ای کوتاه‌تر پرشی مطابق شکل روبه‌رو انجام می‌دهد. تغییرات پتانسیل گرانشی موتورسوار و کار نیروی وزن موتورسوار در این جابه‌جایی به ترتیب از راست به چپ کدام‌اند؟ (مشابه تمرین ۲-۱۲ کتاب درسی)



$$(g = 10 \frac{\text{N}}{\text{kg}})$$

① 54000 J و -54000 J

② -54000 J و 54000 J


③ 540000 J و -540000 J

④ -540000 J و 540000 J

۹۹. غواصی به جرم 70 kg در حال غواصی در یک دریاچه به عمق 60 m نسبت به سطح آزاد دریاچه است. تغییر انرژی پتانسیل

(مطابق با مثال ۲-۹ کتاب درسی)

گرانشی این غواص در فاصله 15 m تا کف دریاچه کدام است؟ $(g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2})$




① -10500

② -73500

③ 10500

④ 73500

۱۰۰. یک قطار بازی به جرم m مطابق شکل در یک مسیر بدون اصطکاک حرکت می‌کند تا با تندی V_0 به بالای نخستین تپه می‌رسد. نسبت انرژی پتانسیل سامانه قطار- زمین در نقطه‌ی B به انرژی پتانسیل گرانشی آن در نقطه‌ی A کدام است؟ (مکمل و مشابه تمرین ۲-۱۲ کتاب درسی)



(مبدأ انرژی پتانسیل گرانشی) $U_C = 0$

① $\frac{1}{2}$

② 2

③ 1

④ $\frac{1}{3}$

۱۰۱. یک جسم به وسیله جرثقیل به آرامی و با تندی ثابت، از سطح زمین تا ارتفاع معین بالا برده می‌شود، در این عمل: (مکمل تمرین ۲-۱۲ کتاب درسی)

① کار انجام شده صرف تغییر انرژی جنبشی جسم می‌شود.

② کار انجام شده به صورت انرژی پتانسیل در جسم ذخیره می‌شود.

③ انرژی جنبشی به انرژی پتانسیل تبدیل می‌شود.

④ انرژی پتانسیل جسم کاهش می‌یابد.

۱۰۲. اتومبیلی به جرم 1000 کیلوگرم توسط جرثقیل از روی یک بارکش به آرامی با تندی ثابت از ارتفاع 2 متری به سطح زمین انتقال

می‌یابد. تغییر انرژی پتانسیل اتومبیل در این عمل برابر است با: $(g = 9.8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2})$ (سراسری ریاضی ۶۲)


① صفر ② 2 کیلوژول ③ 19.6 کیلوژول ④ 2000 کیلوژول

۱۰۳. جسمی به وزن 500 نیوتون را روی سطح شیب‌داری که با افق زاویه‌ی 30° می‌سازد بالا می‌کشیم. اگر جابه‌جایی جسم روی سطح 4 متر باشد، افزایش انرژی پتانسیل آن چند ژول خواهد بود؟ (آزاد پزشکی ۶۷)

① 9800 ② 2000 ③ 1000 ④ $1000\sqrt{3}$

۱۰۴. در راستای قائم جسمی به جرم m از نقطه‌ی A به نقطه‌ی B می‌بریم، کار نیروی وزن در این جابه‌جایی -40 J است. اگر انرژی پتانسیل گرانشی جسم در نقطه‌ی B برابر 60 J باشد، انرژی پتانسیل آن در نقطه‌ی A چند ژول است؟

(مکمل تمرین ۷ کتاب درسی)



② -100

④ -20

① 100

③ 20

۱۰۵. شخصی با طناب سبکی، جسمی به جرم m را با شتاب ثابت $\frac{g}{4}$ از حال سکون از سطح زمین بالا می‌برد. هنگامی که جسم به

ارتفاع h می‌رسد، کاری که شخص انجام داده است، چند برابر انرژی پتانسیل گرانشی جسم در آن ارتفاع است؟

(سراسری ریاضی ۷۶)

④ $\frac{4}{3}$


③ $\frac{4}{5}$

② $\frac{5}{4}$

① $\frac{3}{4}$

۱۰۶. جسم کوچکی به جرم m مطابق شکل می‌تواند روی مسیر حلقه‌ای بدون اصطکاکی بلغزد. جسم از نقطه‌ی P واقع در ارتفاع $h = 5R$ از حال سکون رها می‌شود. نسبت تغییرات انرژی پتانسیل گرانشی جسم بین دو نقطه‌ی P و Q به کار نیروی وزن

(مشابه و مکمل مسئله ۷ کتاب درسی)



(مبدأ انرژی پتانسیل گرانشی) $U_C = 0$

① $\frac{3}{4}$

② $-\frac{3}{4}$

③ $\frac{4}{3}$

④ $-\frac{4}{3}$

۱۰۷. شخصی وزنه‌ای به جرم ۱ کیلوگرم را از سطح زمین تا ارتفاع ۲ متر بالا می‌برد و سپس آن را با تندی ۵ متر بر ثانیه پرتاب می‌کند،

(سراسری تجربی ۶۲ و ۶۳)

کار انجام شده توسط این شخص بر روی سنگ تقریباً برابر است با:

④ $32/5$ ژول

③ 20 ژول


② $14/5$ ژول

① $12/5$ ژول

۱۰۸. مطابق شکل، جسمی به جرم 5 kg با تندی $4 \frac{m}{s}$ روی سطح افقی بدون اصطکاکی می‌لغزد و پس از برخورد با فنری آن را

فشرده می‌کند. وقتی جسم توسط فنر به‌طور لحظه‌ای متوقف می‌شود، تغییرات انرژی پتانسیل کشسانی فنر چند ژول است؟

(مکمل و مشابه مثال ۲-۱۲ کتاب درسی)



① 4

② -4

③ 8

④ -8

● انرژی مکانیکی (E)

مجموع مقادیر انرژی‌های جنبشی و پتانسیل یک جسم را انرژی مکانیکی آن جسم (E) می‌نامند.

$$E = k + U$$

$$\left\{ \begin{array}{l} k = \frac{1}{2} m V^2 \\ U = U_{\text{گرانشی}} + U_{\text{فنر}} \end{array} \right.$$

$$U = U_{\text{گرانشی}} + U_{\text{فنر}}$$

● اصل پایستگی انرژی مکانیکی

اگر فرض کنیم نیروهای اتلاف‌کننده انرژی (مانند مقاومت هوا و اصطکاک) در طول مسیر حرکت جسم ناچیز باشند، آن‌گاه انرژی مکانیکی جسم در تمام نقاط مسیر مقدار یکسانی خواهد داشت و پایسته می‌ماند، این نتیجه اصل پایستگی انرژی مکانیکی نام دارد.

$$E_1 = E_2$$


◀ نکته: بیان ریاضی دیگری از اصل پایستگی انرژی مکانیکی به صورت زیر است:

$$k_1 + U_1 = k_2 + U_2 \Rightarrow k_2 - k_1 + U_2 - U_1 = 0$$

$$\Rightarrow \Delta k + \Delta U = 0 \Rightarrow \Delta k = -\Delta U \text{ یا } |\Delta k| = |\Delta U|$$

بنابراین اگر انرژی مکانیکی پایسته باشد همواره افزایش (کاهش) انرژی جنبشی جسم با کاهش (افزایش) انرژی پتانسیل آن همراه خواهد بود.

◀ **نکته:** اگر یک جسم در یک سطح بدون اصطکاک مطابق شکل به اندازه Δh سقوط کند، اندازه‌ی تندی آن از V_0 به $\sqrt{V_0^2 + 2g\Delta h}$ خواهد رسید.




اثبات:

$$\begin{aligned} E_A &= E_B \Rightarrow k_A + U_A = k_B + U_B \\ \Rightarrow \frac{1}{2}mV_0^2 + mgh_1 &= \frac{1}{2}mV_B^2 + mgh_2 \\ \Rightarrow \begin{cases} V_B = \sqrt{V_0^2 + 2g\Delta h} \\ \Delta h = h_1 - h_2 \end{cases} \end{aligned}$$

◀ **تذکره:** اگر جسم به اندازه Δh بالا رود، تندی آن کاهش یافته و به $\sqrt{V_0^2 - 2g\Delta h}$ می‌رسد.

◀ **نکته:** در شکل مقابل گلوله‌ای به جرم m ، به ریسمانی به طول L متصل است اگر گلوله با تندی V_0 از نقطه A شروع به حرکت کند، تندی در پایین‌ترین نقطه‌ی مسیر گلوله از رابطه $V = \sqrt{V_0^2 + 2gL(1 - \cos \alpha)}$ به دست می‌آید: (از مقاومت هوا صرف‌نظر شده است).




اثبات:

$$\begin{aligned} \begin{cases} V_B = \sqrt{V_0^2 + 2g\Delta h} \\ \Delta h = h_A = L - L \cos \alpha = L(1 - \cos \alpha) \end{cases} \\ \Rightarrow V_B = \sqrt{V_0^2 + 2gL(1 - \cos \alpha)} \end{aligned}$$

● پایستگی انرژی مکانیکی در مضمون فنر

در شکل زیر جسمی را در نظر بگیرید که با تندی V_1 روی یک سطح افقی بدون اصطکاک به یک فنر برخورد کرده و فنر تا جایی فشرده می‌شود که جسم برای یک لحظه ساکن شود (حداکثر فشرده‌گی) در این صورت بیش‌ترین انرژی پتانسیل کشسانی فنر برابر است با $U_{\max} = k_1$.

اثبات:



$$\begin{aligned} E_1 &= E_2 \Rightarrow k_1 + U_1 = k_2 + U_2 \\ \Rightarrow k_1 + 0 &= 0 + U_{\max} \\ \Rightarrow U_{\max} &= k_1 = \frac{1}{2}mV_1^2 \end{aligned}$$

◀ **تذکره:** کار نیروی فنر در این حالت برابر است با:

$$\begin{cases} W_{\text{فنر}} = -(\Delta U) = -(U_2 - U_1) = -(U_{\max} - 0) = -k_1 \\ U_{\max} = k_1 \end{cases} \Rightarrow W_{\text{فنر}} = -k_1 = -\frac{1}{2}mV_1^2$$

● انرژی درونی


انرژی درونی یک جسم، مجموع انرژی‌های ذره‌های تشکیل‌دهنده‌ی آن است.

◀ **نکته:** معمولاً با گرم شدن جسم، انرژی درونی آن بالا می‌رود.

◀ **نکته:** هر چه تعداد ذرات سازنده یک جسم بیش‌تر و انرژی هر ذره آن زیادتر باشد، انرژی درونی آن نیز بیش‌تر است.

● کار و انرژی درونی - بررسی تغییرات انرژی مکانیکی در اثر نیروهای تلف‌کننده انرژی

اگر در طی مسیر حرکت جسم، نیروهای اتلافی (اصطکاک و مقاومت هوا) به جسم وارد شوند، این نیروها روی جسم کار منفی انجام می‌دهند و بخشی از انرژی مکانیکی جسم را به انرژی درونی جسم، سطح مسیر و یا هوا تبدیل می‌کنند. اگر کار نیروهای اتلافی را با W_f نشان دهیم، داریم:



$$W_f = E_2 - E_1$$

◀ **نکته:** با گذشت زمان، انرژی مکانیکی جسم دائماً کاهش می‌یابد و پایسته نمی‌ماند زیرا نیروهای اتلافی به جسم وارد می‌شوند.

◀ **نکته:** در حضور نیروهای اتلافی رابطه بین ΔU و Δk برابر است با:

$$E_2 - E_1 = W_f \Rightarrow (U_2 + k_2) - (U_1 + k_1) = W_f$$

$$\Rightarrow U_2 - U_1 + k_2 - k_1 = W_f \Rightarrow \Delta k + \Delta U = W_f$$

● سامانه منزوی

به سامانه‌ای که نه از بیرون انرژی می‌گیرد و نه به بیرون انرژی می‌دهد سامانه منزوی گفته می‌شود.

● قانون پایستگی انرژی

در یک سامانه منزوی، مجموع کل انرژی پایسته است، نمی‌توان آن را خلق یا نابود کرد بلکه فقط از یک شکل به شکل دیگر تبدیل می‌شود.

◀ **تذکره:** قانون پایستگی انرژی بر اساس آزمایش‌های بی‌شماری بنا شده است و تاکنون هیچ مورد استثنایی برای آن یافته نشده است.

◀ **نکته:** قانون پایستگی انرژی بیانی از ثبات در طبیعت است. انرژی کل، کمیتی است که پایسته می‌ماند در حالیکه کمیت‌های دیگر می‌توانند تغییر کنند.

پایستگی انرژی مکانیکی

۱۰۹. جسمی به جرم یک کیلوگرم در شرایط خلأ، بدون تندی اولیه از ارتفاع h رها می‌شود. اگر انرژی جنبشی آن در نیمه‌ی مسیر ۲۰

ژول باشد، ارتفاع h چند متر است؟ ($g = 10 \frac{m}{s^2}$) (سراسری تجربی ۷۶)

- ① ۱/۵ ② ۲/۷۵ ③ ۶ ④ ۴

۱۱۰. جسم A به جرم m از ارتفاع ۱۰ متری سطح زمین و جسم B به جرم $2m$ از ارتفاع ۲۰ متری سطح زمین رها می‌شوند. انرژی جنبشی جسم B در لحظه‌ی رسیدن به زمین چند برابر انرژی جنبشی جسم A در لحظه‌ی رسیدن به زمین است؟ (از مقاومت هوا صرف‌نظر شود.) (سراسری خارج از کشور ۸۸)

- ① ۱ ② ۲ ③ ۴ ④ $\frac{1}{4}$

۱۱۱. گلوله‌ای به جرم ۵۰ گرم در شرایط خلأ با تندی V_0 از ارتفاع h پرتاب می‌شود. اگر انرژی جنبشی گلوله در لحظه‌ی رسیدن به سطح زمین ۱۰ ژول بیشتر از انرژی جنبشی آن در لحظه‌ی پرتاب باشد، h چند متر است؟ ($g = 10 m/s^2$) (آزاد ریاضی ۷۳)

- ① ۱۰ ② ۴۰ ③ ۵۰ ④ ۲۰

۱۱۲. جسمی به جرم m را با تندی $8 \frac{m}{s}$ در راستای قائم به طرف بالا پرتاب می‌کنیم. با نادیده گرفتن اتلاف انرژی، تندی جسم در

نیمه‌ی راه روبه بالا چند متر بر ثانیه است؟ ($g = 10 \frac{m}{s^2}$) (سراسری ریاضی ۸۸)

- ① ۶ ② ۴ ③ $4\sqrt{2}$ ④ $5\sqrt{2}$

۱۱۳. گلوله‌ای را با تندی اولیه $8 m/s$ به طور عمودی از ارتفاع ۱۰ متری پرتاب می‌کنیم. اگر شتاب گرانش زمین $9.8 m/s^2$ باشد، انرژی جنبشی گلوله در لحظه برخورد به زمین تقریباً چند برابر انرژی جنبشی آن در حالت اول است؟ (سراسری تجربی ۷۵)

- ① ۴ ② ۱/۲۵ ③ ۳ ④ ۲/۵


۱۱۴. بالنی با تندی ثابت $۲۰ \frac{m}{s}$ در راستای قائم در حال حرکت به سمت بالا است. هنگامی که بالن در ارتفاع ۱۰۰ متری سطح زمین قرار دارد گلوله‌ای از آن رها می‌شود، در لحظه‌ای که مقدار تندی گلوله نصف اندازه‌ی تندی آن در لحظه‌ی برخورد با زمین است، ارتفاع گلوله از سطح زمین چند متر است؟ ($g = ۱۰ \frac{N}{kg}$ و مقاومت هوا ناچیز است.) (آزمون کانون- چهارم تجربی- ۲۲ اسفند ۹۳)

- ۵۰ (۱) ۹۰ (۲) ۲۵ (۳) ۷۵ (۴)

۱۱۵. در شکل زیر، هواپیمای بمب افکنی که در ارتفاع ۲۰۰ متری با تندی $۹۰۰ km/h$ به طور افقی پرواز می‌کند، بمبی را رها می‌کند. اگر از مقاومت هوا صرف نظر شود، اندازه‌ی تندی بمب در لحظه‌ی برخورد به زمین تقریباً چند متر بر ثانیه

است؟ ($g = ۱۰ \frac{N}{kg}$)


- ۲۰۰ (۱) ۲۲۰ (۲) ۲۵۸ (۳) ۳۲۰ (۴)



۱۱۶. تویی مطابق شکل از سطح زمین با تندی $v_1 = ۴۰ \frac{m}{s}$ به طرف صخره‌ای پرتاب می‌شود. اگر توپ با تندی $V_2 = ۲۰ \frac{m}{s}$ به

بالای صخره برخورد کند، ارتفاع h_2 را به دست آورید. مقاومت هوا را هنگام حرکت توپ نادیده بگیرید. ($g = ۱۰ \frac{m}{s^2}$)

(خود را بیازماید ۲-۱۴)



- ۱۲۰ m (۱) ۶۰ m (۲) ۴۰ m (۳) ۸۰ m (۴)

۱۱۷. جسمی به جرم m بدون تندی اولیه در خلأ سقوط می‌کند، وقتی که تندی آن به V برسد:

- (۱) انرژی پتانسیل جسم به اندازه‌ی $\frac{1}{4} mV^2$ زیاد می‌شود.
(۲) انرژی پتانسیل جسم به اندازه‌ی $\frac{1}{4} mV^2$ کم می‌شود.
(۳) انرژی کل جسم به اندازه‌ی $\frac{1}{4} mV^2$ کم می‌شود.
(۴) انرژی کل جسم به اندازه‌ی $\frac{1}{4} mV^2$ زیاد می‌شود.

۱۱۸. گلوله‌ای در شرایط خلأ از سطح زمین با تندی اولیه‌ی $۳۰ \frac{m}{s}$ در امتداد قائم به طرف بالا پرتاب می‌شود. در چند متری سطح

زمین انرژی جنبشی گلوله نصف پتانسیل گرانشی آن است؟

- ۱۵ (۱) ۲۰ (۲) ۳۰ (۳) ۳۵ (۴)

۱۱۹. در شرایط خلأ و در راستای قائم از سطح زمین گلوله‌ای با تندی V_0 به بالا پرتاب می‌شود، در لحظه‌ای که تندی گلوله به $\frac{V_0}{5}$

می‌رسد، انرژی پتانسیل گلوله چه کسری از انرژی مکانیکی آن است؟

- $\frac{24}{25}$ (۱) $\frac{4}{5}$ (۲) $\frac{1}{5}$ (۳) $\frac{1}{25}$ (۴)


۱۲۰. جسمی به جرم $۲ kg$ را با تندی $۱۰ m/s$ در راستای قائم رو به بالا پرتاب می‌کنیم. انرژی مکانیکی جسم در نصف ارتفاع اوج

چند ژول است؟ (مبدأ پتانسیل گرانشی، محل پرتاب فرض شده است.)

- $۲۵\sqrt{2}$ (۱) ۵۰ (۲) $۵۰\sqrt{2}$ (۳) ۱۰۰ (۴)

۱۲۱. گلوله‌ای را با تندی اولیه‌ی v_0 از سطح زمین در راستای قائم به سمت بالا پرتاب می‌کنیم. اگر مقاومت هوا ناچیز باشد، نمودار انرژی جنبشی گلوله (K) بر حسب انرژی پتانسیل گرانشی آن (U) از لحظه‌ی پرتاب تا لحظه‌ای که گلوله به حداکثر ارتفاع خود از سطح زمین می‌رسد، مطابق کدام گزینه است؟ (سطح زمین را مبدأ انرژی پتانسیل گرانشی در نظر بگیرید.)

(آزمون کانون - چهارم تجربی - ۲۲ اسفند ۹۳)



۱۲۲. در شرایط خلأ، جسمی بدون تندی اولیه از ارتفاع معینی از سطح رها می‌شود. نمودار تغییرات انرژی جنبشی (K) و انرژی

(آزمون کانون - چهارم تجربی ۹۰)

مکانیکی جسم (E)، بر حسب اندازه‌ی جابه‌جایی آن (d)، کدام است؟



۱۲۳. چنانچه کار برآیند نیروهای وارد بر جسمی در یک مسیر برابر صفر باشد، در این صورت کدام نتیجه‌گیری صحیح است؟

(سراسری تجربی ۸۸)

① برآیند نیروهای وارد بر جسم نیز لزوماً در آن مسیر صفر است.

② انرژی مکانیکی جسم در آن جابه‌جایی ثابت می‌ماند.


③ مجموع کار نیروهای وارد بر جسم نیز در آن جابه‌جایی برابر صفر است.

④ در آن مسیر، انرژی مکانیکی جسم، ثابت است و برآیند نیروهای وارد بر جسم لزوماً صفر نیست.

۱۲۴. در شکل زیر، وزنه‌ی 2 kg از حال سکون به حرکت درمی‌آید. اگر اصطکاک ناچیز باشد، انرژی جنبشی وزنه در لحظه‌ی رسیدن

به سطح افقی به چند ژول می‌رسد؟ ($g = 10 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$)

(آزاد تجربی ۸۰)



① ۱۰۰

② ۵۰

③ ۲۰

④ ۲۰۰

۱۲۵. دو جسم A و B بر روی دو سطح شیب‌دار بدون اصطکاک که به ترتیب با سطح افق زوایای 30° و 60° درجه می‌سازند، از

یک ارتفاع، بدون تندی اولیه رها می‌شوند و با تندی‌های V_A و V_B به پایین سطح می‌رسند. در این صورت نسبت $\frac{V_A}{V_B}$ برابر

(سراسری ریاضی ۶۲)

است با:

① $\sqrt{3}$

② ۱

③ $\frac{\sqrt{3}}{2}$

④ $\frac{\sqrt{3}}{3}$

۱۲۶. دو جسم با جرم‌های m و $2m$ از بالای دو سطح شیب‌دار بدون اصطکاک که با افق زاویه‌های 30° و 45° می‌سازند از ارتفاع

یکسان نسبت به سطح افق رها می‌شوند، در لحظه‌ی رسیدن به سطح افق انرژی جنبشی جسم سبک‌تر چند برابر انرژی جنبشی

(آزاد ریاضی ۷۰)

جسم دیگر است؟


① $\frac{1}{2}$

② $\frac{1}{4}$

③ ۲

④ ۴

۱۲۷. گلوله‌ای به جرم ۱۰۰ گرم به انتهای نخ‌ی به طول $\frac{2}{5}$ متر آویزان است. اگر گلوله را 60° از وضع تعادل منحرف و رها کنیم، بیشینه‌ی تندی آن چند متر بر ثانیه خواهد شد؟ (مقاومت هوا ناچیز و $g = 10 \text{ N/kg}$ فرض شود). (آزاد ریاضی ۷۷)



۲/۵ ①

۸ ②

۴ ③

۵ ④

۱۲۸. طول دو آونگ A و B با هم برابر و جرم گلوله‌ی A دو برابر جرم گلوله‌ی B است. اگر هریک از آنها را به اندازه‌ی 45° منحرف و رها سازیم، در لحظه عبور از وضع تعادل، تندی گلوله‌ی A چند برابر تندی گلوله‌ی B است؟ (اصطکاک ناچیز است). (آزاد ریاضی - ۶۹)

۱ ④


۲ ③

$\sqrt{2}$ ②

$\frac{\sqrt{2}}{2}$ ①

۱۲۹. مطابق شکل زیر، آونگی به طول $\frac{1}{25}$ متر، با تندی v از وضعیت نشان داده شده (نقطه‌ی A) عبور می‌کند. کم‌ترین مقدار v چند متر بر

ثانیه باشد، تا ریسمان بتواند به وضعیت افقی برسد؟ (از مقاومت هوا صرف نظر شود، $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ و $\sin 37^\circ = 0.6$) (سراسری تجربی ۹۳)



۲ ①

$2\sqrt{5}$ ②

$\sqrt{5}$ ③

۴ ④

۱۳۰. آونگی به طول $\frac{1}{6}$ متر در حال نوسان است. وقتی گلوله‌ی آونگ از پایین‌ترین نقطه‌ی مسیر می‌گذرد، تندیش 4 m/s است.

زاویه‌ی راستای نخ با خط قائم وقتی گلوله به بالاترین نقطه‌ی مسیر می‌رسد، چند درجه است؟ ($g = 10 \text{ m/s}^2$ و مقاومت هوا ناچیز است).

(خارج از کشور ریاضی ۸۷)



۴۵ ①

۳۰ ②

۶۰ ③

۹۰ ④

۱۳۱. در شکل زیر، گلوله‌ی آونگ از نقطه‌ی A رها می‌شود و با تندی v از پایین‌ترین نقطه‌ی مسیر می‌گذرد. هنگامی که با تندی

گلوله به $\frac{\sqrt{2}}{2} v$ می‌رسد، زاویه‌ی نخ با راستای قائم چند درجه است؟ (از مقاومت هوا صرف نظر شود، $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ و

(سراسری ریاضی ۹۲)


$(\cos 53^\circ = 0.6)$

۶۰ ①

۴۵ ②

۳۷ ③

۳۰ ④



۱۳۲. آونگ ساده‌ای به طول یک متر را 60° منحرف کرده رها می‌کنیم. نخ آونگ پس از عبور از وضع تعادل در نقطه‌ی O' که 50°

سانتی‌متر زیر O است به میخی برخورد می‌کند. اگر مقاومت هوا ناچیز باشد، زاویه‌ی انحراف در طرف دیگر آونگ چند درجه

(سراسری ریاضی ۶۴)


است؟

۳۰ ①


۶۰ ②

۹۰ ③

۱۲۰ ④



۱۳۳. مطابق شکل، اربابه‌ای به جرم m از نقطه‌ی A با تندی ۲ متر بر ثانیه می‌گذرد، تندی آن هنگام عبور از نقطه‌ی B چند متر بر ثانیه است؟ (از اصطکاک صرف‌نظر شود $g = ۱۰ \text{ m/s}^2$) (سراسری ریاضی ۸۶)




۴ ۱

۸ ۲

$\sqrt{۴۶}$ ۳

بستگی به جرم m دارد. ۴

۱۳۴. در شکل روبه‌رو اصطکاک ناچیز است و اربابه بدون تندی اولیه از حالت A رها می‌شود. نسبت تندی اربابه در حالت B به تندی آن در حالت C کدام است؟ (سراسری ریاضی ۹۱)




۲ ۱

۳ ۲

$\sqrt{۲}$ ۳

$\sqrt{۳}$ ۴

۱۳۵. درون حلقه‌ی شیاردار به شعاع r که در سطح قائم نگه داشته شده است گلوله‌ی کوچکی می‌تواند بدون اصطکاک حرکت کند. اگر به این گلوله در نقطه‌ی A تندی‌ای برابر $V = \sqrt{۲gr}$ داده شود (مطابق شکل) تا چه نقطه‌ای می‌تواند درون شیار حلقه بالا رود؟ (سراسری ریاضی ۶۲)




۱ تا نقطه‌ی B (وسط AC)

۲ تا نقطه‌ی C

۳ تا نقطه‌ی D (وسط CE)

۴ تا نقطه‌ی E

۱۳۶. به دو سر میله‌ی سبکی دو گلوله هریک به جرم m متصل است. میله مطابق شکل می‌تواند حول نقطه‌ی O بدون اصطکاک در سطح قائم بچرخد. میله را از وضع افقی رها می‌کنیم، لحظه‌ای که به وضع قائم درمی‌آید، مجموع انرژی جنبشی گلوله‌ها چه قدر است؟ (آزاد ریاضی ۷۷)



۱ $\frac{1}{3}mgL$ ۲ $\frac{1}{6}mgL$

۳ $\frac{1}{4}mgL$ ۴ $\frac{3}{2}mgL$

انرژی درونی - تغییرات انرژی مکانیکی در حضور نیروهای اذاف‌کننده انرژی

(مکمل پرسش ۲-۵ کتاب درسی)

۱۳۷. انرژی ... یک جسم، ... آن است.

۱ جنبشی - متناسب با سرعت

۲ درونی - مجموع انرژی‌های پتانسیل ذره‌های تشکیل‌دهنده

۳ پتانسیل گرانشی - متناسب با تندی

۴ مکانیکی - مجموع انرژی پتانسیل گرانشی و کشسانی

(سراسری تجربی ۶۲)

۱۳۸. جسمی که در هوا سقوط می‌کند:

۱ تمام انرژی مکانیکی آن به گرما تبدیل می‌شود.

۲ انرژی مکانیکی آن مرتباً کاهش می‌یابد.

۳ تمام انرژی مکانیکی آن همواره ثابت می‌ماند.

۴ کاهش انرژی پتانسیل آن برابر گرمایی است که تولید می‌شود.

۱۳۹. قطاری با تندی ۵۴ km/h در حال حرکت است. یک تکه گل به جرم ۴۰۰ g با تندی ۲۰ m/s به‌طور افقی به‌طرف قطار پرت کرده و به آن می‌چسبد. اتلاف انرژی تکه گل چند ژول است؟ (سراسری ریاضی ۶۹)

۱۷/۵ ۴

۳۵ ۳

۷۰ ۲

۱۴۰ ۱

۱۴۰. از بالونی که در ارتفاع ۵۰ متری سطح زمین و با تندی $\frac{m}{s}$ ۶ در حال بالا رفتن است، وزنه‌ای به جرم 10 kg رها می‌شود و این وزنه

با تندی $\frac{m}{s}$ ۲۰ به زمین برخورد می‌کند. از لحظه‌ی رها شدن وزنه تا هنگام رسیدن آن به زمین، نیروی مقاومت هوا چند ژول کار

روی وزنه انجام می‌دهد؟ ($g = 10 \frac{N}{kg}$) (مشابه با مثال ۲-۱۵ کتاب درسی)

- ① ۱۱۸۰ ② -۱۱۸۰ ③ ۳۱۸۰ ④ -۳۱۸۰

۱۴۱. جسمی به جرم ۲ کیلوگرم را از ارتفاع ۵ متری رها می‌کنیم و جسم با تندی ۸ متر بر ثانیه به زمین می‌رسد. کار نیروی مقاومت

هوا چند ژول است؟ ($g = 10 \text{ N/kg}$) (سراسری تجربی ۷۷)

- ① -۶۴ ② -۳۶ ③ ۳۶ ④ ۶۴

۱۴۲. جسمی بدون تندی اولیه از ارتفاع ۴ متری سقوط می‌کند. اگر ۲۰٪ انرژی جسم برای جبران مقاومت هوا تلف شود، تندی جسم

در لحظه رسیدن به زمین چند متر بر ثانیه است؟ ($g = 10 \text{ m/s}^2$) (سراسری تجربی ۶۶)

- ① ۴ ② $4\sqrt{2}$ ③ ۸ ④ ۹

۱۴۳. گلوله‌ای به جرم ۱۰۰ گرم از ارتفاع ۱۰ متری سطح زمین با تندی $\frac{m}{s}$ ۲ به طور قائم روبه پایین پرتاب می‌شود. اگر کار نیروی

مقاومت هوا در طول مسیر، -2 J باشد، انرژی جنبشی گلوله در لحظه‌ی برخورد به زمین چند ژول است؟ ($g = 10 \frac{m}{s^2}$)

(سراسری خارج از کشور ۸۹)

- ① ۸ ② $8/2$ ③ $10/2$ ④ $12/2$

۱۴۴. کاهش انرژی پتانسیل جسمی بر اثر سقوط از ارتفاع ۶ متری، ۴۰ ژول و افزایش انرژی جنبشی آن، ۲۵ ژول است. متوسط نیروی

مقاومت هوا در برابر حرکت جسم چند نیوتون است؟ (سراسری ریاضی ۷۷)

- ① $2/5$ ② ۱۵ ③ ۲۵ ④ ۹۰

۱۴۵. توپی به جرم ۲۰۰ گرم را با تندی ۱۰ متر بر ثانیه در راستای قائم به طرف بالا پرتاب می‌کنیم. تندی توپ موقع رسیدن به نقطه

پرتاب ۹ متر بر ثانیه است. چند ژول گرما به محیط و توپ داده شده است؟ (سراسری تجربی ۶۹)

- ① $1/9$ ② ۱۹ ③ ۳۸ ④ ۱۹۰۰

۱۴۶. گلوله‌ای را از سطح زمین با تندی $\frac{m}{s}$ ۴۰ در راستای قائم به سمت بالا پرتاب می‌کنیم. اگر گلوله با تندی $\frac{m}{s}$ ۲۰ به نقطه‌ی

پرتاب بازگردد و کار نیروی مقاومت هوا در مسیری که گلوله از سطح زمین دور می‌شود، دو برابر کار نیروی مقاومت هوا در

مسیری که گلوله با سطح زمین نزدیک می‌شود باشد، گلوله حداکثر تا چه ارتفاعی از سطح زمین بالا می‌رود؟ ($g = 10 \frac{N}{kg}$)

(آزمون کانون ۹۱)

- ① ۶۰ ② ۲۰ ③ ۵۰ ④ ۴۰

۱۴۷. توپی به جرم 45 kg مطابق شکل با تندی $V_1 = 8 \frac{m}{s}$ از نقطه‌ی A می‌گذرد. نیروی مقاومت هوا و نیروی اصطکاک بین

سطح تماس توپ با زمین، ۲۰ درصد انرژی جنبشی توپ را تارسیدن به نقطه‌ی B تلف می‌کنند. تندی توپ را در این نقطه به دست آورید. (خود را بیازمایید ۲-۱۵ کتاب درسی)



- ① $7/1 \frac{m}{s}$ ② $4/1 \frac{m}{s}$
③ $6/1 \frac{m}{s}$ ④ $5/1 \frac{m}{s}$

۱۴۸. جسمی به جرم 2 kg روی سطح شیب‌داری که با سطح افق زاویه‌ی 30° می‌سازد، با تندی ثابت رو به پایین می‌لغزد. اگر در این


حرکت جسم به اندازه‌ی ۲ متر جابه‌جا شود، کار نیروی اصطکاک چند ژول است؟ ($g = 10 \frac{m}{s^2}$) (سراسری ریاضی ۹۴)

- ① $-20\sqrt{3}$ ② $-10\sqrt{3}$ ③ -۱۰ ④ -۲۰

۱۴۹. در شکل روبه‌رو، جسم از بالاترین نقطه‌ی سطح شیب‌دار بدون تندی اولیه رها می‌شود. اگر نیروی اصطکاک جنبشی در طول

مسیر 4 N باشد، تندی جسم در لحظه‌ی رسیدن به پایین سطح چند متر بر ثانیه خواهد شد؟ $(\sin 37^\circ = 0.6, g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2})$

(سراسری خارج از کشور تجربی ۹۴)



① $4\sqrt{5}$

② $4\sqrt{10}$


③ $2\sqrt{5}$

④ $2\sqrt{10}$

۱۵۰. جسمی به جرم 2 kg را مطابق شکل با تندی اولیه‌ی $5 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ مماس بر سطح رو به پایین پرتاب می‌کنیم. اگر تندی جسم پس از

12 متر جابه‌جایی روی سطح به $8 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ برسد، کار نیروی اصطکاک چند ژول است؟ $(g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2})$

(سراسری ریاضی ۸۵ - سراسری تجربی ۷۱)



① -42

② -45

③ -63

④ -81

۱۵۱. جسمی به جرم 1 kg با تندی اولیه $6 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ از پایین سطح شیب‌داری که با افق زاویه‌ی 37° می‌سازد، به طرف بالا پرتاب می‌شود.

هنگامی که جسم روی سطح شیب‌دار 2 متر را رو به بالا طی می‌کند، تندی‌اش به $2 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ می‌رسد. انرژی مکانیکی جسم در این

جابه‌جایی چند ژول کاهش می‌یابد؟ $(\sin 37^\circ = 0.6, g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2})$ از مقاومت هوا صرف‌نظر شود.

(سراسری تجربی ۹۲)

① 16

② 8

③ 6

④ 4

۱۵۲. جسمی به جرم 5 Kg از بالای سطح شیب‌داری که با سطح افقی زاویه‌ی 30° می‌سازد از حال سکون به پایین می‌لغزد. اگر

طول سطح شیب‌دار 2 متر باشد و 0.2 انرژی پتانسیل گرانشی جسم به گرما تبدیل شود، جسم با تندی چند m/s به پایین

سطح می‌رسد؟ $(g = 10 \text{ m/s}^2)$

(آزاد ریاضی بعدازظهر ۸۵)

① 4

② 3

③ 2


④ 1

۱۵۳. مطابق شکل زیر، در شرایط خلأ جسمی را از نقطه‌ی A و از حالت سکون رها می‌کنیم تا روی یک سطح شیب‌دار بدون

اصطکاک به نقطه‌ی B برسد و در نقطه‌ی B وارد یک مسیر افقی به ضریب اصطکاک جنبشی μ_k شود. اگر جسم در نقطه‌ی

C متوقف شود و $\overline{BC} = 2\overline{AB}$ باشد، مقدار μ_k کدام است؟

(آزمون کانون - چهارم ریاضی - ۲۱ آذر ۹۳)



① $\frac{1}{3}$

② $\frac{1}{5}$

③ $\frac{1}{2}$


④ $\frac{1}{4}$

۱۵۴. گلوله‌ای به جرم 200 گرم از نقطه‌ی A رها می‌شود و پس از برخورد به فنری در سطح افقی آن را متراکم می‌کند. اگر کار نیروی

اصطکاک در مسیر AB برابر -2 J باشد و سطح افقی بدون اصطکاک باشد. حداکثر انرژی پتانسیل کشسانی فنر چند ژول خواهد

شد؟ $(g = 10 \text{ m/s}^2)$

(سراسری تجربی ۸۶)



① 8

② 12

③ 1

④ 10

● توان

توان کمیتی است نرده‌ای و به‌صورت آهنگ انجام کار (یا کار انجام شده در واحد زمان) تعریف می‌شود. هنگامی که کار W در بازه‌ی زمانی Δt انجام می‌شود، کار انجام شده در واحد زمان یا توان متوسط P_{avg} به‌صورت زیر بیان می‌شود:

$$P_{avg} = \frac{W}{\Delta t} \quad \begin{cases} W : (J) \text{ کار انجام شده بر حسب ژول} \\ \Delta t : (s) \text{ بازه‌ی زمانی انجام کار بر حسب ثانیه} \\ P_{avg} : (W) \text{ توان بر حسب ژول بر ثانیه یا وات} \end{cases}$$

◀ **نکته:** یکای توان در SI، وات (W) است و مطابق تعریف آن، یک وات برابر است با یک ژول بر ثانیه ($1W = \frac{1J}{1s}$). یکاهای

بزرگ‌تر توان مانند کیلووات (kW) و مگاوات (MW) نیز مرسوم است.

$$1 kW = 10^3 W$$

$$1 MW = 10^6 W$$

◀ **تذکره:** در فیزیک، سریع انجام گرفتن کار بر حسب توان توصیف می‌شود، بنابراین توان یک ماشین معیاری برای توصیف کندتر یا سریع‌تر انجام گرفتن یک کار است.

◀ **نکته:** اگر یک متحرک با تندی ثابت V در یک مسیر مستقیم حرکت کند، توان نیروی ثابت F که بر این متحرک وارد می‌شود برابر است با:

$$\begin{cases} W = Fd \cos \theta \\ d = Vt \end{cases} \Rightarrow P = \frac{W}{t} = \frac{FVt \cos \theta}{t} \Rightarrow P = FV \cos \theta$$

که θ زاویه‌ی بین نیروی F و جهت حرکت متحرک است.

● بازده

هر سامانه‌ای فقط بخشی از انرژی ورودی (انرژی مصرفی سامانه) را به انرژی موردنظر ما تبدیل می‌کند. بنابراین تنها بخشی از انرژی ورودی قابل استفاده است که به آن انرژی خروجی یا کار مفید گفته می‌شود، نسبت انرژی خروجی به انرژی ورودی را بازده می‌نامیم.

$$100 \times \frac{\text{انرژی خروجی}}{\text{انرژی ورودی}} = \text{بازده بر حسب درصد}$$

◀ **تذکره:** معمولاً بازده هر سامانه را بر حسب درصد بیان می‌کنند که همواره عددی کوچک‌تر از ۱۰۰ است.

◀ **نکته:** بازده را به‌صورت نسبت توان مفید به کل کار یا توان ورودی نیز تعریف می‌کنند.

$$100 \times \frac{P_{\text{خروجی}}}{P_{\text{ورودی}}} = \frac{P_{\text{مفید}}}{P_{\text{کل}}} = \text{بازده بر حسب درصد}$$

◀ **نکته:** کار یا توان تلف شده از روابط زیر به دست می‌آیند:

$$W_{\text{تلف شده}} = W_{\text{کل}} - W_{\text{مفید}}$$

$$P_{\text{تلف شده}} = P_{\text{کل}} - P_{\text{مفید}}$$

◀ **نکته:** بازده را می‌توان به‌صورت‌های زیر نیز بیان کرد:

$$\text{بازده بر حسب درصد} = \frac{W_{\text{کل}} - W_{\text{تلف}}}{W_{\text{کل}}} \times 100 = \left(1 - \frac{W_{\text{تلف}}}{W_{\text{کل}}}\right) \times 100 = \frac{W_{\text{مفید}}}{W_{\text{مفید}} + W_{\text{تلف}}} \times 100$$

$$\text{بازده بر حسب درصد} = \frac{P_{\text{کل}} - P_{\text{تلف}}}{P_{\text{کل}}} \times 100 = \left(1 - \frac{P_{\text{تلف}}}{P_{\text{کل}}}\right) \times 100 = \frac{P_{\text{مفید}}}{P_{\text{مفید}} + P_{\text{تلف}}} \times 100$$

◀ **تذکره:** یکی از واحدهای متداول توان، اسب بخار (hp) است که هر اسب بخار معادل با ۷۴۶ وات می‌باشد.

۱۵۵. ژول بر ثانیه معادل با واحد کدام کمیت فیزیکی است؟

- ① انرژی ② کار ③ توان ④ شتاب

۱۵۶. یک پمپ الکتریکی در هر دقیقه ۱۲۰۰ کیلوگرم آب را به سطحی به ارتفاع ۵۰ متر می‌رساند. توان پمپ چند وات است؟
($g = 10 \text{ N/kg}$)

- ① ۱۰۳ ② ۱۰۴ ③ ۲۴۰ ④ ۲۴۰۰

۱۵۷. کوهنوردی که جرمش ۶۰ کیلوگرم است در مدت ۲۰ دقیقه از دامنه‌ی کوهی بالا می‌رود. اگر اختلاف ارتفاع دو نقطه‌ی شروع و پایان حرکت او ۵۰۰ متر باشد، توان متوسط وی در غلبه بر نیروی وزنش چند وات است؟ ($g = 10 \text{ N/kg}$) (آزاد ریاضی ۶۵)

- ① ۱۵۰۰ ② ۱۲۰۰ ③ ۲۵۰ ④ ۱۵۰

۱۵۸. شخصی به جرم ۷۵ کیلوگرم از طریق پلکان یک ساختمان ۵ طبقه که ارتفاع هر طبقه‌ی آن ۳ متر است، در مدت ۲۰ ثانیه از طبقه‌ی همکف به طبقه‌ی آخر ساختمان می‌رسد، توان متوسط این شخص تقریباً چند کیلووات است؟ ($g = 10 \text{ N/kg}$)

(سراسری تجربی ۶۴)

- ① ۵/۶۲ ② ۵/۶۲ ③ ۵۶/۲ ④ ۵۶۲

۱۵۹. آسانسوری با تندی ثابت، ۱۰ نفر مسافر را در مدت ۳ دقیقه به اندازه‌ی ۸۰ متر در راستای قائم بالا می‌برد. اگر جرم متوسط هر

مسافر ۸۰ kg و جرم آسانسور ۱۰۰۰ kg باشد، توان متوسط موتور آسانسور چند کیلووات است؟ ($g = 10 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$)

(مشابه و مکمل مثال ۲-۱۷ کتاب درسی)

- ① ۸۰۰/۳ ② ۴/۹ ③ ۸ ④ ۲۱۳

۱۶۰. یک موتور الکتریکی جسمی به جرم ۲۰۰ کیلوگرم را در مدت ۵۰ ثانیه در راستای قائم با تندی ثابت ۱۲ متر بر ثانیه بالا می‌برد.

(آزاد غیرپزشکی ۸۹ و آزاد ریاضی ۸۴)

توان این موتور چند کیلووات است؟ ($g = 10 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$)

- ① ۲۴ ② ۲۴۰ ③ ۴۸ ④ ۴۸۰

۱۶۱. هواپیمای ایرباس A۳۲۰ به جرم $8 \times 10^4 \text{ kg}$ در امتداد باند هواپیما از حال سکون شروع به حرکت می‌کند و پس از گذشت ۲۰

ثانیه با تندی $360 \frac{\text{km}}{\text{h}}$ از روی باند به پرواز درمی‌آید، توان موتور این هواپیما چند مگاوات است؟

(مشابه با تمرین ۱۹ پایان فصل کتاب درسی)

- ① ۲۰ ② ۲۰۰ ③ ۲۵/۹ ④ ۲۵۹

۱۶۲. هر یک از دو موتور جت یک هواپیمای مسافربری بوئینگ ۷۶۷، پیشراندهای (نیروی) که به هواپیما به طرف جلو وارد می‌شود) برابر

$3 \times 10^5 \text{ N}$ ایجاد می‌کند. اگر هواپیما در هر دقیقه $8/22 \text{ km}$ در امتداد پیشرانه حرکت کند، توان متوسط هر یک از

موتورهای هواپیما چند اسب بخار است؟ ($1 \text{ hp} = 746 \text{ W}$) (مشابه خود را ببازماید ۱۶-۲ کتاب درسی)

- ① ۶۸/۵ hp

- ② ۶۸۵۰ hp

- ③ ۶۸۵۰۰ hp

- ④ ۶۸۵۰۰۰ hp



۱۶۳. یک موتور برقی، در یک کابل جرثقیل کششی برابر ۴۵۰۰ نیوتون ایجاد می‌کند و آن را با تندی ثابت $2 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ به دور قرقره‌اش

(آزمون کانون-چهارم تجربی-۲۲ اسفند ۹۳)

- می‌پیچد. توان این موتور چند کیلووات است؟

- ① ۱/۵ ② ۲/۲۵ ③ ۴/۵ ④ ۹

۱۶۴. موتوری با توان ۱۰ کیلووات نیروی ۲۵۰۰ نیوتون را به جسمی وارد می‌کند و آن را با تندی ثابت حرکت می‌دهد. در این حالت

(سراسری تجربی ۷۴ و سراسری تجربی ۶۳)

تندی جسم چند متر بر ثانیه است؟

- ① ۰/۴ ② ۲/۵ ③ ۴ ④ ۵

۱۶۵. یک قایق موتوری با صرف توان ۲/۴ کیلووات با تندی ثابت ۱۰ متر بر ثانیه بر روی آب حرکت می‌کند. نیروی مقاومت آب در

(سراسری ۶۳)

مقابل حرکت قایق برحسب نیوتون برابر است با:

- ① ۰/۲۴ ② ۲۴ ③ ۲۴۰ ④ ۲۴۰۰

۱۶۶. اتومبیلی به جرم یک تن با تندی ثابت 54 km/h در حرکت است. اگر توان موتور آن $7/5$ کیلووات باشد، برایند نیروهای مقاوم

(آزاد پزشکی ۷۷)

در مقابل حرکت اتومبیل چند نیوتون است؟

- ① ۵۰۰ ② ۵۰ ③ ۷۲ ④ ۱۱۲/۵

۱۶۷. در آزادراه تهران- کرج، خودرویی به جرم $1/4 \times 10^3 \text{ kg}$ برای سبقت گرفتن از یک کامیون، در مدت زمان ۷s تندی خود را از $14 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ به $24 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ تغییر داده است. حداقل توان متوسط خودرو برای انجام این کار چند کیلووات است؟

(مشابه با مثال ۲-۱۶ کتاب درسی)

- ۳۸ ① ۳۸۰ ② ۷۶ ③ ۷۶۰ ④

۱۶۸. اتومبیلی به جرم 900 kg در یک جاده‌ی افقی روی خط راست از حال سکون شروع به حرکت می‌کند و پس از ۱۰s تندی آن به $72 \frac{\text{km}}{\text{h}}$ می‌رسد. توان متوسط اتومبیل چند کیلووات است؟ (نیروی مقاوم در مقابل حرکت اتومبیل را نادیده بگیرید).

(سراسری ریاضی ۸۱)

- ۹ ① ۱۸ ② ۳۰ ③ ۳۶ ④


۱۶۹. پمپ یک ماشین آتش‌نشانی در هر یک دقیقه ۷۵ کیلوگرم آب را با تندی ۲۰ متر بر ثانیه از دهانه‌ی لوله‌ای به خارج می‌فرستد. توان مفید پمپ برحسب کیلووات برابر است با؛

(سراسری تجربی ۶۲)

- ۰/۲۵ ① ۱/۵۰ ② ۲/۵۰ ③ ۳/۰۰ ④

۱۷۰. در شکل زیر، وزنه‌ی M که اصطکاک آن با سطح ناچیز است، از حال سکون به حرکت در می‌آید و در مدت ۵ ثانیه ۱۰ متر روی سطح افقی جابه‌جا می‌شود. متوسط توان مفید چند وات است؟

(آزاد پزشکی ۸۲)



- ۵۰√۳ ① ۲۵√۳ ② ۵۰ ③ ۲۵ ④

۱۷۱. مصرف بنزین خودرویی که با تندی $90 \frac{\text{km}}{\text{h}}$ حرکت می‌کند، در هر 100 km ۶ لیتر است. انرژی شیمیایی موجود در هر لیتر بنزین $3/5 \times 10^7 \text{ J}$ است. ۶۵ درصد انرژی ناشی از سوختن بنزین در این خودرو از طریق اگزوز و دستگاه خنک‌کننده‌ی موتور مستقیماً به هوا داده می‌شود و ۱۵ درصد از انرژی در دستگاه تهویه، در دینام و در اثر اصطکاک بین اجزای موتور مصرف می‌شود. توان مفید این خودرو تقریباً چند اسب بخار است؟ ($1 \text{ hp} = 746 \text{ W}$)

(مکمل پرسش ۲۲ کتاب درسی)

- ۱۴ ① ۱۲ ② ۱۰ ③ ۱۱ ④

بازده

۱۷۲. توان مصرفی یک موتور الکتریکی ۴۰۰ وات و بازده آن ۷۵٪ است. در هر دقیقه چند کیلوژول انرژی الکتریکی در آن به انرژی گرمایی تبدیل می‌شود؟

(سراسری ریاضی ۷۳)

- ۱/۴۴ ① ۴ ② ۴/۳۲ ③ ۶ ④

۱۷۳. توان یک تلمبه‌ی برقی ۲ کیلووات و بازده آن ۹۵٪ است. این تلمبه در هر دقیقه چند کیلوگرم آب را از عمق ۹/۵ متر بالا می‌آورد؟ ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

(مشابه با مثال ۲-۱۵ کتاب درسی) (سراسری تجربی ۷۳)

- ۱/۲×۱۰⁴ ① ۱/۲×۱۰³ ② ۲۰۰ ③ ۲۰ ④

۱۷۴. توان یک ماشین ساده ۲۰۰ وات و بازده آن ۸۰٪ است. چند ثانیه طول می‌کشد تا باری به وزن ۴۰۰ نیوتون را با این ماشین ۱۰ متر بالا ببریم؟

(سراسری ریاضی ۶۷)

- ۱۶ ① ۲۰ ② ۲۴ ③ ۲۵ ④

۱۷۵. مولد A نسبت به مولد B دارای توان کم‌تر ولی بازده بیش‌تر است. این بدان معنی است که مولد A نسبت به مولد B با مقدار سوخت مساوی کار ... انجام می‌دهد.

(سراسری ریاضی ۷۲)

- بیش‌تر و در زمان بیش‌تر ① بیش‌تر و در زمان کم‌تر ②

- کم‌تر و در زمان کم‌تر ③ کم‌تر و در زمان بیش‌تر ④


۱۷۶. یک ماشین برای بالا بردن یک جسم ۲ کیلوگرمی از سطح زمین به ارتفاع معین ۱۰۰ ژول انرژی مصرف کرده است. اگر جسم از این ارتفاع در شرایط خلاء سقوط کند و تندی آن هنگام رسیدن به زمین $4\sqrt{5} \text{ m/s}$ باشد، بازده ماشین کدام است؟ ($g = 10 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$)

(سراسری ریاضی ۷۶)

- ۰/۷ ① ۰/۷۵ ② ۰/۸ ③ ۰/۸۵ ④

۱۷۷. آب ذخیره شده در پشت سد یک نیروگاه برق آبی، از ارتفاع ۹۰/۰ متری روی پرده‌های توربینی می‌ریزد و آن را می‌چرخاند. با چرخش توربین، مولد می‌چرخد و انرژی الکتریکی تولید می‌شود (شکل زیر). اگر ۸۵/۰ درصد کار نیروی گرانش به انرژی مکانیکی تبدیل شود، در هر ثانیه چند متر مکعب آب باید روی توربین بریزد تا توان الکتریکی خروجی مولد نیروگاه 200 MW برسد، جرم هر متر مکعب آب را $1/00 \times 10^3 \text{ kg}$ در نظر بگیرید. ($g = 10 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$)

(مشابه با خود بیازمایید ۲-۱۷ کتاب درسی)



- ۲۶۱/۴ ①

- ۱۵۶/۵ ②

- ۳۴۵/۳ ③

- ۸۶/۴ ④

$$\Rightarrow k_F = k_P > k_1 > k_F$$

گزینه ۳

$$k = \frac{1}{2} m V^2 \Rightarrow \frac{k_2}{k_1} = \frac{m_2}{m_1} \times \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^2 \Rightarrow \frac{5}{4} = 1 \times \left(\frac{V_2}{4}\right)^2$$

$$\frac{\sqrt{5}}{2} = \frac{V_2}{4} \Rightarrow V_2 = 2\sqrt{5} \frac{m}{s}$$

گزینه ۲

$$\begin{cases} k = \frac{1}{2} m V^2 \Rightarrow \frac{k_2}{k_1} = \frac{m_2}{m_1} \times \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^2 \\ V_1 = 72 \frac{km}{h} = \frac{72}{3.6} \frac{m}{s} = 20 \frac{m}{s} \\ \Rightarrow 2 = 1 \times \left(\frac{V_2}{20}\right)^2 \Rightarrow V_2 = 20\sqrt{2} \\ \Rightarrow V_2 \approx 28 \frac{m}{s} \end{cases}$$

گزینه ۱

$$\begin{aligned} k &= \frac{1}{2} m V^2 \Rightarrow \frac{k_2}{k_1} = \frac{m_2}{m_1} \times \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^2 \Rightarrow 4 = 1 \times \left(\frac{V_1 + \lambda}{V_1}\right)^2 \\ \Rightarrow 2 &= \frac{V_1 + \lambda}{V_1} \Rightarrow V_1 = \lambda \frac{m}{s} \end{aligned}$$

گزینه ۱

تندی ماهواره را بر حسب $\frac{m}{s}$ به دست می آوریم:

$$\begin{cases} V = 3 \frac{km}{s} = 3 \times 10^3 \frac{m}{s} \\ k = \frac{1}{2} m V^2 = \frac{1}{2} (2 \times (3 \times 10^3)^2) = 9 \times 10^7 J \\ = 90 \text{ MJ} \end{cases}$$

گزینه ۱

$$\begin{aligned} k &= \frac{1}{2} m V^2 \\ \Rightarrow \begin{cases} \frac{k_2}{k_1} = \frac{m_2}{m_1} \times \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^2 \\ V_1 = 90 \frac{km}{h} = 25 \frac{m}{s} \end{cases} &\Rightarrow 2 = 1 \times \left(\frac{V_2}{25}\right)^2 \Rightarrow \sqrt{2} = \frac{V_2}{25} \\ \Rightarrow V_2 &\approx 35 \frac{m}{s} \\ \Rightarrow \Delta V &= 35 - 25 \Rightarrow \Delta V = 10 \frac{m}{s} \end{aligned}$$

گزینه ۴

$$\begin{aligned} k_F &= k_1 + \Delta k = k_1 + 0.44 k_1 = 1.44 k_1 \\ k &= \frac{1}{2} m V^2 \Rightarrow \frac{k_2}{k_1} = \frac{m_2}{m_1} \times \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^2 \Rightarrow 1.44 = 1 \times \left(\frac{V + 5}{V}\right)^2 \\ \Rightarrow 1.2 &= \frac{V + 5}{V} \Rightarrow 0.2 V = 5 \Rightarrow V = 25 \frac{m}{s} \end{aligned}$$

کار، انرژی و توان

۲

پاسخ نامه
تشریحی

گزینه ۳

$$\begin{aligned} V &= 15 \frac{km}{s} = 15 \times 10^3 \frac{m}{s} \\ K &= \frac{1}{2} m V^2 = \frac{1}{2} \times 4 \times 10^6 \times (15 \times 10^3)^2 \\ &= 450 \times 10^{12} J \\ \frac{\text{انرژی شهاب سنگ}}{\text{انرژی آزاد شده یک تن TNT}} &= \frac{450 \times 10^{12}}{4 \times 10^9} = 93750 \end{aligned}$$

گزینه ۳

$$\begin{aligned} \Delta k &= k_F - k_1 = \frac{1}{2} m V_F^2 - \frac{1}{2} m V_1^2 = \frac{1}{2} m (V_F^2 - V_1^2) \\ &= \frac{1}{2} \times 800 \times (30^2 - 20^2) \\ V_1 &= \frac{km}{h} = \frac{72}{3.6} = 20 \frac{m}{s} \\ V_F &= 108 \frac{km}{h} = \frac{108}{3.6} = 30 \frac{m}{s} \\ \Rightarrow \Delta k &= 400 \times 500 = 200000 J \\ \Rightarrow \Delta k &= 200 kJ \end{aligned}$$

گزینه ۴

انرژی جنبشی حالت اول $k = \frac{1}{2} m V^2$ و انرژی جنبشی حالت دوم $k' = \frac{1}{2} m' V'^2$ می باشد:

$$\begin{aligned} k &= \frac{1}{2} m v^2 \Rightarrow \frac{k}{k'} = \frac{m}{m'} \times \left(\frac{V}{V'}\right)^2 \\ \frac{m' = 2m, V' = \frac{1}{2} V}{\frac{k}{k'}} &\rightarrow \frac{k}{k'} = \frac{m}{2m} \times \left(\frac{V}{\frac{1}{2} V}\right)^2 \\ \Rightarrow \frac{k}{k'} &= \frac{1}{2} \times 4 \Rightarrow \frac{k}{k'} = 2 \end{aligned}$$

گزینه ۱


$$\begin{aligned} k &= \frac{1}{2} m v^2 \Rightarrow \frac{k'}{k} = \frac{m'}{m} \times \left(\frac{V'}{V}\right)^2 \Rightarrow 1 = 2 \times \left(\frac{V'}{V}\right)^2 \\ \frac{V'}{V} &= \frac{\sqrt{2}}{2} \end{aligned}$$

گزینه ۲

از رابطه ی انرژی جنبشی با تندی استفاده می کنیم:

$$\begin{cases} k_1 = \frac{1}{2} m V^2 \\ k_F = \frac{1}{2} m (2V)^2 = m V^2 \\ k_F = \frac{1}{2} (2m) V^2 = m V^2 \\ k_F = \frac{1}{2} (m) \left(\frac{V}{2}\right)^2 = \frac{1}{8} m V^2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow k_1 = 1/25 V_1^2 + 10 V_1 - 60 \quad (2)$$



$$(1) = (2) \Rightarrow 1/25 V_1^2 = 1/25 V_1^2 + 10 V_1 - 60 \Rightarrow V_1 = 6 \frac{m}{s}$$

گزینه ۲

۱۶

کار یک کمیت نرده‌ای است و با توجه به تعریف، یکای آن برابر

حاصل ضرب یکای نیرو در یکای جابه‌جایی (N.m) است.

گزینه ۲

۱۷

با استفاده از قانون دوم نیوتن برای محاسبه‌ی نیروی باد ($\vec{F}$) داریم:

$$F = ma = 500 \times 40 \Rightarrow F = 2 \times 10^4 \text{ N}$$

چون نیرو و جابه‌جایی هم‌جهت‌اند بنابراین برای محاسبه کار نیروی F داریم:

$$W_F = Fd = 2 \times 10^4 \times 8 \Rightarrow W_F = 16 \times 10^4 \text{ J}$$


گزینه ۱

۱۸

نیرو و جابه‌جایی در جهت هم‌اند بنابراین داریم:


$$\begin{cases} \rightarrow F \\ \rightarrow d \end{cases} \Rightarrow \theta = 0$$

$$W_F = Fd \cos \theta = 40 \times 0 / 8 \times \cos 0 \Rightarrow W_F = 32 \text{ J}$$



گزینه ۳

۱۹



$$(F_{\text{بند}})_x = ma = 0 \Rightarrow F - f_k = 0 \Rightarrow F = f_k \Rightarrow F = 200 \text{ N}$$

$$d = Vt = 4 \times 60 \Rightarrow d = 240 \text{ m}$$

$$W_F = Fd \cos \theta \Rightarrow W_F = 200 \times 240 \times \cos 0 = 48000 \text{ J}$$

$$\Rightarrow W_F = 48 \text{ kJ}$$

گزینه ۳

۱۲

$$V_r = V_1 + \Delta V \Rightarrow V_r = V_1 + \frac{20}{100} V_1 = \frac{6}{5} V_1$$

طبق رابطه‌ی انرژی جنبشی داریم:

$$\begin{cases} k = \frac{1}{2} m v^2 \\ m: \text{ثابت} \end{cases} \Rightarrow \frac{k_r}{k_1} = \left(\frac{V_r}{V_1} \right)^2 \Rightarrow \frac{k_r}{k_1} = \left(\frac{6}{5} \right)^2 = \frac{36}{25}$$

$$\Rightarrow k_r = 1/44 k_1$$

$$\text{درصد افزایش انرژی جنبشی: } \frac{k_r - k_1}{k_1} \times 100$$

$$= \frac{1/44 k_1 - k_1}{k_1} \times 100 = 44\%$$

گزینه ۲

۱۳

جرم پدر

تندی اولیه‌ی پدر

$$k_i = \frac{1}{2} k_{\text{پسر}} \Rightarrow k_{\text{پسر}} = 2 k_i \quad (1)$$

$$\text{تندی نهایی پدر: } v_f = v_i + 1$$

$$\text{طبق صورت سؤال} \rightarrow k_f = k_{\text{پسر}} \quad (2)$$

$$(1), (2) \Rightarrow k_f = 2 k_i \Rightarrow \frac{1}{2} m v_f^2 = 2 \times \frac{1}{2} m v_i^2$$

$$(v_i + 1)^2 = 2 v_i^2 \Rightarrow v_i^2 + 2 v_i + 1 = 2 v_i^2$$

$$\Rightarrow v_i^2 - 2 v_i - 1 = 0 \Rightarrow v_i = \frac{2 \pm \sqrt{(-2)^2 - 4(1)(-1)}}{2}$$

$$\Rightarrow v_i = \begin{cases} \frac{2 + \sqrt{8}}{2} \approx \frac{2 + 2.8}{2} \approx 2.4 \frac{m}{s} \\ \frac{2 - \sqrt{8}}{2} \approx \frac{2 - 2.8}{2} \approx -0.4 \frac{m}{s} \end{cases}$$

غ ق ۲

گزینه ۴

۱۴

$$\Delta k = k_r - k_1 = \frac{1}{2} m v_r^2 - \frac{1}{2} m v_1^2 = \frac{1}{2} m (v_r^2 - v_1^2)$$

$$= \frac{1}{2} \times 42 \times 10^{-3} \times (100^2 - 50^2)$$

$$\Rightarrow \Delta k = -5040 \text{ J} \Rightarrow \text{گرمای تولیدشده} = 0 / 1 \times 5040 = -504 \text{ J}$$

$$\Rightarrow \frac{504}{4/2} = 12 \text{ cal}$$

گزینه ۲

۱۵

طبق رابطه انرژی جنبشی و با توجه به نمودار، داریم:


$$k_1 = \frac{1}{2} m \times V_1^2 = \frac{1}{2} \times 2 / 5 \times V_1^2 \Rightarrow k_1 = 1/25 V_1^2 \quad (1)$$

$$k_r = \frac{1}{2} m \times V_r^2 \Rightarrow k_1 + 80 = \frac{1}{2} \times 2 / 5 \times (V_1 + 4)^2$$

$$= 1/25 \times (V_1^2 + 8 V_1 + 16) \Rightarrow k_1 = 1/25 V_1^2 + 10 V_1 + 20 - 80$$

گزینه ۳ ۲۵

مطابق شکل مؤلفه‌های عمود نیرو (F_y) بر جابه‌جایی عمود است بنابراین کار آن صفر است $W_{F_y} = 0$ و فقط مؤلفه‌ی افقی آن (F_x) که در جهت جابه‌جایی به جسم وارد می‌شود، کار انجام می‌دهد:




$$\begin{cases} \rightarrow F_x & \theta = 0 \\ \rightarrow d \\ W_F = W_{F_x} = F_x \cos \theta d = 15 \times 10 \times \cos 0 \\ \Rightarrow W_F = 150 \text{ J} \end{cases}$$

گزینه ۳ ۲۶

با توجه به این که نقاط ابتدا و انتها (A, B) یکسان است بنابراین جابه‌جایی (d) در هر سه مسیر یکسان است. از طرفی نیروی ثابت F نیز در هر سه مسیر با جهت و اندازه‌ی یکسان به جسم وارد شده است، بنابراین طبق رابطه‌ی $W = Fd \cos \theta$ ، کار انجام شده توسط نیروی F در هر سه مسیر یکسان است.


گزینه ۴ ۲۷



$$\theta = 90^\circ \quad W_N = Nd \cos 90^\circ = 0$$

با توجه به عمود بودن N بر d ، کار انجام شده توسط نیروی عمودی سطح (N) برابر صفر است.

گزینه ۱ ۲۸




$$\begin{cases} f_k \leftarrow \theta = 180^\circ \rightarrow d \\ W_{f_k} = f_k d \cos 180^\circ = 10 \times 2 \times (-1) \Rightarrow W_{f_k} = -20 \text{ J} \end{cases}$$

گزینه ۱ ۲۹

چون جسم با **تندی ثابت** حرکت می‌کند ($a = 0$: شتاب) است. بنابراین داریم:

$$x: F = ma = 0 \Rightarrow f_k = F \cos 37^\circ = 8 \times 0.8 = 6.4 \text{ N}$$

گزینه ۴ ۲۰



$$W_F = Fd \cos \theta$$

i) جسم رو به بالا در حرکت باشد:

$$F > mg \Rightarrow \uparrow \uparrow \theta = 0^\circ \Rightarrow W_F = Fd > 0$$

کار نیروی F در ثانیه‌های متوالی افزایش می‌یابد.

ii) جسم به سمت پایین در حرکت باشد:

$$F < mg \Rightarrow \uparrow \downarrow \theta = 180^\circ \Rightarrow W_F = -Fd < 0$$

کار نیروی F در یک بازه‌ی زمانی معین در ثانیه‌های متوالی کاهش می‌یابد.


۲) درست قبل از توقف لحظه‌ای $W_F < 0$

$$F < mg \Rightarrow \uparrow \downarrow \theta = 180^\circ \Rightarrow W_F = -Fd < 0$$

درست بعد از توقف لحظه‌ای $W_F = Fd > 0$


کار نیروی F در یک بازه‌ی زمانی معین در ثانیه‌های متوالی ابتدا کاهش و سپس افزایش می‌یابد.

گزینه ۴ ۲۱




$$W_F = Fd \cos \alpha = 6 \times 10 \times \cos 60^\circ \Rightarrow W_F = 30 \text{ J}$$

گزینه ۳ ۲۲



$$W_F = Fd \cos \alpha = 4 \times (10 \times 2) \times \cos 60^\circ = 40 \text{ J}$$

گزینه ۲ ۲۳




$$W_F = Fd \cos \alpha$$

$$\Rightarrow W_F = 10 \times 20 \times \cos 45^\circ = 100\sqrt{2}$$

گزینه ۳ ۲۴

چون جسم ساکن است بنابراین در جهت برآیند نیروهای وارد بر آن ($\vec{R}$) جابه‌جا می‌شود.

$$W_{F_1} = F_1 d \cos \alpha$$


$$W_{F_2} = F_2 d \cos \left(\frac{\pi}{4} - \alpha \right) = F_2 d \sin \alpha$$


$$\cot \alpha = \frac{F_1}{F_2} = 2$$

$$\frac{W_{F_1}}{W_{F_2}} = \frac{F_1 d \cos \alpha}{F_2 d \sin \alpha} = \frac{F_1}{F_2} \cot \alpha = 2 \times 2 \Rightarrow \frac{W_{F_1}}{W_{F_2}} = 4$$


گزینه ۲ ۳۴

$$\begin{cases} mg = 8N \\ W_{mg} = +mgh \text{ : کار نیروی وزن در پایین آمدن} \\ = 8 \times 2 / 5 \Rightarrow W_{mg} = 20 J \end{cases}$$



گزینه ۴ ۳۵

$$W_{mg} = mgh = 2 \times 10 \times 5$$




$$W_{mg} = 100 J$$

گزینه ۲ ۳۶

$$W_{mg} = mgh = mgd \sin \alpha$$

$$W_{mg} = 0 / 5 \times 10 \times 0 / 6 \times \sin 30^\circ$$

$$\Rightarrow W_{mg} = 1 / 5 J$$



گزینه ۱ ۳۷


چون حرکت یکنواخت است، داریم:

$$d = V \cdot t = 10 \times 60 \Rightarrow d = 600 m$$

$$W_{mg} = -mgh = -mgd \sin \alpha$$

$$W_{mg} = -1000 \times 10 \times 600 \times 0 / 5 = -300000 J$$

$$\Rightarrow W_{mg} = -300 kJ$$




گزینه ۲ ۳۸

کار نیروی وزن به اختلاف ارتفاع (Δh) دو نقطه‌ای که بین آن‌ها جابه‌جا می‌شود بستگی دارد و مستقل از مسیر حرکت است.




$$\sin 30^\circ = \frac{\text{ضلع مقابل}}{\text{وتر}} = \frac{\Delta h}{R}$$



$$\begin{cases} f_k \leftarrow \theta = 180^\circ \rightarrow d \\ W_{f_k} = f_k d \cos 180^\circ = 6 / 4 \times 1 \times (-1) \\ \Rightarrow W_{f_k} = -6 / 4 J \end{cases}$$

گزینه ۲ ۳۰



$$\begin{cases} f_k \leftarrow \theta = 180^\circ \rightarrow d \\ W_{f_k} = f_k d \cos 180^\circ = 200 \times 1 \times (-1) \\ \Rightarrow W_{f_k} = -200 J \end{cases}$$

$$W_f = |W_f| = 200 J \text{ گرمای تولیدشده}$$

گزینه ۳ ۳۱

کار انجام شده توسط نیروی عکس‌العمل (W_R) برابر با کار نیروی اصطکاک (W_{f_k}) است (در واقع کار مؤلفه‌ی عمودی سطح (W_N) صفر است).

$$\begin{cases} f_k \leftarrow \theta = 180^\circ \rightarrow d \\ W_N = 0 \\ W_R = W_N + W_{f_k} \Rightarrow W_R = W_{f_k} \\ = f_k d \cos 180^\circ = 12 \times 15 \times (-1) \\ W_R = -180 J \end{cases}$$


گزینه ۱ ۳۲

کار نیروی عکس‌العمل سطح (W_R) برابر با کار نیروی اصطکاک است (زیرا کار نیروی عمودی سطح W_N صفر است). از طرفی چون سطح شیب‌دار بدون اصطکاک است. پس کار نیروی اصطکاک (W_{f_k}) نیز صفر خواهد بود، بنابراین داریم:

$$\begin{aligned} W_N &= 0 \\ W_{f_k} &= 0 \Rightarrow W_R = W_N + W_{f_k} = 0 + 0 = 0 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow W_R = 0$$

گزینه ۱ ۳۳



کار نیروی وزن در جابه‌جایی‌های افقی صفر است.

گزینه ۱

روش اول: در این روش، کار انجام شده توسط هر نیرو را به طور جداگانه محاسبه می‌کنیم.

$$W_{F_1} = F_1 d \cos \theta = 4\sqrt{2} \times 10^3 \times 23.5 \times \cos 45^\circ$$

$$\Rightarrow W_{F_1} = 4\sqrt{2} \times 10^3 \times 23.5 \times \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$W_{F_1} = 940000 \text{ J}$$

$$\begin{cases} W_{mg} = mgd \cos 90^\circ \Rightarrow W_{mg} = 0 \\ \theta = 90^\circ \end{cases}$$

کار نیروی وزن در جابه‌جایی‌های افقی صفر است.

$$\begin{cases} W_{f_k} = f_k \cos \pi = -f_k d = -3/4 \times 10^3 \times 23.5 \\ = -799000 \text{ J} \\ \theta = 180^\circ \end{cases}$$

$$W_t = W_1 + W_2 + W_3 = 940000 + 0 - 799000$$

$$\Rightarrow W_t = 141000 \text{ J}$$

روش دوم: ابتدا نیروهای را شناسایی می‌کنیم که در امتداد جابه‌جایی بر جسم وارد می‌شوند.

$$f_k \quad m \quad \rightarrow F_1 \cos 45^\circ$$

$$F = F_1 \cos 45^\circ - f_k$$

$$= 4\sqrt{2} \times 10^3 \times \frac{\sqrt{2}}{2} - 3/4 \times 10^3 = 600 \text{ N}$$

علامت مثبت نشان می‌دهد که نیروی خالص F در جهت جابه‌جایی است، بنابراین داریم:

$$W_t = Fd = 600 \times 23.5 \Rightarrow W_t = 141000 \text{ J}$$

گزینه ۲

کار نیروی وزن در بالارفتن:

$$\begin{cases} W_{mg} = -mgh = -mgd \sin \theta = -3 \times 10 \times 0/5 \times \sin 30^\circ \\ \theta = 30^\circ \end{cases} \Rightarrow W_{mg} = -7/5 \text{ J}$$

$$\begin{cases} W_{Fa} = Fd \cos \theta = 20 \times 0/5 \times \cos 30^\circ = 8 \text{ J} \\ \theta = 30^\circ \end{cases}$$

$$W_t = W_{mg} + W_{Fa} = -7/5 + 8$$

$$\Rightarrow W_t = 0/5 \text{ J}$$

گزینه ۴

تنها نیروی وارد بر جسم، نیروی ثابت F است بنابراین طبق قضیه کار-انرژی جنبشی داریم:

$$W_{\text{برآیند}} = \Delta k \Rightarrow W_F = \Delta k = k_2 - k_1 = \frac{1}{2} m v_2^2 - \frac{1}{2} m v_1^2$$

۴۴

$$\Rightarrow \Delta h = R \sin 30^\circ \Rightarrow \Delta h = \frac{R}{2}$$

$$W_{mg} = mg \Delta h = mg \frac{R}{2}$$

$$\Rightarrow W_{mg} = \frac{1}{2} mgR$$

گزینه ۱

کار نیروی وزن در پایین آمدن جسم برابر $W_{mg} = +mgh$ است که h اختلاف ارتفاع بین دو نقطه در جابه‌جایی است.

$$\begin{cases} h_A = R \sin 37^\circ \\ h_B = R \end{cases} \Rightarrow h = R - R \sin 37^\circ$$

$$= R(1 - \sin 37^\circ) = 0/4 R$$

$$W_{mg} = mgh = 0/1 \times 10 \times 0/4 \times \left(\frac{0/6}{2}\right)$$

$$\Rightarrow W_{mg} = 0/12 \text{ J}$$

گزینه ۲

اختلاف ارتفاع جسم بین A و B : $W_{mg} = -mgh$
کار نیروی وزن در بالارفتن

$$\text{رابطه فیثاغورث: } \left(\frac{3}{5}L\right)^2 + h'^2 = L^2$$

$$\Rightarrow h' = \sqrt{L^2 - \frac{9}{25}L^2} \Rightarrow h' = \frac{4L}{5}$$

$$\Rightarrow h = L - h' = L - \frac{4L}{5} \Rightarrow L = \frac{L}{5}$$

$$\Rightarrow W_{mg} = -mg \frac{L}{5} = -3 \times 10 \times \frac{2}{5} \Rightarrow W_{mg} = -12 \text{ J}$$

گزینه ۳

کار نیروی وزن در جابه‌جایی افقی صفر است اما برای جابه‌جایی در امتداد قائم رو به بالا داریم:

$$W_{mg} = -mgh = -5 \times 10 \times 1 = -50 \Rightarrow W_{mg} = -50 \text{ J}$$

$$W' = 50 \text{ J} \text{ : کار لازم برای غلبه بر وزن چمدان}$$

گزینه ۴

کاری که ورزشکار توسط نیروی F انجام می‌دهد صرف غلبه بر نیروی وزن و زنده می‌شود:

$$W_{mg} = -mgh = -40 \times 9/8 \times 50 \times 10^{-2} = -196 \text{ J}$$

$$W_F = |W_{mg}| = 196 \text{ J}$$

گزینه ۱

چون نیرو و جابه‌جایی در یک جهت‌اند کار نیروی F برابر است با:

$$\begin{cases} W_F = Fd \cos \theta = Fd \cos 0 = Fd = 66 \times 18/4 \\ \Rightarrow W_F = 1214/4 \text{ J} \\ \rightarrow F \\ \theta = 0 \end{cases}$$

۳۹

۴۰

۴۱

۴۲

۴۳

۴۶

$$\begin{cases} W_{rt} = \Delta k' = k'_r - k'_i = \frac{1}{2} m V_r'^2 - \frac{1}{2} m V_i'^2 \\ = \frac{1}{2} m (2V)^2 - \frac{1}{2} m (V)^2 = \frac{1}{2} m (4V^2 - V^2) \\ = W_{rt} = \frac{3}{2} m V^2 \\ V_i' = V \\ V_r' = 2V \end{cases}$$

$$\frac{W_{it}}{W_{rt}} = \frac{\frac{1}{2} m V^2}{\frac{3}{2} m V^2} \Rightarrow \frac{W_{it}}{W_{rt}} = \frac{1}{3}$$

گزینه ۳

با توجه به این که کار انجام شده در هر دو حالت یکسان است، بنابراین طبق قضیه کار-انرژی جنبشی داریم:

$$W_t = \Delta K = (W_t)_{\text{الف}} \quad \text{ب} \quad (V_1)_{\text{الف}} = 0 \Rightarrow \Delta K = \Delta K \quad \text{ب} \quad (V_2)_{\text{الف}} = (V_2)_{\text{ب}} = 0$$

تندی نهایی هر دو یکسان است.

گزینه ۱

قضیه کار-انرژی جنبشی برای هر نوع مسیری چه مستقیم و چه خمیده صادق است.

$$\begin{aligned} W_t = \Delta k = k_r - k_i &= \frac{1}{2} m V_B^2 - \frac{1}{2} m V_A^2 \\ \Rightarrow 6 / 391 \times 10^7 &= \frac{1}{2} \times 800 \times V_B^2 - \frac{1}{2} \times 800 \times \left(\frac{54}{3/6}\right)^2 \\ V_B^2 &= 160000 \Rightarrow V_B = 400 \frac{m}{s} \end{aligned}$$

گزینه ۴

گزینه ۱: چون تندی حرکت ماهواره ثابت است، طبق رابطه $K = \frac{1}{2} m V^2$ ، تغییرات انرژی جنبشی آن صفر است.

گزینه ۲: طبق قضیه کار-انرژی جنبشی $W = \Delta k$ ، چون تغییرات انرژی جنبشی ماهواره صفر است (تندی حرکت ثابت) بنابراین کار کل انجام شده روی ماهواره صفر است.

گزینه ۳: تنها نیروی وارد بر ماهواره نیروی جاذبه گرانشی است که طرف زمین وارد می شود و معادل وزن ماهواره است.

گزینه ۴: چون نیروی جاذبه گرانشی بر مسیر حرکت ماهواره عمود است کاری روی ماهواره انجام نمی دهد.

$$W_F = F d \cos \theta \xrightarrow{\theta=90^\circ} W_F = 0 \quad \cos 90^\circ = 0$$

گزینه ۴

گزینه ۱:

$$\begin{aligned} W_{mg} &= -mgh \\ &= -10 \times 100 \times 1 = -1000 \text{ J} \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2} m (V_2^2 - V_1^2) = \frac{1}{2} \times 8 \times (6^2 - 4^2)$$

$$W_F = 80 \text{ J}$$

گزینه ۱

با استفاده از قضیه کار-انرژی جنبشی داریم:

$$\begin{aligned} W_t = \Delta K = K_r - K_i &\Rightarrow \frac{1}{2} m V_r'^2 - \frac{1}{2} m V_i'^2 \\ &= \frac{1}{2} m (V_2^2 - V_1^2) = \frac{1}{2} \times 0.5 \times (10^2 - 12^2) \\ \Rightarrow W_t &= -11 \text{ J} \end{aligned}$$

گزینه ۲

طبق قضیه کار-انرژی جنبشی داریم:

$$\begin{aligned} W_{\text{برآیند}} = \Delta k &\Rightarrow W_{\text{برآیند}} = k_r - k_i = \frac{1}{2} m (V_r'^2 - V_i'^2) \\ \Rightarrow 21 &= \frac{1}{2} \times 2 \times (V_r'^2 - 4) \\ \Rightarrow V_r'^2 &= 25 \Rightarrow V_r' = 5 \frac{m}{s} \end{aligned}$$

گزینه ۳

نیروی ثابت $F = 4 \text{ N}$ هم جهت با حرکت به جسم وارد می شود بنابراین طبق قضیه کار-انرژی جنبشی داریم:

$$\begin{aligned} W_{\text{برآیند}} = \Delta k &\Rightarrow W_F = k_r - k_i \Rightarrow F d \cos 0 = 132 - \frac{1}{2} m V_i^2 \\ \Rightarrow 4 \times 24 &= 132 - \frac{1}{2} \times 2 \times V_i^2 \\ \Rightarrow V_i^2 &= 36 \Rightarrow V_i = 6 \frac{m}{s} \end{aligned}$$

گزینه ۲

تنها نیرویی که در راستای جابه جایی (d) به قایق وارد می شود نیروی باد (F) است بنابراین فقط این نیرو کار انجام می دهد بنابراین طبق قضیه کار-انرژی جنبشی داریم:

$$\begin{cases} W_t = \Delta k = k_r - k_i \xrightarrow{V_i=0} W_t = k_r \\ \Rightarrow F d = \frac{1}{2} m V^2 \Rightarrow V = \sqrt{\frac{2Fd}{m}} \\ W_t = W_F = F d \cos 0 = F d \\ \rightarrow F \\ \rightarrow d \quad \theta = 0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \frac{F}{d} \xrightarrow{\text{قایق یکسان}} \frac{V_2}{V_1} &= \sqrt{\frac{m_1}{m_2}} = \sqrt{\frac{m}{4m}} = \frac{1}{2} \\ \frac{V_2}{V_1} &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

گزینه ۱

طبق قضیه کار-انرژی جنبشی داریم:

$$\begin{cases} W_{it} = \Delta k = k_r - k_i = \frac{1}{2} m V_r'^2 \Rightarrow W_{it} = \frac{1}{2} m V^2 \\ V_i = 0 \Rightarrow k_i = 0 \end{cases}$$

گزینه ۳

اگر برآیند دو نیروی F_1 و F_2 را F بنامیم، چون جسم از حال سکون شروع به حرکت کرده است بنابراین در جهت برآیند نیروهای وارد بر آن حرکت می‌کند بنابراین طبق قضیه کار-انرژی جنبشی داریم:


$$W_{\text{برآیند}} = \Delta k \Rightarrow W_F = k_2 - k_1 \Rightarrow Fd \cos \theta = k_2 - 0 = k_2$$

$$\Rightarrow F \times 8 = 120 \Rightarrow F = 15 \text{ N}$$

چون $F_1 = 20 \text{ N}$ است در نتیجه باید $F_2 = 5 \text{ N}$ و در خلاف جهت F_1 باشد تا برآیند این دو نیرو $F = 15 \text{ N}$ شود.

گزینه ۱

چون جسم در ابتدا در حال سکون است بنابراین در جهت برآیند نیروهای وارد بر آن حرکت می‌کند بنابراین داریم:

$$R = \sqrt{F^2 + F^2} = \sqrt{2} F$$


حال طبق قضیه کار-انرژی جنبشی داریم:

$$W_{\text{برآیند}} = \Delta k \Rightarrow W_R = k_2 - k_1 = k_2 - 0 = k_2$$

$$\Rightarrow \sqrt{2} F d \cos \theta = k_2 \Rightarrow \sqrt{2} \times F \times 16 = 32$$

$$\Rightarrow F = \frac{2}{\sqrt{2}} \Rightarrow F = \sqrt{2} \text{ N}$$

گزینه ۱

طبق قضیه کار-انرژی جنبشی داریم:

$$W_{\text{برآیند}} = \Delta k = k_2 - k_1 = \frac{1}{2} m V_2^2 - \frac{1}{2} m V_1^2$$

$$= \frac{1}{2} m (V_2^2 - V_1^2) = \frac{1}{2} \times 2 \times 10^3 \times (12^2 - 2^2)$$

$$\Rightarrow W_{\text{برآیند}} = 140 \times 10^3 \text{ J} = 140 \text{ kJ}$$

گزینه ۱

اگر نیرویی که باعث بالا رفتن جسم از سطح شیبدار می‌شود را F بنامیم، دو نیروی F و وزن روی این جسم کار انجام می‌دهند بنابراین طبق قضیه کار-انرژی جنبشی داریم:

$$W_t = \Delta k = k_2 - k_1 \xrightarrow{\text{تندی ثابت}} W_t = 0$$

W_N هم هست که بعداً به جای آن صفر می‌گذاریم.

$$\Rightarrow W_F + W_{mg} = k_2 - k_1 = 0$$

$$\Rightarrow W_F = -W_{mg} = -(-mgh)$$

$$\Rightarrow W_F = mgh = 20 \times 10 \times 2 / 5$$

گزینه ۲: کار لازم برای غلبه بر نیروی وزن، قرینه کار نیروی وزن است.

$$W' = -W = -(-100) = 100 \text{ J}$$

گزینه ۳:

وزن W + شخص $W_t = W$: کار کل

$$= mgh - mgh = 0$$

$$W_t = \Delta k \Rightarrow 0 = \Delta k \Rightarrow k_1 = k_2$$

گزینه ۴: چون کار کل صفر است پس طبق قضیه کار-انرژی جنبشی $W_t = \Delta k$ ، انرژی جنبشی چمدان تغییری نمی‌کند.

گزینه ۱

نیروی F در راستای جابه‌جایی و هم‌جهت با آن وارد می‌شود بنابراین داریم:

$$W_F = Fd \cos \theta \Rightarrow W_F = 10 \text{ F}$$

کار نیروی وزن در جابه‌جایی افقی صفر است.

$$W_{\text{برآیند}} = \Delta k \Rightarrow W_F = k_2 - k_1 \Rightarrow 10 \text{ F} = 32 - 20$$

$$\Rightarrow F = 1/2 \text{ N}$$

گزینه ۲

تنها نیروی وارد بر جسم، نیروی ثابت F است بنابراین طبق قضیه کار و انرژی داریم:

$$W_{\text{برآیند}} = W_F = \Delta k = k_2 - k_1 = k_2 - \frac{1}{2} m V_1^2 = \frac{1}{2} m V_2^2$$

$$\Rightarrow W_F = \frac{1}{2} m V^2$$

بنابراین نمودار کار نیروی F (W_F) بر حسب تندی آن (V)، سهمی است. که تقعر آن رو به بالا است چون ضریب V^2 ، مثبت است.

گزینه ۳

$$k = \frac{1}{2} m V_1^2 \Rightarrow 100 = \frac{1}{2} m \times 10^2 \Rightarrow m = 2 \text{ kg}$$

طبق قضیه کار-انرژی جنبشی داریم:

$$W_{\text{برآیند}} = \Delta k = k_2 - k_1 = \frac{1}{2} m V_2^2 - 100 = \frac{1}{2} \times 2 \times (-20)^2 - 100$$

$$\Rightarrow W_{\text{برآیند}} = 300 \text{ J}$$


گزینه ۱

$$k_1 = \frac{1}{2} m V_1^2 \Rightarrow k_1 = \frac{1}{2} \times 8 \times 10^2 \Rightarrow k_1 = 400 \text{ J}$$

چون پس از طی مسافت 8 m ، انرژی جنبشی آن افزایش پیدا کرده است پس نیروی F در جهت حرکت باید به جسم وارد شود، بنابراین طبق قضیه کار-انرژی جنبشی داریم:

$$W_{\text{برآیند}} = \Delta k \Rightarrow W_F = k_2 - k_1 \Rightarrow Fd \cos \theta = 1200 - 400$$

$$\Rightarrow F \times 8 = 800 \Rightarrow F = 100 \text{ N}$$



$$\Rightarrow W_F = 500 \text{ J}$$

گزینه ۴. ۶۴

چون جعبه با تندی ثابت جابه‌جا می‌شود بنابراین تغییرات انرژی جنبشی صفر است از طرفی سطح بدون اصطکاک است پس کار نیروی اصطکاک نیز صفر است لذا طبق قضیه‌ی کار-انرژی جنبشی، کار برآیند نیروهای وارد بر جعبه صفر است.

$$\begin{cases} W_{fk} = 0 \\ W_t = k_f - k_i = \Delta k = 0 \Rightarrow W_{Fa} + W_{mg} = 0 \\ \Rightarrow W_{Fa} = -W_{mg} \\ W_{mg} = -mgh = -5 \times 10 \times 1 = -50 \text{ J} \\ \Rightarrow W_{Fa} = -W_{mg} \\ = -(-50) = 50 \text{ J} \Rightarrow W_{Fa} = 50 \text{ J} \end{cases}$$

کار نیروی وزن در بالا رفتن

گزینه ۳. ۶۵

نیروها در راستای حرکت عبارتند از نیروی دست F_1 و نیروی وزن mg :



بنابراین اندازه‌ی نیروی خالص برابر است با:

$$F = F_1 - mg = 52 - 4 \times 10 = 12 \text{ N}$$

علامت مثبت نشان می‌دهد که نیروی خالص F در جهت جابه‌جایی است به این ترتیب داریم:

$$W_t = Fd \cos 0 = Fd = 12 \times 1/5 = 18 \text{ J}$$

$$\Rightarrow W_t = 18 \text{ J}$$

طبق قضیه‌ی کار-انرژی جنبشی داریم:

$$V_1 = 0 \Rightarrow k_1 = 0$$

$$\begin{cases} W_t = \Delta k = k_f - k_i = k_f = \frac{1}{2} m V_f^2 \\ \Rightarrow 18 = \frac{1}{2} \times 4 \times V_f^2 \\ \Rightarrow V_f = 3 \frac{m}{s} \end{cases}$$

گزینه ۲. ۶۶

$$W_{\text{برآیند}} = \Delta k \xrightarrow{\text{تندی ثابت}} 0$$

گزینه ۴. ۶۷

تنها نیروی وارد بر گلوله از نقطه پرتاب تا نقطه برخورد به زمین، نیروی وزن است. (زیرا از مقاومت هوا صرف‌نظر شده است) که برای هر سه توپ یکسان است:

$$\begin{cases} h_1 = h_2 = h_3 = h \\ (W_{mg})_1 = (W_{mg})_2 = (W_{mg})_3 = +mgh \end{cases}$$

$$(W_t)_1 = (W_t)_2 = (W_t)_3$$

از طرفی با توجه به این که تندی اولیه برای هر سه توپ یکسان است انرژی جنبشی اولیه k_i آن‌ها نیز یکسان است. بنابراین طبق قضیه‌ی کار-انرژی جنبشی داریم:

$$\begin{cases} (W_t)_1 = (W_t)_2 = (W_t)_3 \\ (k_i)_1 = (k_i)_2 = (k_i)_3 \\ \Rightarrow W_t = \Delta k = k_f - k_i \Rightarrow (k_f)_1 = (k_f)_2 = (k_f)_3 \end{cases}$$

از طرفی طبق رابطه $K = \frac{1}{2} m V^2$ ، چون جرم هر سه گلوله یکسان است پس تندی نهایی آن‌ها نیز با هم برابر است:

$$(V_f)_1 = (V_f)_2 = (V_f)_3$$

گزینه ۱. ۶۸

طبق قضیه‌ی کار-انرژی جنبشی داریم:

$$W_{\text{برآیند}} = \Delta k = k_f - k_i = \frac{1}{2} m V_f^2 - \frac{1}{2} m V_i^2$$

$$= \frac{1}{2} m (V_f^2 - V_i^2) = \frac{1}{2} \times 20 \times 10^{-3} (30^2 - 0^2)$$

$$\Rightarrow W_{\text{برآیند}} = 9 \text{ J}$$

گزینه ۴. ۶۹

از مقاومت هوا صرف‌نظر شده است بنابراین تنها نیروی وزن در این جابه‌جایی کار انجام می‌دهد پس طبق قضیه کار-انرژی جنبشی داریم:

$$W_{\text{برآیند}} = \Delta k \Rightarrow W_{mg} = k_f - k_i$$

$$\Rightarrow mgh' = \frac{1}{2} m V_f^2 - \frac{1}{2} m V_i^2$$

$$\Rightarrow 10 \times 4 = \frac{1}{2} V_f^2 - \frac{1}{2} \times 4^2 \quad \begin{matrix} h' = 4 \text{ m} \\ v_i = 4 \frac{m}{s} \end{matrix}$$

$$\Rightarrow V_f^2 = 96 \left(\frac{m}{s} \right)^2$$

$$\begin{cases} k = \frac{1}{2} m V^2 \Rightarrow \frac{k_f}{k_i} = \frac{V_f^2}{V_i^2} = \frac{96}{16} \Rightarrow k_f = 6k_i \\ m_1 = m_f \end{cases}$$

گزینه ۳. ۷۰

دو نیروی وزن و مقاومت هوا در طول حرکت به جسم وارد می‌شوند. $W_{mg} = +mgh$: کار نیروی وزن در پایین آمدن

$$= +500 \times 10^{-3} \times 10 \times 20 \Rightarrow W_{mg} = +100 \text{ J}$$

اگر کار نیروی مقاومت هوا را W_F بنامیم طبق قضیه کار-انرژی جنبشی داریم:

$$W_t = \Delta k \Rightarrow W_F + W_{mg}$$

$$= k_f - k_i = \frac{1}{2} m (V_f^2 - V_i^2)$$

$$\Rightarrow W_F + 100 = \frac{1}{2} \times 500 \times 10^{-3} (10^2 - 20^2)$$

$$\Rightarrow W_F = -100 - 75 \Rightarrow W_F = -175 \text{ J}$$

گزینه ۲

۷۵

طبق قضیه کار-انرژی جنبشی داریم:

$$W_{\text{برآیند}} = \Delta k = k_2 - k_1$$

$$= \frac{1}{2} m (V_2^2 - V_1^2) = \frac{1}{2} \times 2 \times 10^3 (15^2 - 25^2)$$

$$W_{\text{برآیند}} = -4 \times 10^5 \text{ J}$$

گزینه ۲

۷۶

طبق قضیه کار-انرژی جنبشی داریم:

$$W_{\text{برآیند}} = \Delta k = k_2 - k_1 = \frac{1}{2} m V_2^2 - \frac{1}{2} m V_1^2 = \frac{1}{2} m (V_2^2 - V_1^2)$$

$$W_{\text{برآیند}} = \frac{1}{2} \times 800 \times (5^2 - 10^2) \Rightarrow W_{\text{برآیند}} = -4 \times 10^4 \text{ J}$$

گزینه ۳

۷۷

در طول مسیر حرکت، نیروی اصطکاک روی اتومبیل کار انجام می‌دهد، کار نیروی وزن در جابه‌جایی‌های افقی صفر است بنابراین طبق قضیه کار-انرژی جنبشی داریم:

$$W_{\text{برآیند}} = \Delta k \Rightarrow W_{f_k} = k_2 - k_1 = \frac{1}{2} m (V_2^2 - V_1^2)$$

$$= \frac{1}{2} \times 600 \times [0 - (\frac{54}{3.6})^2]$$

$$\Rightarrow W_{f_k} = -67500 \text{ J} = -67.5 \text{ kJ}$$

گزینه ۲

۷۸

کار نیروی عمودی سطح و کار نیروی وزن در جابه‌جایی‌های افقی همواره صفر است بنابراین تنها نیروی وارد بر اتومبیل، نیروی اصطکاک است که کار انجام شده توسط آن به شکل گرما ظاهر می‌شود. طبق قضیه کار-انرژی جنبشی داریم:

$$\begin{cases} W_{\text{برآیند}} = \Delta k \Rightarrow W_{f_k} = k_2 - k_1 = 0 - \frac{1}{2} m V_1^2 = -\frac{1}{2} \times 800 \times 10^2 \\ V_2 = 0 \Rightarrow k_2 = 0 \\ \Rightarrow W_{f_k} = -4 \times 10^4 \text{ J} \\ \Rightarrow \text{انرژی گرمایی تولید شده} = 4 \times 10^4 \text{ J} \end{cases}$$

گزینه ۴

۷۹

طبق قضیه کار-انرژی جنبشی داریم:

$$W_{\text{برآیند}} = \Delta k \Rightarrow W_{\text{برآیند}} = \frac{1}{2} m V_2^2 - \frac{1}{2} m V_1^2 = \frac{1}{2} m (V_2^2 - V_1^2)$$

$$= \frac{1}{2} \times 20 \times 10^{-3} \times (40^2 - 100^2)$$

$$W_{\text{برآیند}} = -84 \text{ J}$$

گزینه ۴

۷۱

چتر باز با تندی ثابت سقوط می‌کند پس تغییرات انرژی جنبشی آن صفر است از طرفی فقط نیروی وزن (mg) و نیروی مقاومت هوا (R) بر روی آن کار انجام می‌دهند پس طبق قضیه کار-انرژی جنبشی داریم:

$$W_{\text{برآیند}} = \Delta k \Rightarrow W_R + W_{mg} = 0$$

$$\Rightarrow W_R = -W_{mg} = -mgh = -140 \times 10 \times 600$$

$$\Rightarrow W_R = -840 \text{ kJ}$$

گزینه ۱

۷۲

نیروی وزن و نیروی مقاومت هوا (R) روی چتر باز کار انجام می‌دهند بنابراین طبق قضیه کار-انرژی جنبشی داریم:

$$W_{\text{برآیند}} = \Delta k \Rightarrow W_{mg} + W_R = k_2 - k_1$$

$$\Rightarrow mgh + W_R = \frac{1}{2} m V_2^2 - 0$$

$$\Rightarrow W_R = \frac{1}{2} \times 80 \times 5^2 - 80 \times 10 \times 800 \Rightarrow W_R = -639000 \text{ J}$$

$$\Rightarrow W_R = -639 \text{ kJ}$$

گزینه ۱

۷۳

دو نیروی وزن (mg) و مقاومت هوا (R) در حین سقوط جسم، بر آن وارد می‌شوند بنابراین طبق قضیه کار-انرژی جنبشی داریم:

$$\begin{cases} W_{\text{برآیند}} = \Delta k = k_2 - k_1 \\ V_1 = 0 \Rightarrow k_1 = 0 \Rightarrow W_{mg} + W_R = k_2 - k_1 = k_2 \\ W_{mg} = mgh \end{cases}$$

$$\Rightarrow W_R = \frac{1}{2} m V_2^2 - mgh$$

$$\Rightarrow W_R = \frac{1}{2} \times 0.2 \times 15^2 - 0.2 \times 10 \times 15$$

$$\Rightarrow W_R = 22.5 - 30 \Rightarrow W_R = -7.5 \text{ J}$$

بنابراین اندازه‌ی کار انجام شده توسط نیروی مقاوم 7.5 J است.

گزینه ۱

۷۴

کار نیروی وزن در یک مسیر رفت و برگشت صفر است. بنابراین تنها نیروی وارد بر توپ مقاومت هوا (R) است. پس طبق قضیه کار-انرژی جنبشی داریم:

$$W_{\text{برآیند}} = \Delta k \Rightarrow W_R = k_2 - k_1 = \frac{1}{2} m V_2^2 - \frac{1}{2} m V_1^2$$

$$= \frac{1}{2} m (V_2^2 - V_1^2) = \frac{1}{2} \times 200 \times 10^{-3} [(-9)^2 - (10)^2]$$

$$\Rightarrow W_R = 1/9 \text{ J}$$

بنابراین $1/9 \text{ J}$ گرما به محیط و توپ داده می‌شود.

۸۰

گزینه ۱

با فرض آن که حرکت گلوله در دیوار افقی باشد کار نیروی وزن گلوله صفر است بنابراین تنها نیرویی که کار انجام می‌دهد، نیروی دیوار بر روی گلوله (F) است. پس طبق قضیه کار-انرژی جنبشی داریم:

$$W_{\text{برآیند}} = \Delta k \Rightarrow W_F = k_2 - k_1 = 0 - \frac{1}{2} m V_1^2$$

$$\Rightarrow W_F = -\frac{1}{2} \times 20 \times 10^{-3} \times 600^2$$

$$\Rightarrow W_F = -3600 \text{ J}$$

۸۱

گزینه ۴

با فرض آن که حرکت گلوله در دیوار افقی باشد، کار نیروی وزن گلوله صفر است بنابراین تنها نیرویی که کار انجام می‌دهد، نیروی دیوار بر روی گلوله (F) است، پس طبق قضیه کار-انرژی جنبشی داریم:

$$W_{\text{برآیند}} = \Delta k \Rightarrow W_F = k_2 - k_1 = 0 - \frac{1}{2} m V_1^2$$

$$\Rightarrow W_F = -\frac{1}{2} \times 200 \times 10^{-3} \times 40^2$$

$$W_F = -160 \text{ J}$$

از طرفی F و جابه‌جایی d گلوله در خلاف جهت هم هستند:

$$W_F = -Fd \Rightarrow -160 = -F \times 0.2 \Rightarrow F = 800 \text{ N}$$

۸۲

گزینه ۲

از لحظه‌ی برخورد چکش با میخ تا لحظه‌ی فرورفتن میخ در چوب، نیروی F از طرف چوب به میخ در خلاف جهت حرکت آن وارد می‌شود بنابراین طبق قضیه کار-انرژی جنبشی داریم:

$$W_{\text{برآیند}} = \Delta k \Rightarrow W_F = k_2 - k_1 = 0 - \frac{1}{2} m V_1^2$$

$$\Rightarrow W_F = -\frac{1}{2} \times 10 \times 10^2 \Rightarrow W_F = -500 \text{ J}$$

$$\text{از طرفی: } W_F = -Fd \Rightarrow -500 = -F \times 2 \times 10^{-2}$$

$$\Rightarrow F = 25000 \text{ N}$$

۸۳

گزینه ۱

اتلاف انرژی در اثر کاری است که درخت روی گلوله انجام می‌دهد W_R بنابراین طبق قضیه کار-انرژی جنبشی داریم:

$$\begin{cases} W_{\text{برآیند}} = \Delta k \\ W_R = -0.6 k_1 \end{cases} \Rightarrow W_R = k_2 - k_1$$

$$\Rightarrow -0.6 k_1 = k_2 - k_1 \Rightarrow k_2 = 0.4 k_1$$


$$\Rightarrow \frac{1}{2} m \times V_2^2 = 0.4 \times \frac{1}{2} m \times V_1^2$$

$$\Rightarrow 10^2 = 0.4 \times V_1^2 \Rightarrow V_1^2 = 250 \Rightarrow V_1 = \sqrt{250}$$

$$\Rightarrow V_1 = 5\sqrt{10} \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

۸۴

گزینه ۲



$$W_N = Nd \cos 90^\circ \Rightarrow W_N = 0$$

$$W_{mg} = mgd \cos 90^\circ \Rightarrow W_{mg} = 0$$

$$W_{f_k} = -45 \text{ J}$$

طبق قضیه کار-انرژی جنبشی داریم:

$$W_{\text{برآیند}} = \Delta k \Rightarrow W_{mg} + W_N + W_{f_k}$$

$$= k_2 - k_1 = \frac{1}{2} m V^2 - \frac{1}{2} m V_0^2 = \frac{1}{2} m (V^2 - V_0^2)$$

$$\Rightarrow 0 + 0 - 45 = \frac{1}{2} \times 2 [(V_0 - 5)^2 - V_0^2]$$

$$\Rightarrow -10V_0 + 25 = -45 \Rightarrow V_0 = \frac{m}{s}$$

۸۵

گزینه ۲

نیروهای F و اصطکاک (f_k) روی جسم کار انجام می‌دهند، کار نیروی وزن در جابه‌جایی‌های افقی صفر است، بنابراین طبق قضیه کار-انرژی جنبشی داریم:

$$W_{\text{برآیند}} = \Delta k \Rightarrow W_F + W_{f_k} = k_2 - k_1$$

$$\Rightarrow W - f_k d = k - 0 \Rightarrow W = k + f_k d \Rightarrow W > k$$

۸۶

گزینه ۳

در طول مسیر $A \rightarrow C$ نیروهای اصطکاک و وزن کار انجام می‌دهند پس طبق قضیه کار و انرژی جنبشی داریم:

$$W_{\text{برآیند}} = \Delta k \Rightarrow (W_{f_k})_{B \rightarrow C} + (W_{mg})_{A \rightarrow B} = k_C - k_A$$

$$\Rightarrow (W_{f_k})_{B \rightarrow C} + mgh = 0 - 0 = 0$$

$$\Rightarrow (W_{f_k})_{B \rightarrow C} = -mgh = -2 \times 10 \times 1/5 \Rightarrow W_{f_k} = -30 \text{ J}$$

$$\text{از طرفی: } W_{f_k} = -f_k d = -f_k BC$$

$$\Rightarrow -30 = -f_k \times 4 \Rightarrow f_k = 7.5 \text{ N}$$

۸۷

گزینه ۲

نیروی وزن و اصطکاک در این جابه‌جایی از نقطه‌ی A تا نقطه‌ی C، کار انجام می‌دهند بنابراین طبق قضیه کار و انرژی داریم:

$$W_{\text{برآیند}} = \Delta k \Rightarrow W_{mg} + W_{f_k} = k_C - k_A$$

$$\Rightarrow mg(h - r) + W_{f_k} = \frac{1}{2} m V_C^2 - 0$$


$$\Rightarrow W_{fk} = \frac{1}{2} m V_f^2 - m g d \sin 30^\circ$$

$$= \frac{1}{2} \times 0.2 \times 5^2 - 0.2 \times 10 \times 5 \times \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow W_{fk} = -2/5 \text{ J}$$

گزینه ۴

نیروهای وزن و اصطکاک بر روی جسم کار انجام می‌دهند بنابراین طبق قضیه کار-انرژی جنبشی داریم:



$$W_{\text{برآیند}} = \Delta k \Rightarrow W_{fk} + W_{mg} = k_f - k_i, W_{mg} = mgh$$


$$\Rightarrow W_{fk} = \frac{1}{2} m (V_f^2 - V_i^2) - mgh$$

$$\Rightarrow W_{fk} = \frac{1}{2} \times 0.2 (1^2 - 5^2) - 0.2 \times 10 \times 12 \times \sin 30^\circ$$

$$\Rightarrow W_{fk} = -81 \text{ J}$$

گزینه ۲

نیروهای وزن و اصطکاک روی جسم کار انجام می‌دهند، بنابراین طبق قضیه کار-انرژی جنبشی داریم:



$$W_{\text{برآیند}} = \Delta k \Rightarrow W_{fk} + W_{mg} = k_B - k_A, W_{mg} = -mgh$$

$$\Rightarrow W_{fk} = \frac{1}{2} m (V_B^2 - V_A^2) + mgh$$

$$\Rightarrow W_{fk} = \frac{1}{2} \times 2 (1^2 - 2^2) + 2 \times 10 \times 12/5$$

$$\Rightarrow W_{fk} = -50 \text{ J}$$

گزینه ۴

چون نقاط ابتدا و انتهای حرکت یکی است پس کار نیروی وزن صفر است بنابراین فقط نیروی اصطکاک کار انجام می‌دهد بنابراین طبق قضیه کار-انرژی جنبشی داریم:

$$W_{\text{برآیند}} = \Delta k \Rightarrow W_{fk} = \frac{1}{2} m (V_f^2 - V_i^2) = \frac{1}{2} m \left[\left(\frac{1}{2} V_0 \right)^2 - V_0^2 \right]$$

$$\Rightarrow W_{fk} = -\frac{3}{8} m V_0^2$$

$$\left| \frac{W_{fk}}{k_0} \right| = \frac{\frac{3}{8} m V_0^2}{\frac{1}{2} m V_0^2} = 0.75$$

$$\Rightarrow 0.8 \times 10 \times (h - 2) - 22 = \frac{1}{2} \times 0.8 \times 5^2$$

$$\Rightarrow h - 2 = 4 \Rightarrow h = 6 \text{ m}$$


گزینه ۲

در جابه‌جایی جسم از A تا B، نیروی وزن و اصطکاک کار انجام می‌دهند بنابراین طبق قضیه کار-انرژی جنبشی داریم:

$$W_{\text{برآیند}} = \Delta k \Rightarrow W_{mg} + W_{fk} = k_B - k_A$$

$$\Rightarrow W_{mg} + W_{fk} = 0 - 0 = 0$$

$$\Rightarrow W_{fk} = -W_{mg} \Rightarrow \frac{W_{fk}}{W_{mg}} = -1$$




گزینه ۴

تندی ثابت است بنابراین داریم:

$$d = V \cdot t = 2 \times 10 \Rightarrow d = 20 \text{ m}$$

$$h = d \sin \alpha = 20 \times 0.6 \Rightarrow h = 12 \text{ m}$$



از طرفی طبق قضیه کار-انرژی جنبشی چون تندی ثابت است، داریم:

$$W_{\text{برآیند}} = \Delta k \Rightarrow W_F + W_{mg} + W_{fk} = 0$$

$$\Rightarrow W_F = -W_{mg} - W_{fk} = -(-mgh) - (-f_k d)$$

$$\Rightarrow W_F = 200 \times 12 + 30 \times 20$$

$$\Rightarrow W_F = 3000 \text{ J}$$

گزینه ۲


طبق قضیه کار-انرژی جنبشی داریم:

$$W_{\text{برآیند}} = \Delta k = k_B - k_A$$

$$= \frac{1}{2} m (V_B^2 - V_A^2)$$

$$W_{\text{برآیند}} = \frac{1}{2} \times 0.4 (2^2 - 6^2)$$

$$\Rightarrow W_{\text{برآیند}} = -6/4 \text{ J}$$



از طرفی اندازه کار نیروی برآیند برابر است با:


$$W_{\text{برآیند}} = F_{\text{برآیند}} \times d \Rightarrow 6/4 = F_{\text{برآیند}} \times 2 \Rightarrow F_{\text{برآیند}} = 3/2 \text{ N}$$

گزینه ۲

نیروی وزن و نیروی اصطکاک روی جسم کار انجام می‌دهند بنابراین طبق قضیه کار-انرژی جنبشی داریم:

$$W_{\text{برآیند}} = \Delta k \Rightarrow W_{mg} + W_{fk} = k_f - k_i$$


$$mgh + W_{fk} = \frac{1}{2} m V_f^2 - 0$$



۹۵

گزینه ۱

چون جسم به مکان اولیه برمی گردد کار نیروی وزن صفر است بنابراین با توجه به قضیه کار-انرژی جنبشی داریم:



$$W_{\text{برآیند}} = \Delta k \Rightarrow W_{f_k} = \frac{1}{2}m(v_2^2 - v_1^2) = \frac{1}{2}m(0 - 4^2)$$

$$\Rightarrow W_{f_k} = -6 \times m$$

بنابراین کار نیروی اصطکاک در مسیر رفت (۱ → ۲) یا برگشت (۲ → ۱) نصف این مقدار است. در مسیر برگشت داریم:

$$W_{\text{برآیند}} = \Delta k \Rightarrow W_{mg} + W_{f_k} = \frac{1}{2}m(v_2^2 - v_1^2)$$

$$\Rightarrow mgh - 3 \times m = \frac{1}{2}m(0 - 0)$$

$$\Rightarrow 10 \times OA \sin 30 - 3 = 0 \Rightarrow OA = \frac{3}{5} \Rightarrow OA = 1 \text{ m}$$

۹۶

گزینه ۳


قضیه کار-انرژی جنبشی را برای مسیر رفت جسم می نویسیم، دو نیروی وزن و اصطکاک روی جسم کار انجام می دهند.

$$W_{\text{برآیند}} = \Delta k \Rightarrow W_{mg} + W_{f_k} = k_2 - k_1$$

$$-mgh + W_{f_k} = 0 - \frac{1}{2}mv_1^2$$

$$\Rightarrow W_{f_k} = -\frac{1}{2} \times 2 \times 5^2 + 2 \times 10 \times 1$$

$$\Rightarrow W_{f_k} = -5 \text{ J}$$



کار نیروی اصطکاک در مسیر برگشت هم برابر ۵ J است و در نتیجه کار نیروی اصطکاک در کل مسیر رفت و برگشت برابر ۱۰ J است.


۹۷

گزینه ۱

انرژی مصرف شده برای بالا بردن جسم، به صورت انرژی پتانسیل گرانشی در جسم ذخیره می شود بنابراین داریم:

$$U = mgh \Rightarrow 10 = 1 \times 10 \times h$$

$$\Rightarrow h = 1 \text{ m}$$



۹۸

گزینه ۳

اگر جسم به اندازه Δh به سطح زمین (مبدأ انرژی پتانسیل گرانشی $U=0$) نزدیک شود انرژی پتانسیل گرانشی آن به صورت زیر تغییر می کند:

$$\Delta U = -mg\Delta h = -120 \times 10 \times (80 - 35)$$

$$= -54000 \text{ J}$$

$$W_{mg} = -\Delta U \Rightarrow W_{mg} = +54000 \text{ J}$$

۹۹

گزینه ۱

راه حل اول:

$$\begin{cases} h_1 = (60 - 15) = 45 \text{ m} \\ h_2 = 60 \text{ m} \\ U_1 = -mgh_1 = -70 \times 10 \times 45 = -31500 \text{ J} \\ U_2 = -mgh_2 = -70 \times 10 \times 60 = -42000 \text{ J} \end{cases}$$

$$\Delta U = U_2 - U_1 = -42000 - (-31500)$$

$$\Rightarrow \Delta U = -10500$$

راه حل دوم:

چون غواص به سمت پایین جابه جا شده است، پس داریم:

$$\Delta U = -mg\Delta h = -70 \times 10 \times (60 - 45)$$

$$\Rightarrow \Delta U = -10500 \text{ J}$$

۱۰۰

گزینه ۱

$$\begin{cases} U_A = mgh \\ U_B = mg \frac{h}{2} \Rightarrow \frac{U_B}{U_A} = \frac{1}{2} \end{cases}$$

۱۰۱

گزینه ۲

چون تندی جسم تغییر نکرده، بنابراین انرژی جنبشی ثابت می ماند.

۱۰۲


گزینه ۳

اگر سطح زمین را به عنوان مبدأ انرژی پتانسیل در نظر بگیریم، تغییر انرژی پتانسیل برابر است با:

$$\Delta U = mgh = 1000 \times 9.8 \times 2 \Rightarrow \Delta U = 19600 \text{ J} = 19.6 \text{ kJ}$$

۱۰۳

گزینه ۳



$$\Delta U = U_2 - U_1 = U_2 - 0 = U = mgh$$

$$\Rightarrow \Delta U = 500 \times 2 = 1000 \text{ J}$$

۱۰۴

گزینه ۳

با توجه به این که کار نیروی وزن منفی است، بنابراین می توان گفت که جسم به سمت بالا جابه جا شده است بنابراین داریم:


$$\begin{aligned} \left\{ \begin{aligned} V_1 &= 4 \frac{m}{s} \Rightarrow W_t = \Delta k \\ V_f &= 0 \Rightarrow k_f = 0 \\ \Rightarrow W_{\text{فنر}} &= k_f - k_1 = 0 - k_1 = -k_1 \\ \Rightarrow W_{\text{فنر}} &= -\frac{1}{2} m V_1^2 = -\frac{1}{2} \times 0.5 \times 4^2 \\ \Rightarrow W_{\text{فنر}} &= -4 \text{ J} \end{aligned} \right. \end{aligned}$$

از طرفی تغییرات انرژی پتانسیل کشسانی سامانه جسم- فنر برابر منفی کار نیروی فنر بر روی جسم است:

$$\Delta U = -W_{\text{فنر}} \Rightarrow \Delta U = -(-4) \Rightarrow \Delta U = 4 \text{ J}$$

گزینه ۴


از مقاومت هوا صرف نظر شده است بنابراین انرژی مکانیکی جسم در طول مسیر پایسته است.



$$\begin{aligned} E_1 &= E_f \Rightarrow k_1 + U_1 = k_f + U_f \Rightarrow 0 + mgh = 20 + mg \frac{h}{4} \\ \Rightarrow mg \frac{h}{4} &= 20 \Rightarrow 1 \times 10 \times \frac{h}{4} = 20 \Rightarrow h = 4 \text{ m} \end{aligned}$$

گزینه ۳


از مقاومت هوا صرف نظر شده است بنابراین انرژی مکانیکی جسم در طول مسیر پایسته است:




$$\begin{aligned} \Rightarrow k_f &= mgh \Rightarrow \frac{k_B}{k_A} = \frac{m_B}{m_A} \times \frac{h_B}{h_A} = \frac{2m}{m} \times \frac{20}{10} \\ \Rightarrow \frac{k_B}{k_A} &= 4 \end{aligned}$$

گزینه ۴

از مقاومت هوا صرف نظر شده است بنابراین انرژی مکانیکی گلوله در طول مسیر پایسته است.



$$\begin{aligned} E_1 &= E_f \Rightarrow k_1 + U_1 = k_f + U_f \\ \Rightarrow k_1 + mgh &= (k_1 + 10) + 0 \\ 50 \times 10^{-3} \times 10 \times h &= 10 \Rightarrow h = 20 \text{ m} \end{aligned}$$



(مبدأ انرژی پتانسیل) $U = 0$

$$\Delta U = -W_{mg} \Rightarrow U_B - U_A = -(-40)$$

$$\Rightarrow 60 - U_A = 40 \Rightarrow U_A = 20 \text{ J}$$


گزینه ۲

$$(F_{\text{برآیند}})_y = ma \Rightarrow F - mg = ma$$

$$\Rightarrow F = m \frac{g}{4} + mg \Rightarrow F = \frac{5}{4} mg$$

$$W_F = Fh \cos 0 \Rightarrow W_F = \frac{5}{4} mgh$$

$$U = mgh \Rightarrow \frac{W_F}{U} = \frac{\frac{5}{4} mgh}{mgh} = \frac{5}{4}$$



گزینه ۴

اگر جسم به اندازه Δh به سطح زمین نزدیک شود، انرژی

پتانسیل گرانشی جسم به صورت زیر تغییر می کند:

$$\begin{cases} \Delta U = -mg\Delta h = -mg(4R) \\ \Delta h = h_P - h_Q = 5R - R = 4R \end{cases}$$

$$\Rightarrow \Delta U = -4mgR$$

$$\Delta h_{(S,P)} = 5R - 2R = 3R$$

$$\Rightarrow \Delta U = -mg\Delta h_{(P,S)} = -3mgR$$

$$W_{mg} = -\Delta U = 3mgR$$

$$\frac{\Delta U_{(P,Q)}}{W_{mg}} = \frac{-4mgR}{3mgR} = -\frac{4}{3}$$

گزینه ۴

زمین را مبدأ انرژی پتانسیل در نظر می گیریم و از مقاومت هوا صرف نظر می کنیم و فرض می کنیم جسم ابتدا در حال سکون بوده است.

$$\begin{aligned} W_{\text{شخص}} &= \Delta U + \Delta K \Rightarrow W_{\text{شخص}} = U_f - U_1 + k_f - k_1 \\ &= mgh - 0 + \frac{1}{2} m V_f^2 - 0 \end{aligned}$$


$$\Rightarrow W_{\text{شخص}} = 1 \times 10 \times 2 + \frac{1}{2} \times 1 \times 5^2 \Rightarrow W_{\text{شخص}} = 32.5 \text{ J}$$

گزینه ۱

با توجه به نبود اصطکاک از لحظه ی برخورد جسم با فنر تا لحظه ی متوقف شدن آن ($V_f = 0$)، فقط نیروی فنر بر روی جسم کار انجام می دهد بنابراین برای محاسبه ی کار نیروی فنر طبق قضیه ی کار- انرژی جنبشی داریم:

۱۱۲

گزینه ۳



$$E_1 = E_p \Rightarrow k_1 + U_1 = k_p + U_p$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} m V_1^2 + 0 = 0 + mgh \Rightarrow h = \frac{V_1^2}{2g} = \frac{10^2}{2 \times 10}$$

$$\Rightarrow h = 5 \text{ m}$$

$$E_1 = E_p \Rightarrow \frac{1}{2} m V_1^2 = \frac{1}{2} m V_p^2 + mgh$$


$$\Rightarrow V_p = \sqrt{V_1^2 - 2gh} = \sqrt{10^2 - 2 \times 10 \times 5} = \sqrt{0} = 0$$

$$\Rightarrow V_p = 0 \text{ m/s}$$

۱۱۳

گزینه ۱

از مقاومت هوا صرف نظر می شود بنابراین انرژی مکانیکی گلوله در طول مسیر ثابت است.



$$E_1 = E_p \Rightarrow k_1 + U_1 = k_p + U_p$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} m V_1^2 + mgh = k_p + 0$$


$$\Rightarrow k_p = \frac{1}{2} m \times 10^2 + m \times 10 \times 10 \Rightarrow k_p = 150 \text{ m}$$

$$k_1 = \frac{1}{2} m V_1^2 = \frac{1}{2} m \times 10^2 \Rightarrow k_1 = 50 \text{ m}$$

$$\Rightarrow \frac{k_p}{k_1} = \frac{150}{50} = 3$$

۱۱۴

گزینه ۲



تندی گلوله در لحظه ای که از بالن رها می شود برابر $20 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ و جهت آن به سمت بالاست. از طرفی چون مقاومت هوا ناچیز است بنابراین انرژی مکانیکی گلوله در کل مسیر پایسته است.

$$E_1 = E_p \Rightarrow k_1 + U_1 = k_p + U_p$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} m V_1^2 + mgh_1 = \frac{1}{2} m V_p^2 + 0$$

$$\frac{1}{2} m \times 20^2 + m \times 10 \times 10 = \frac{1}{2} m V_p^2 \Rightarrow V_p^2 = 400$$

$$E_1 = E_p \Rightarrow k_1 + U_1 = k_p + U_p$$

$$\Rightarrow 1200 \text{ m} = \frac{1}{2} m \left(\frac{V_p}{2}\right)^2 + mgh_p$$

$$\Rightarrow 10h_p = 1200 - 300 \Rightarrow h_p = 90 \text{ m}$$

گزینه ۳ ۱۱۵

با توجه به این که از مقاومت هوا صرف نظر شده است پس انرژی مکانیکی بمب در طول مسیر پایسته است.


$$E_1 = E_p \Rightarrow k_1 + U_1 = k_p + U_p$$

$$\frac{1}{2} m V_1^2 + mgh = \frac{1}{2} m V_p^2 + 0$$

$$\Rightarrow V_p = \sqrt{V_1^2 + 2gh}$$

$$= \sqrt{250^2 + 2 \times 10 \times 200}$$

$$\Rightarrow V_p \approx 258 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$



گزینه ۲ ۱۱۶

از مقاومت هوا صرف نظر شده است، بنابراین داریم:

$$\begin{cases} E_1 = E_p \Rightarrow k_1 + U_1 = k_p + U_p \\ U_1 = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} m V_1^2 + 0 = \frac{1}{2} m V_p^2 + mgh_p$$

$$\frac{1}{2} \times (40)^2 = \frac{1}{2} \times (20)^2 + 10h_p \Rightarrow h_p = 60 \text{ m}$$

گزینه ۲ ۱۱۷

از مقاومت هوا صرف نظر شده است بنابراین انرژی مکانیکی جسم در طول مسیر پایسته است پس تغییرات انرژی پتانسیل جسم برابر با منفی تغییرات انرژی جنبشی آن است.

$$E_1 = E_p \Rightarrow k_1 + U_1 = k_p + U_p \Rightarrow U_p - U_1 = -(k_p - k_1)$$

$$\Rightarrow \Delta U = -\Delta k$$

$$\begin{cases} V_1 = 0 \Rightarrow k_1 = 0 \\ V_p = V \Rightarrow k_p = \frac{1}{2} m V^2 \Rightarrow \Delta k = \frac{1}{2} m V^2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \Delta U = -\Delta k = -\frac{1}{2} m V^2$$

بنابراین انرژی جنبشی جسم به اندازه $\frac{1}{2} m V^2$ زیاد می شود و

در نتیجه انرژی پتانسیل آن به اندازه $\frac{1}{2} m V^2$ کاهش می یابد.

گزینه ۱

۱۲۱

چون مقاومت هوا ندارد پس انرژی مکانیکی پایسته است:



$$E = k + U = \text{ثابت} \Rightarrow K = -U + \text{ثابت}$$

بنابراین نمودار $k - U$ یک خط راست با شیب منفی و عرض از مبدأ مثبت است.

گزینه ۴

۱۲۲

چون مقاومت هوا وجود ندارد پس انرژی مکانیکی (E) پایسته است (بدون تغییر می‌ماند):



گزینه ۳

۱۲۳

کار برآیند نیروهای وارد بر جسم برابر است با مجموع کار تک‌تک نیروهای وارد بر جسم

$$(W) = W_1 + W_2 + \dots$$

بنابراین اگر کار برآیند نیروهای وارد بر جسم صفر باشد، مجموع کار نیروهای وارد بر جسم نیز صفر است.

گزینه ۱

۱۲۴


چون سطح بدون اصطکاک است انرژی مکانیکی وزنه در طول مسیر پایسته است.

$$E_1 = E_2 \Rightarrow k_1 + U_1 = k_2 + U_2$$

$$0 + mgh = k_2 + 0$$

$$\Rightarrow k_2 = mgh = 2 \times 10 \times 5$$

$$\Rightarrow k_2 = 100 \text{ J}$$



گزینه ۳

۱۲۵

چون از اصطکاک صرف‌نظر شده است انرژی مکانیکی جسم در طول مسیر پایسته است.

$$E_1 = E_2 \Rightarrow k_1 + U_1 = k_2 + U_2$$

گزینه ۳


۱۱۸

چون مقاومت هوا وجود ندارد پس انرژی مکانیکی پایسته است.

$$E_1 = E_2 \Rightarrow k_1 + U_1 = k_2 + U_2$$

$$k_1 = \frac{1}{2} U_2 + U_2 = \frac{3}{2} U_2 \Rightarrow \frac{1}{2} m V_1^2 = \frac{3}{2} mgh$$


$$h = \frac{V_1^2}{3g} = \frac{30^2}{3 \times 10} \Rightarrow h = 30 \text{ m}$$



گزینه ۱

۱۱۹

از مقاومت هوا صرف‌نظر شده است پس انرژی مکانیکی گلوله در طول مسیر پایسته است.



$$E_1 = E_2 \Rightarrow k_1 + U_1 = k_2 + U_2$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} m V_0^2 + 0 = \frac{1}{2} m \left(\frac{V_0}{5}\right)^2 + U_2$$

$$\Rightarrow U_2 = \frac{m V_0^2}{2} - \frac{m V_0^2}{50} \Rightarrow U_2 = \frac{24}{50} m V_0^2$$

انرژی مکانیکی گلوله در نقطه‌ی ۲ همان انرژی مکانیکی گلوله در نقطه‌ی ۱ است:

$$E_1 = k_1 + U_1 = \frac{1}{2} m V_0^2 + 0 \Rightarrow E_2 = E_1 = \frac{1}{2} m V_0^2$$

$$\frac{U_2}{E_2} = \frac{\frac{24}{50} m V_0^2}{\frac{1}{2} m V_0^2} \Rightarrow \frac{U_2}{E_2} = \frac{24}{25}$$


گزینه ۴

۱۲۰

اگر از مقاومت هوا صرف‌نظر شود، انرژی مکانیکی جسم پایسته می‌ماند بنابراین انرژی مکانیکی در نصف ارتفاع اوج یا هر نقطه‌ی دیگری با انرژی مکانیکی در لحظه پرتاب برابر است:


$$E_2 = E_1 \Rightarrow E_2 = k_1 + U_1 = \frac{1}{2} m V_1^2 = \frac{1}{2} \times 2 \times 10^2$$

$$\Rightarrow E_2 = 100 \text{ J}$$



$$0 + mgh_1 = \frac{1}{2} m V_1^2 + 0$$

$$\Rightarrow V_1 = \sqrt{2gh_1} = \sqrt{2gl(1 - \cos 45^\circ)}$$



بنابراین تندی آونگ در عبور از وضع تعادل فقط متناسب با $\sqrt{l}$ است:

$$\frac{V_A}{V_B} = \sqrt{\frac{l_A}{l_B}} = 1 \Rightarrow V_A = V_B$$

گزینه ۲. ۱۲۹

چون از مقاومت هوا صرف نظر شده است، انرژی مکانیکی آونگ پایسته می ماند.

$$E_1 = E_2 \Rightarrow k_1 + U_1 = k_2 + U_2$$

$$\frac{1}{2} m V_1^2 + 0 = \frac{1}{2} m V_2^2 + mgh_2$$

$$\Rightarrow V_2^2 = V_1^2 + 2gh_2$$

چون کمترین مقدار V خواسته شده است باید فرض کنیم تندی در نقطه ی ۲ صفر شود و ریسمان دیگر بالاتر نرود.


$$\Rightarrow V = \sqrt{2gh_2} = \sqrt{2gl \cos 37}$$

$$= \sqrt{2 \times 10 \times 1 / 25 \times 0.8} = \sqrt{20} = \sqrt{4 \times 5}$$

$$\Rightarrow V = 2\sqrt{5} \frac{m}{s}$$

گزینه ۳. ۱۳۰

چون مقاومت هوا ناچیز است، انرژی مکانیکی آونگ پایسته است. بالاترین نقطه ی مسیر، مکانی است که تندی در آن جا صفر است.




$$V_1^2 = 2gh_2 = 2gl(1 - \cos \alpha)$$

$$4^2 = 2 \times 10 \times 1 / 6(1 - \cos \alpha)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{6} = 1 - \cos \alpha \Rightarrow \cos \alpha = \frac{1}{6} \Rightarrow \alpha = 60^\circ$$

$$\Rightarrow 0 + mgh = \frac{1}{2} m V_1^2 + 0$$

$$\Rightarrow V_1 = \sqrt{2gh}$$



بنابراین تندی گلوله در موقع رسیدن به پایین سطح فقط تابعی از ارتفاع سطح شیبدار است بنابراین برای هر دو جسم A و B که از یک ارتفاع مشخص رها می شوند، تندی آن ها در لحظه رسیدن به پایین سطح شیبدار یکی است.


گزینه ۴. ۱۲۶

از اصطکاک صرف نظر شده است پس انرژی مکانیکی جسم پایسته است.

$$E_1 = E_2 \Rightarrow k_1 + U_1 = k_2 + U_2$$


$$0 + mgh = k_2 \Rightarrow k_2 = mgh$$

$$\frac{k_{\text{سبک}}}{k_{\text{سنگین}}} = \frac{m}{2m} \times \frac{h}{h} = \frac{1}{2}$$



گزینه ۴. ۱۲۷

چون از مقاومت هوا صرف نظر شده است بنابراین انرژی مکانیکی گلوله در طول مسیر پایسته است. بنابراین هر چه جسم پایین تر می رود انرژی پتانسیل آن کم تر و انرژی جنبشی آن بیش تر خواهد شد در نتیجه تندی گلوله در پایین ترین نقطه مسیر (نقطه B)، بیش ترین مقدار را خواهد داشت:



$$E_A = E_B \Rightarrow k_A + U_A = k_B + U_B$$

$$0 + mgh_A = \frac{1}{2} m V_B^2 + 0$$

$$V_B^2 = 2gh_A = \sqrt{2g \frac{l}{2}} = \sqrt{gl} = \sqrt{10 \times 2 / 5}$$

$$\Rightarrow V_B = 2 \frac{m}{s}$$

گزینه ۴. ۱۲۸

اصطکاک و مقاومت هوا ناچیز است بنابراین انرژی مکانیکی آونگ پایسته است.

$$E_1 = E_2 \Rightarrow k_1 + U_1 = k_2 + U_2$$

$$\cos \beta = 0 \Rightarrow \beta = 90^\circ$$

گزینه ۲ ۱۳۳

چون از اصطکاک صرف نظر شده است، انرژی مکانیکی ارباب در طول مسیر پایسته است. مبدأ انرژی پتانسیل را زمین در نظر می گیریم:

$$E_A = E_B \Rightarrow k_A + U_A = k_B + U_B$$


$$\frac{1}{2} m V_A^2 + mgh_A = \frac{1}{2} m V_B^2 + mgh_B$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \times (2)^2 + 10 \times 4 = \frac{1}{2} \times V_B^2 + 10 \times 1$$

$$V_B^2 = 64 \Rightarrow V_B = 8 \frac{m}{s}$$

گزینه ۴ ۱۳۴

چون اصطکاک ناچیز است انرژی مکانیکی ارباب پایسته است.



$$E_A = E_B \Rightarrow k_A + U_A = k_B + U_B$$

$$0 + mgh_A = \frac{1}{2} m V_B^2 + mgh_B$$

$$\Rightarrow V_B^2 = 2g(h_A - h_B) \quad (1)$$

$$E_A = E_C \Rightarrow k_A + U_A = k_C + U_C$$

$$\Rightarrow 0 + mgh_A = \frac{1}{2} m V_C^2 + mgh_C$$


$$\Rightarrow V_C^2 = 2g(h_A - h_C) \quad (2)$$

$$\frac{(1)}{(2)} \Rightarrow \frac{V_B^2}{V_C^2} = \frac{2g(h_A - h_B)}{2g(h_A - h_C)} = \frac{3.0 - 1.2}{3.0 - 2.4} = \frac{1.8}{0.6} = 3$$

$$\Rightarrow \frac{V_B}{V_C} = \sqrt{3}$$

گزینه ۲ ۱۳۵

چون مسیر بدون اصطکاک است انرژی مکانیکی گلوله پایسته می ماند. از طرفی گلوله تا جایی بالا می رود که تندی آن صفر شود. اگر فرض کنیم این نقطه، نقطه (۲) باشد، داریم:



$$E_1 = E_2 \Rightarrow k_1 + U_1 = k_2 + U_2$$

$$\frac{1}{2} m V^2 + 0 = 0 + mgh \Rightarrow h = \frac{V^2}{2g} = \frac{rg}{2g}$$

$$\Rightarrow h = r$$

یعنی جسم تا نقطه C بالا می رود.

گزینه ۳

۱۳۱

از مقاومت هوا صرف نظر شده است پس انرژی مکانیکی گلوله در مسیر پایسته است.


$$E_1 = E_2 \Rightarrow k_1 + U_1 = k_2 + U_2$$

$$0 + mgh_1 = \frac{1}{2} m V_2^2 + mgh_2$$

$$\Rightarrow V_2^2 = 2gh_1 - 2gh_2 = 2g(h_1 - h_2)$$

$$V_2^2 = 2g(l - l \cos \alpha - l + l \cos \beta)$$

$$\Rightarrow V_2 = \sqrt{2gl(\cos \beta - \cos \alpha)}$$



بنابراین اگر گلوله ای را به اندازه ی زاویه ی α از وضع تعادل خارج کرده، رها کنیم تندی آن در هر لحظه از رابطه ی بالا به دست می آید.

$$\left\{ \begin{array}{l} \alpha = 53^\circ \\ \beta = 0 \end{array} \right. \Rightarrow V_2 = V = \sqrt{2gl(\cos 0 - \cos 53^\circ)}$$

$$\Rightarrow V = \sqrt{2 \times 10 \times 1 \times 0.4} \Rightarrow V = \sqrt{8l}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \alpha = 53^\circ \\ \beta = ? \\ V_2 = \frac{\sqrt{2}}{2} V \end{array} \right. \Rightarrow V_2 = \sqrt{2gl(\cos \beta - \cos 53^\circ)}$$

$$\Rightarrow \frac{\sqrt{2}}{2} \times \sqrt{8l} = \sqrt{2} \sqrt{l} = \sqrt{2 \cdot l(\cos \beta - 0.6)}$$


$$\Rightarrow 4l = 2 \cdot l(\cos \beta - 0.6) \Rightarrow \cos \beta = 0.2 + 0.6 = 0.8$$

$$\Rightarrow \beta = 37^\circ$$

گزینه ۳

۱۳۲

مقاومت هوا ناچیز است بنابراین انرژی مکانیکی آونگ در طول مسیر پایسته است.



$$E_1 = E_2 \Rightarrow k_1 + U_1 = k_2 + U_2$$

$$0 + mgh = 0 + mgh_2 \Rightarrow h_1 = h_2$$

$$\Rightarrow l_1 - l_1 \cos 60 = l_1 - l_1 \cos \beta$$


$$\frac{l_1}{2} = l_1(1 - \cos \beta)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} = 1 - \cos \beta \Rightarrow 1 - \cos \beta = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow E_1 = 5180 \text{ J}$$

$$E_2 = K_2 + U_2 = \frac{1}{2} m V_2^2 + mgh_2$$

$$\Rightarrow E_2 = \frac{1}{2} \times 10 \times 20^2 + 0 \Rightarrow E_2 = 2000 \text{ J}$$




بنابراین کار انجام شده توسط نیروی مقاومت هوا (W_f) برابر است با:

$$W_f = E_2 - E_1 = 2000 - 5180 \Rightarrow W_f = -3180 \text{ J}$$

گزینه ۲. ۱۴۱

کار نیروی مقاومت هوا را در طول مسیر با W_R نشان می‌دهیم. بنابراین داریم:




$$W_R = E_2 - E_1 = K_2 + U_2 - K_1 - U_1 = \frac{1}{2} m V_2^2 + 0 - 0 - mgh$$

$$\Rightarrow W_R = \frac{1}{2} \times 2 \times 8^2 - 2 \times 10 \times 5 \Rightarrow W_R = -36 \text{ J}$$

گزینه ۳. ۱۴۲

اگر کار انجام شده توسط نیروی مقاومت هوا را W_R بنامیم، داریم:



$$W_R = E_2 - E_1$$

$$E_1 = K_1 + U_1 = 0 + mgh = m \times 10 \times 4 \Rightarrow E_1 = 40 \text{ m}$$

$$W_R = -0.2 E_1 \Rightarrow W_R = -8 \text{ m}$$

$$E_2 = K_2 + U_2 = \frac{1}{2} m V_2^2 + 0 \Rightarrow E_2 = \frac{1}{2} m V_2^2$$

$$\Rightarrow -8 \text{ m} = \frac{1}{2} m V_2^2 - 40 \text{ m} \Rightarrow 32 = \frac{1}{2} V_2^2 \Rightarrow V_2 = 8 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

راه حل دوم:

وقتی جسم سقوط کرده، ۲۰٪ انرژی اولیه آن تلف شده و ۸۰٪ آن در لحظه برخورد با زمین باقی می‌ماند:


گزینه ۱. ۱۳۶

چون از اصطکاک و مقاومت هوا صرف‌نظر شده است، انرژی مکانیکی جسم پایسته می‌ماند.

$$E_1 = E_2 \Rightarrow K_1 + U_1 = K_2 + U_2$$

$$0 + 0 = K_2 + mg \frac{l}{3} - mg \times \frac{2l}{3}$$

$$\Rightarrow K_2 = \frac{1}{3} mgl$$



گزینه ۲. ۱۳۷

طبق تعریف، انرژی درونی یک جسم، مجموع انرژی‌های جنبشی و پتانسیل ذره‌های تشکیل‌دهنده آن است.

گزینه ی «۱»: انرژی جنبشی متناسب با مجذور تندی است

$$k = \frac{1}{2} m V^2$$

گزینه ی «۳»: انرژی پتانسیل گرانشی متناسب با جرم و ارتفاع آن از سطح زمین است $U = mgh$.

گزینه ی «۴»: انرژی مکانیکی، مجموع انرژی پتانسیل و جنبشی جسم است $E = k + U$.

گزینه ۲. ۱۳۸

به علت وجود مقاومت هوا، انرژی مکانیکی جسم رفته‌رفته کاهش می‌یابد.

گزینه ۳. ۱۳۹

حرکت تکه گل قبل و بعد از برخورد به قطار افقی است بنابراین انرژی پتانسیل آن در طول مسیر صفر است. از طرفی اگر کاری که باعث اتلاف انرژی می‌شود را با W' نشان دهیم، داریم:

$$W' = E_2 - E_1 = K_2 + U_2 - K_1 - U_1 = \frac{1}{2} m V_2^2 + 0 - \frac{1}{2} m V_1^2 - 0$$

$$\Rightarrow W' = \frac{1}{2} \times 400 \times 10^{-3} \times \left(\frac{54}{3.6}\right)^2 - \frac{1}{2} \times 400 \times 10^{-3} \times (20)^2$$

$$W' = 45 - 80 \Rightarrow W' = -35 \text{ J}$$

بنابراین ۳۵ J انرژی در اثر این برخورد اتلاف می‌شود.

گزینه ۴. ۱۴۰

مبدأ انرژی پتانسیل گرانشی را سطح زمین در نظر می‌گیریم، بنابراین داریم:

$$E_1 = K_1 + U_1 = \frac{1}{2} m V_1^2 + mgh_1$$

$$\Rightarrow E_1 = \frac{1}{2} \times 10 \times 6^2 + 10 \times 10 \times 50$$

$$\Rightarrow E_1 = 10 \text{ J}$$


$$E_2 = k_2 + U_2 = \frac{1}{2} m V_2^2 + 0 = \frac{1}{2} \times 200 \times 10^{-3} \times 9^2$$

$$\Rightarrow E_2 = 8.1 \text{ J}$$

$$W_R = E_2 - E_1 = 8.1 - 10 \Rightarrow W_R = -1.9 \text{ J}$$

بنابراین ۱/۹ ژول انرژی به صورت گرما به محیط و توپ داده شده است.

گزینه ۴



$$W_R = E_2 - E_1 = k_2 + U_2 - k_1 - U_1$$

$$= \frac{1}{2} m V_2^2 + 0 - \frac{1}{2} m V_1^2 - 0$$

$$\Rightarrow W_R = \frac{1}{2} m \times 20^2 - \frac{1}{2} m \times 40^2 \Rightarrow W_R = -600 \text{ m}$$

از طرفی کار نیروی مقاومت هوا برابر مجموع کار نیروی مقاومت هوا در مسیر رفت و برگشت است و از آن جایی که کار نیروی مقاومت هوا در مسیر رفت دو برابر مسیر برگشت گلوله است، داریم:

$$W_R = W_{\text{رفت}} + W_{\text{برگشت}} = W_{\text{رفت}} + \frac{W_{\text{رفت}}}{2} = \frac{3}{2} W_{\text{رفت}}$$

$$\Rightarrow W_{\text{رفت}} = \frac{2}{3} W_R = \frac{2}{3} \times -600 \text{ m}$$

$$\Rightarrow W_{\text{رفت}} = -400 \text{ m}$$

$$W_{\text{رفت}} = E_2 - E_1 = k_2 + U_2 - k_1 - U_1$$

$$= 0 + mgh_{\text{max}} - \frac{1}{2} m V_1^2 - 0$$

$$\Rightarrow -400 \text{ m} = 10 m h_{\text{max}} - \frac{1}{2} m \times 40^2$$

$$\Rightarrow -400 + 800 = 10 h_{\text{max}}$$

$$\Rightarrow h_{\text{max}} = 40 \text{ متر}$$

گزینه ۱

جسم روی سطح افقی جابه‌جا می‌شود بنابراین انرژی پتانسیل گرانشی در هر دو نقطه A و B صفر است، از طرفی انرژی مکانیکی در اثر حضور نیروهای اصطکاک تلف می‌شود:

$$E_A = k_A + U_A = k_A = \frac{1}{2} m V_A^2$$


$$E_1 = k_1 + U_1 = 0 + mgh \Rightarrow E_1 = 40 \text{ m}$$

$$\Rightarrow E_2 = \frac{8}{100} E_1 \Rightarrow E_2 = 3.2 \text{ m}$$

$$E_2 = k_2 + U_2 = \frac{1}{2} m V_2^2 + 0$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} m V_2^2 = 3.2 \text{ m} \Rightarrow V_2 = 8 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

گزینه ۲



به علت وجود مقاومت هوا، انرژی مکانیکی گلوله از لحظه پرتاب تا لحظه برخورد با زمین کاهش می‌یابد بنابراین کار نیروی هوا (W_R) برابر با تغییرات انرژی مکانیکی آن است.

$$W_R = E_2 - E_1 = (k_2 + U_2) - (k_1 + U_1)$$

$$\Rightarrow W_R = k_2 + 0 - \frac{1}{2} m V_1^2 - mgh$$

$$\Rightarrow -2 = k_2 - \frac{1}{2} \times 100 \times 10^{-3} \times 2^2 - 100 \times 10^{-3} \times 10 \times 10$$

$$\Rightarrow k_2 = -2 + 0 + 2 + 10 \Rightarrow k_2 = 8/2 \text{ J}$$

گزینه ۱

اگر کار انجام شده توسط نیروی مقاومت هوا را W_R بنامیم آن‌گاه خواهیم داشت:

$$W_R = E_2 - E_1 = (k_2 + U_2) - (k_1 + U_1)$$

$$= k_2 - k_1 + U_2 - U_1$$

$$\Rightarrow W_R = \Delta k + \Delta U \Rightarrow W_R = -25 + 40 \Rightarrow W_R = -15 \text{ J}$$


از طرفی چون نیروی مقاومت هوا (R) در خلاف جهت حرکت جسم بر آن وارد می‌شود داریم:

$$W_R = R d \cos \theta \Rightarrow W_R = R d \cos \pi$$

$$\Rightarrow W_R = -R d \Rightarrow -15 = -R \times 6$$

$$\Rightarrow R = 2.5 \text{ J}$$

گزینه ۱




کار نیروی مقاومت هوا بر روی توپ (W_R) به صورت انرژی گرمایی به محیط و توپ داده می‌شود.

$$E_1 = k_1 + U_1 = \frac{1}{2} m V_1^2 + 0 = \frac{1}{2} \times 200 \times 10^{-3} \times 10^2$$

گزینه ۴ - ۱۵۰

به علت وجود اصطکاک، انرژی مکانیکی جسم تغییر می‌کند بنابراین داریم:

$$\begin{aligned} W_{fk} &= E_f - E_i = (k_f + U_f) - (k_i + U_i) \\ \Rightarrow W_{fk} &= \left(\frac{1}{2}mV_f^2 + 0\right) - \left(\frac{1}{2}mV_i^2 + mgh_i\right) \\ \Rightarrow W_{fk} &= \frac{1}{2} \times 2 \times (8^2 - 5^2) - 2 \times 10 \times 6 \\ \Rightarrow W_{fk} &= -81 \text{ J} \end{aligned}$$



گزینه ۱ - ۱۵۱

$$\begin{aligned} E_i &= k_i + U_i \\ &= \frac{1}{2}mV_i^2 + 0 = \frac{1}{2}mV_i^2 \\ \Rightarrow E_i &= \frac{1}{2} \times 1 \times 6^2 \\ \Rightarrow E_i &= 18 \text{ J} \\ E_f &= k_f + U_f = \frac{1}{2}mV_f^2 + U_f \\ \Rightarrow E_f &= \frac{1}{2} \times 1 \times 2^2 + 1 \times 10 \times 1/2 \Rightarrow E_f = 14 \text{ J} \\ \Delta E &= E_f - E_i = 14 - 18 \Rightarrow \Delta E = -4 \text{ J} \end{aligned}$$

پس انرژی مکانیکی به اندازه‌ی ۴ J کاهش می‌یابد.

گزینه ۴ - ۱۵۲

به علت وجود اصطکاک، انرژی مکانیکی پایسته نمی‌ماند. انرژی تلف شده توسط اصطکاک را که به صورت گرما ظاهر می‌شود به صورت $E_{\text{تلف}}$ نشان می‌دهیم:

$$\begin{aligned} \begin{cases} k_i = 0 \\ U_i = mgh_i = 0/5 \times 10 \times 1 = 5 \text{ J} \end{cases} \Rightarrow E_i = 5 \text{ J} \\ \begin{cases} k_f = \frac{1}{2}mV_f^2 = \frac{1}{2} \times 0/5 \times 5^2 = 0/25 V_f^2 \\ U_f = 0 \end{cases} \Rightarrow E_f = 0/25 V_f^2 \\ E_{\text{تلف شده}} = E_f - E_i \Rightarrow -1 = 0/25 V_f^2 - 5 \Rightarrow V_f^2 = 16 \\ \Rightarrow V_f = 4 \frac{\text{m}}{\text{s}} \end{aligned}$$

راه حل دوم:

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2} \times 0/45 \times (8)^2 = 14/4 \text{ J} \\ W_f &= E_B - E_A = \frac{2}{100} \times k_A = \frac{2}{100} \times 14/4 = 2/88 \text{ J} \\ \begin{cases} W_f = E_B - E_A \\ E_B = k_B + U_B = k_B + 0 = k_B = \frac{1}{2}mV_B^2 \end{cases} \\ \Rightarrow -2/88 &= \frac{1}{2} \times 0/45 \times V_B^2 - 14/4 \\ \Rightarrow V_B &= 7/1 \frac{\text{m}}{\text{s}} \end{aligned}$$


راه حل دوم:

۲۰ درصد انرژی جنبشی تلف می‌شود بنابراین ۸۰ درصد آن به نقطه B می‌رسد:

$$\begin{aligned} k_B = 0/8 k_A &\Rightarrow \frac{1}{2}mV_B^2 = 0/8 \times \frac{1}{2}mV_A^2 \\ \Rightarrow V_B^2 &= 0/8 \times 8^2 \Rightarrow V_B = 7/1 \frac{\text{m}}{\text{s}} \end{aligned}$$

گزینه ۴ - ۱۴۸


به علت وجود اصطکاک، انرژی مکانیکی جسم پایسته نیست و تغییر می‌کند.



$$\begin{aligned} W_{fk} &= E_f - E_i = (k_f + U_f) - (k_i + U_i) \\ \Rightarrow W_{fk} &= (k_f - k_i) + (U_f - U_i) = 0 + 0 - U_i = -U_i \\ \Rightarrow W_{fk} &= -mgh_i = -2 \times 20 \times 1 \Rightarrow W_{fk} = -20 \text{ J} \end{aligned}$$

گزینه ۱ - ۱۴۹

در اثر وجود اصطکاک، انرژی مکانیکی پایسته نیست.



$$\begin{aligned} W_{fk} &= E_f - E_i = (k_f + U_f) - (k_i + U_i) \\ \Rightarrow -f_k d &= \frac{1}{2}mV_f^2 + 0 - 0 - mgh_i \\ \Rightarrow -4 \times 10 &= \frac{1}{2} \times 2 \times V_f^2 - 2 \times 10 \times 6 \\ \Rightarrow V_f^2 &= 80 \Rightarrow V_f = \sqrt{80} = \sqrt{16 \times 5} \\ \Rightarrow V_f &= 4\sqrt{5} \frac{\text{m}}{\text{s}} \end{aligned}$$

کاری که کوهنورد انجام می‌دهد برای غلبه بر نیروی وزن‌اش است.

$$P_{\text{شخص}} = \frac{W_{\text{شخص}}}{t} = \frac{mgh}{t} = \frac{60 \times 10 \times 500}{20 \times 60}$$

$$\Rightarrow P_{\text{شخص}} = 250 \text{ W}$$

گزینه ۱. ۱۵۸

کاری که شخص انجام می‌دهد صرف غلبه بر نیروی وزن آن می‌شود:

$$P_{\text{شخص}} = \frac{W_{\text{شخص}}}{t} = \frac{mgh}{t} = \frac{75 \times 10 \times 5 \times 3}{20}$$

$$= 562.5 \text{ W} = 0.5625 \text{ kW}$$

گزینه ۳. ۱۵۹

چون **تندی ثابت** است پس نیرویی که آسانسور باید وارد کند برابر وزن آسانسور و مسافران داخل آن است.

$$\begin{cases} P = FV \cos \theta = mgV \cos 0 \\ V = \frac{h}{t} = \frac{80}{3 \times 60} = \frac{4}{9} \text{ m/s} \end{cases}$$

$$P = (80 \times 10 + 1000) \times \frac{4}{9} = 8000 \text{ W} \Rightarrow P = 8 \text{ kW}$$

گزینه ۱. ۱۶۰

چون تندی ثابت است، برای این کار باید نیرویی برابر با mg از طرف موتور بر جسم وارد شود و همچنین توان متوسط با توان لحظه‌ای و تندی متوسط با تندی لحظه‌ای یکی است:

$$\bar{P} = FV \cos \theta \Rightarrow P = mgV \cos 0 = 200 \times 10 \times 12 = 24000 \text{ W}$$

$$\Rightarrow P = 24 \text{ kW}$$

گزینه ۱. ۱۶۱

طبق قضیه‌ی کار-انرژی جنبشی، کار انجام شده توسط موتور هواپیما برابر با تغییر انرژی جنبشی آن است، بنابراین داریم:

$$W_t = \Delta k = K_f - K_i = \frac{1}{2} m V_f^2 - \frac{1}{2} m V_i^2$$

$$= \frac{1}{2} m (V_f^2 - V_i^2)$$

$$\Rightarrow W_t = \frac{1}{2} \times 8 \times 10^4 \times \left(\left(\frac{360}{3.6} \right)^2 - 0 \right) = 400 \times 10^6 \text{ J}$$

بنابراین توان متوسط موتور برای انجام این کار برابر است با:

$$\bar{P} = \frac{W_t}{\Delta t} = \frac{400 \times 10^6}{20} \Rightarrow \bar{P} = 20 \times 10^6 \text{ W}$$

$$\Rightarrow \bar{P} = 20 \text{ MW}$$

گزینه ۳. ۱۶۲

$$d = V \cdot t \Rightarrow V = \frac{d}{t} = \frac{8/22 \times 10^3}{60} = 137 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$\begin{cases} P = FV \cos \theta = FV \cos 0 = FV = 3/73 \times 10^5 \times 137 \\ \text{V} \leftarrow \text{F} \end{cases}$$

$$\Rightarrow P = 511/01 \times 10^5 \text{ W} \xrightarrow{\text{هر اسب بخار (hp)}} 746 \text{ W}$$

$$P = 68500 \text{ hp}$$

وقتی جسم به سمت پایین می‌لغزد، $0/2$ انرژی پتانسیل آن به گرما تبدیل می‌شود و $0/8$ آن در نقطه‌ی B وجود دارد:

$$\begin{cases} E_f = k_f + U_f = \frac{1}{2} m V_f^2 + 0 \Rightarrow E_f = \frac{1}{2} m V_f^2 \\ E_f = 0/8 U_i = 0/8 mgh_i \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} m V_f^2 = 0/8 mgh_i$$

$$V_f^2 = 2 \times 0/8 \times 10 \times 1 = 16$$

$$V_f = 4 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

گزینه ۳. ۱۵۳

زمین را به عنوان مبدأ پتانسیل در نظر می‌گیریم و به علت وجود اصطکاک انرژی مکانیکی **پایسته نمی‌ماند**:

$$(W_{fk})_{A \rightarrow C} = E_C - E_A \Rightarrow (W_{fk})_{A \rightarrow B} + (W_{fk})_{B \rightarrow C}$$

$$= (k_C + U_C) - (k_A + U_A)$$


$$\Rightarrow 0 - f_k \overline{BC} = (0 + 0) - (0 + mgh_A)$$

$$\Rightarrow -\mu_k mg \overline{BC} = -mg \overline{AB} \sin 30^\circ$$

$$\Rightarrow -2\mu_k \overline{AB} = -\frac{1}{2} \overline{AB} \Rightarrow \mu_k = \frac{1}{4}$$

گزینه ۳. ۱۵۴

حداکثر انرژی پتانسیل کشسانی فنر زمانی حاصل می‌شود که جسم در برخورد با فنر، آن را حداکثر متراکم کند یعنی تا نقطه‌ای که تندی آن صفر شده (C) و متوقف شود. با توجه به وجود اصطکاک انرژی مکانیکی گلوله **پایسته نمی‌ماند**.



$$E_A = k_A + U_A = 0 + mgh \Rightarrow E_A = mgh$$

$$E_C = k_C + U_C + (U_{\text{فنر}})_{\text{max}} = 0 + 0 + (U_{\text{فنر}})_{\text{max}}$$

$$W_{fk} = E_C - E_A$$

$$\Rightarrow -2 = (U_{\text{فنر}})_{\text{max}} - 200 \times 10^{-3} \times 10 \times 6$$

$$\Rightarrow (U_{\text{فنر}})_{\text{max}} = 10 \text{ J}$$

گزینه ۳. ۱۵۵

طبق رابطه‌ی $W = Fd$ ، **یک نیوتن. متر** معادل یک ژول است.

$$1 \frac{\text{N.m}}{\text{s}} \equiv 1 \frac{\text{J}}{\text{s}} = 1 \text{ W}$$

بنابراین داریم:

که وات واحد توان است.

گزینه ۲. ۱۵۶

کاری که پمپ انجام می‌دهد صرف غلبه بر نیروی وزن آب می‌شود:

$$P = \frac{W}{t} = \frac{mgh}{t} = \frac{1200 \times 10 \times 50}{60} \Rightarrow P = 10^4 \text{ W}$$

گزینه ۳. ۱۵۷

۱۶۳

گزینه ۴

$$P = FV \cos \theta \Rightarrow P = 4500 \times 2 \times \cos 0 = 9000 \text{ W}$$

$$\Rightarrow P = 9 \text{ kW}$$

۱۶۴

گزینه ۳

چون تندی ثابت است، توان متوسط همان توان لحظه‌ای و تندی متوسط و تندی لحظه‌ای برابر هستند.

$$\bar{P} = F \bar{V} \cos \theta \Rightarrow 10 \times 10^3 = 2500 \times V \times \cos 0$$

$$\Rightarrow V = \frac{10000}{2500} \Rightarrow V = 4 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

۱۶۵

گزینه ۳

چون تندی ثابت است (شتاب صفر)، نیروی مقاومت آب با نیروی موتور قایق یکی است.

$$P = FV \cos \theta \Rightarrow 2 / 4 \times 10^3 = F \times 10 \times \cos 0$$

$$\Rightarrow F = 240 \text{ N}$$

۱۶۶

گزینه ۱

چون اتومبیل با تندی ثابت (شتاب صفر) حرکت می‌کند، پس برآیند نیروهای وارد بر آن صفر است و در نتیجه نیروی موتور اتومبیل برابر نیروهای مقاوم در برابر حرکت اتومبیل است و داریم:

$$P = FV \cos \theta \Rightarrow 7 / 5 \times 10^3 = F \times \frac{54}{3.6}$$

$$\Rightarrow F = \frac{7500}{15} \Rightarrow F = 500 \text{ N}$$

۱۶۷

گزینه ۱

طبق قضیه کار-انرژی جنبشی، کار انجام شده توسط موتور خودرو برابر با تغییر انرژی جنبشی آن است، بنابراین داریم:

$$W_t = k_2 - k_1 = \frac{1}{2} m V_2^2 - \frac{1}{2} m V_1^2 = \frac{1}{2} m (V_2^2 - V_1^2) = \frac{1}{2} \times 1 / 4 \times 10^3 (24^2 - 14^2)$$

$$\Rightarrow W_t = 266000 \text{ J}$$

بنابراین حداقل (کم‌ترین) توان متوسط خودرو برای انجام این کار برابر است با:

$$\bar{P} = \frac{W}{t} = \frac{266000}{7} = 38000 \text{ W} \Rightarrow \bar{P} = 38 \text{ kW}$$

۱۶۸

گزینه ۲

چون نیروی مقاوم ناچیز است تنها نیروی موتور اتومبیل (F) کار انجام می‌دهد بنابراین طبق قضیه کار-انرژی داریم:

$$W_{\text{توان}} = \Delta k \Rightarrow W_F = \frac{1}{2} m V_2^2 - \frac{1}{2} m V_1^2 = \frac{1}{2} m (V_2^2 - V_1^2)$$

$$\Rightarrow W_F = \frac{1}{2} \times 900 \left[\left(\frac{72}{3.6} \right)^2 - 0 \right] \Rightarrow W_F = 18 \times 10^4 \text{ J}$$

$$P = \frac{W_F}{t} = \frac{18 \times 10^4}{10} \Rightarrow P = 18000 \text{ W} = 18 \text{ kW}$$

گزینه ۱ ۱۶۹


تغییرات انرژی جنبشی آب هنگام خروج از دهانه لوله پمپ آتش‌نشانی نتیجه کار پمپ است.

$$W_{\text{پمپ}} = \Delta k \text{ آب} = \frac{1}{2} m V^2 \Rightarrow W_{\text{پمپ}} = \frac{1}{2} \times 75 \times 20^2$$

$$\Rightarrow W_{\text{پمپ}} = 15000 \text{ J}$$

$$P_{\text{پمپ}} = \frac{W_{\text{پمپ}}}{t} = \frac{15000}{60} \Rightarrow P_{\text{پمپ}} = 250 \text{ W} = 0.25 \text{ kW}$$

گزینه ۳ ۱۷۰

$$\bar{P} = F \bar{V} \cos \theta \text{ و } \bar{V} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{10}{5} = 2 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$


$$\Rightarrow \bar{P} = 50 \times 2 \times \cos 60 \Rightarrow \bar{P} = 50 \text{ W}$$

گزینه ۱ ۱۷۱

۲۰ درصد انرژی صرف راندن اتومبیل می‌شود:

$$(100 - 65 - 15 = 20)$$

$$J = 6 \text{ lit} \times 3 / 5 \times 10^7 \frac{\text{J}}{\text{lit}} \times \frac{20}{100} = 4 / 2 \times 10^7 \text{ J}$$

$$t = \frac{100 \text{ km}}{90 \frac{\text{km}}{\text{h}}} = \frac{10}{9} \text{ h} = \frac{36000}{9} \text{ s} \Rightarrow t = 4000 \text{ s}$$

$$\left\{ \begin{aligned} P &= \frac{E}{t} = \frac{4 / 2 \times 10^7}{4000} = 10500 \text{ W} = \frac{10500}{746} \Rightarrow P \approx 14 \text{ hp} \\ &(\text{وات}) \quad 746 \text{ W} \text{ هر اسب بخار (hp)} \end{aligned} \right.$$

گزینه ۴ ۱۷۲

$$\text{بازده} = \frac{E_{\text{مفید}}}{E_{\text{تولیدی}}} = \frac{E_{\text{مفید}}}{E_{\text{انرژی خروجی (مفید)}}}$$

$$E_{\text{تولیدی}} = 24000 \text{ J} \Rightarrow E_{\text{مفید}} = P_{\text{تولیدی}} \times t = 400 \times 60 \Rightarrow E_{\text{مفید}} = 24000 \text{ J}$$

$$\Rightarrow \frac{75}{100} = \frac{E_{\text{مفید}}}{24000} \Rightarrow E_{\text{مفید}} = 18000 \text{ J}$$

$$E_{\text{گرمایی}} = E_{\text{تولیدی}} - E_{\text{مفید}} = 24000 - 18000$$

$$\Rightarrow E_{\text{گرمایی}} = 6000 \text{ J} \Rightarrow E_{\text{گرمایی}} = 6 \text{ kJ}$$

گزینه ۲ ۱۷۳

$$\text{بازده} = \frac{P_{\text{مفید}}}{P_{\text{کل}}} \Rightarrow 0.95 = \frac{P_{\text{مفید}}}{2 \times 10^3} \Rightarrow P_{\text{مفید}} = 1900 \text{ W}$$

کاری که تلمبه برقی انجام می‌دهد صرف غلبه بر کار نیروی وزن می‌شود.

$$W_{\text{mg}} = -mgh \Rightarrow W_{\text{تلمبه}} = mgh = m \times 10 \times 9 / 5$$

$$\Rightarrow W_{\text{تلمبه}} = 95 \text{ m}$$

$$P_{\text{کل}} = \frac{W_{\text{mg}}}{t} = \frac{900m}{1}$$

$$\Rightarrow P_{\text{کل}} = 900 \text{ m}$$

$$\text{بازده} = \frac{P_{\text{مفید}}}{P_{\text{کل}}} \Rightarrow \frac{85}{100} = \frac{200 \times 10^6}{900m}$$

$$\Rightarrow m = \frac{200 \times 10^6}{9 \times 85} = 261437/9 \text{ kg}$$

با توجه به این که جرم هر مترمکعب آب را برابر 10^3 در نظر گرفتیم بنابراین داریم:

$$m^3 = \frac{261437/9}{10^3} = 261/4 \text{ m}^3$$

$$P_{\text{مفید}} = \frac{W_{\text{تلمبه}}}{t} \Rightarrow 1900 = \frac{95m}{60} \Rightarrow m = 1200 \text{ kg}$$

$$\Rightarrow m = 1/2 \times 10^3 \text{ kg}$$

گزینه ۴

۱۷۴

$$\text{بازده} = \frac{P_{\text{خروجی}}}{P_{\text{کل}}} \Rightarrow P_{\text{خروجی}} = 0/8 \times 200 \Rightarrow P_{\text{خروجی}} = 160 \text{ W}$$

کاری که این ماشین انجام می‌دهد (خروجی) صرف غلبه بر کار

نیروی وزن در جابه‌جایی بار به سمت بالا می‌شود:

$$P_{\text{خروجی}} = \frac{W_{\text{خروجی}}}{t} = \frac{mgh}{t} \Rightarrow t = \frac{400 \times 10}{160} \Rightarrow t = 25 \text{ s}$$

گزینه ۱

۱۷۵

$$\text{بازده} = \frac{P_{\text{خروجی}}}{P_{\text{ورودی}}} = \frac{W_{\text{خروجی}}}{W_{\text{ورودی}}} = \frac{(W_{\text{ورودی}})_A = (W_{\text{ورودی}})_B}{(A \text{ بازدهی}) > (B \text{ بازدهی})}$$


$$\Rightarrow (W_{\text{خروجی}})_A > (W_{\text{خروجی}})_B$$

از طرفی چون توان مولد A کم‌تر از مولد B است، مولد A برای انجام یک کار مشخص، زمان بیش‌تری باید صرف کند.

گزینه ۳

۱۷۶

چون جسم در شرایط خلأ سقوط کرده است بنابراین از مقاومت هوا صرف‌نظر شده و انرژی مکانیکی در طول مسیر پایسته است.



$$E_1 = E_2 \Rightarrow k_1 + U_1 = k_2 + U_2 \Rightarrow 0 + mgh = \frac{1}{2} m V_2^2 + 0$$

$$h = \frac{V_2^2}{2g} = \frac{(4\sqrt{5})^2}{2 \times 10} \Rightarrow h = 4 \text{ m}$$

کاری که ماشین در بالا بردن جسم انجام می‌دهد (W') صرف غلبه بر کار نیروی وزن می‌شود:

$$W' = mgh = 2 \times 10 \times 4 \Rightarrow W' = 80 \text{ J}$$

از طرفی کل انرژی ماشین در انجام این کار ۱۰۰ J بوده است

$$\text{بنابراین داریم:} \quad \text{بازده} = \frac{W'}{W} = \frac{80}{100} = 0/8$$

گزینه ۱

۱۷۷

$$W_{\text{mg}} = mgh = m \times 10 \times 90$$

$$\Rightarrow W_{\text{mg}} = 900 \text{ m}$$