

فصل اول

معادله درجه دوم

(۱۷ پیمانه)



درخت دانش

زرد سبز آبی

معادله و مسائل توصیفی

۱

معادله درجه اول

مسائل توصیفی

۱ پیمانه

۲۰ تست

با درخت دانش، گام به گام
پیشرفت خود را ارزیابی کنید.

گام اول: میزان تسلط خود را با رنگ مشخص کنید.

آبی: مسلط.

سبز: نسبتاً مسلط.

زرد: مسلط نیستم.

گام‌های بعدی: اگر در گام اول دانش خود را در حد رنگ زرد ارزیابی کردید، اما در نوبت‌های بعدی پیشرفت کردیده، می‌توانید خانه‌های سبز یا آبی را رنگ کنید. هرگاه به رنگها نگاه کنید متوجه می‌شوید در کدام قسمت‌ها نیاز به تمرین بیشتر دارید.

زرد سبز آبی

حل معادله درجه دوم و کاربردها

۲

حل معادله به روش تجزیه و ریشه‌گیری

۱

حل معادله به روش مربع کامل

۲

روش کلی حل معادله درجه دوم (روش دلتا)

۳

تعیین تعداد جواب‌های معادله با Δ

۴

روش تغییر متغیر در حل معادله

۵

مجموع، حاصلضرب و اختلاف ریشه‌های معادله

۶

روابط بین ضرایب و ریشه‌های معادله

۷

تشکیل معادله درجه دوم با S و P

۸

کاربرد معادله درجه دوم در مسائل توصیفی

۹

معادله درجه دوم

۱۷۰ سؤال شناسنامه‌دار

۸۰ سؤال تأییفی و طراحی شده
از کتاب درسی

۵۳ سؤال از آزمون‌های کانون

۳۷ سؤال از کنکورهای سراسری

در درسنامه می‌بینید

۳۹ سوال

۱۸ تست طراحی شده با نگاه
به رویکرد کنکورهای جدید

۲۱ مثال برای ادراک و تثیت

زرد سبز آبی

معادله‌های شامل عبارت‌های گویا

۳

روش‌های حل معادلات گویا

۱

کاربرد معادلات گویا در مسائل توصیفی

۲

۵






پیمانه

۵۰ تست

پیش‌نیازها

برای حل تست‌های این فصل نیاز دارید که «محیط و مساحت اشکال هندسی»، «اتحادهای جبری»، «ک.م.م عبارت‌های جبری» و «اعمال و ساده سازی رادیکال‌ها» را بلد باشید، بنابراین قبل از شروع به درس، از سال‌های گذشته این موضوعات را یادآوری می‌کنیم.

۱ محیط و مساحت شکل‌های هندسی: در جدول زیر، محیط و مساحت اشکال هندسی که برای حل تست‌ها نیاز دارید، یادآوری شده است.

مربع به ضلع a	مستطیل به اضلاع a و b	دایره به شعاع r	مثلث با ارتفاع h و قاعده a
			
محیط = $4a$ مساحت = a^2	محیط = $2(a+b)$ مساحت = ab	محیط = $2\pi r$ مساحت = πr^2	مجموع سه ضلع = محیط مساحت = $\frac{1}{2}a \times h$
مثلث قائم‌الزاویه با اضلاع قائم a و b	متوازی‌الاضلاع با قاعده a و ارتفاع h	ذوزنقه با قاعده‌های a و b و ارتفاع h	
			
مساحت = $\frac{1}{2}a \times b$	مساحت = $a \times h$	مساحت = $\frac{1}{2}(a+b) \times h$	

۲ اتحادهای جبری: اگر دو عبارت جبری به گونه‌ای باشند که به ازای هر مقدار برای متغیرهایشان، حاصل یکسانی بدeneند، عبارت حاصل از تساوی بین آنها را اتحاد می‌نامیم. در جدول زیر اتحادهایی که برای حل تست‌ها نیاز دارید، یادآوری شده است.

نام اتحاد	فرمول	مثال
۱ مربع دو جمله‌ای	(۱) $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ (۲) $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$	$(2x+3)^2 = (2x)^2 + 2(2x)(3) + 3^2 = 4x^2 + 12x + 9$ $(x^2 - x)^2 = (x^2)^2 - 2(x^2)(x) + x^2 = x^4 - 2x^3 + x^2$
۲ مزدوج	$a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$	$16x^2 - 81 = (4x)^2 - 9^2 = (4x-9)(4x+9)$
۳ یک جمله مشترک	$(x+a)(x+b) = x^2 + (a+b)x + ab$	$(5y-1)(5y+3) = (5y)^2 + (3-1)(5y) + 3 \times (-1)$ $= 25y^2 + 10y - 3$

۳ ک.م.م عبارت‌های جبری: کوچکترین مضرب مشترک دو عدد A و B (یا عبارت A و B) اولین مضرب مشترک دو عدد A و B (یا عبارت A و B) است که به اختصار آن را با ک.م.م یا [A, B] نمایش می‌دهیم. برای یافتن آن از تعريف زیر استفاده می‌کنیم:

حاصل ضرب عوامل مشترک با توان بیشتر در عوامل غیرمشترک = ک.م.م A و B

برای محاسبه ک.م.م دو عبارت ابتدا هر یک از عبارتها را به حاصل ضرب عوامل اول تجزیه کرده و سپس ک.م.م را می‌یابیم.

ک.م.م دو عدد ۲۴ و ۵۰ به صورت رو به رو محاسبه می‌شود:

ک.م.م برای دو عبارت جبری $x-3$ و $x+4$ $B = (x-3)(x+4)$ $A = x^2 - 9$ به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$A = x^2 - 9 = (x-3)(x+3), \quad B = (x-3)^2(x+4) \Rightarrow (x-3)^2 \times (x+3) \times (x+4)$$

۴ اعمال و ساده سازی رادیکال‌ها: برای ساده سازی عبارت‌هایی مانند $\sqrt{24}$ یا $\sqrt[3]{54}$ از خواص ضرب دو رادیکال و تجزیه عدد به عامل‌های اول استفاده می‌کنیم:

$$(۱) \sqrt{24} = \sqrt{4 \times 6} = \sqrt{4} \times \sqrt{6} = 2\sqrt{6} \quad (۲) \sqrt[3]{54} = \sqrt[3]{27 \times 2} = \sqrt[3]{27} \times \sqrt[3]{2} = 3\sqrt[3]{2}$$

توجه کنید که برای هر عدد مثبت a داریم: $\sqrt{a^2} = a$. مثلاً $\sqrt{4^2} = 4$. همچنین برای هر عدد حقیقی a داریم: $\sqrt[3]{a^3} = a$.

اگر قسمت رادیکالی دو عبارت پس از ساده کردن کاملاً یکسان باشد، می‌توانیم آن‌ها را با هم جمع یا تفریق کنیم. به عنوان مثال:

$$\sqrt{27} - \sqrt{12} + \sqrt{75} - \sqrt{48} = \sqrt{3^3} - \sqrt{2^2 \times 3} + \sqrt{5^2 \times 3} - \sqrt{4^2 \times 3} = 3\sqrt{3} - 2\sqrt{3} + 5\sqrt{3} - 4\sqrt{3} = 2\sqrt{3}$$

به توان دوم یک عدد مثبت، مجذور عدد و به رادیکال آن، جذر عدد می‌گوییم. در جدول زیر توان دوم و جذر برخی اعداد مربع کامل که در تست‌ها کاربرد دارد را آورده‌ایم.

توان دوم	$11^2 = 121$	$12^2 = 144$	$13^2 = 169$	$14^2 = 196$	$15^2 = 225$	$16^2 = 256$	$17^2 = 289$	$18^2 = 324$	$19^2 = 361$
جذر	$\sqrt{121} = 11$	$\sqrt{144} = 12$	$\sqrt{169} = 13$	$\sqrt{196} = 14$	$\sqrt{225} = 15$	$\sqrt{256} = 16$	$\sqrt{289} = 17$	$\sqrt{324} = 18$	$\sqrt{361} = 19$



۱ معادله و مسائل توصیفی

ریاضی و آمار (۱) – پایه دهم – فصل اول – صفحه‌های ۱۰ تا ۱۷

یک تساوی جبری، شامل یک مجهول، که به ازای یک یا چند عدد مشخص برقرار باشد را یک معادله می‌نامیم. این عدد را جواب معادله یا ریشه معادله می‌نامیم. منظور از حل یک معادله، یافتن مقدار یا مقدارهایی است که به ازای آن تساوی برقرار باشد.

به عنوان مثال، تساوی $5x + 1 = 16$ یک معادله است، که به ازای $x = 3$ را ریشه معادله یا جواب معادله می‌نامیم.

۱ معادله درجه اول

فرض کنید می‌خواهیم معادله $4x - 1 = 0$ را حل کنیم. این معادله یک معادله درجه اول است، زیرا توان متغیر آن یعنی x ، یک است. برای حل این معادله، به ترتیب زیر عمل می‌کنیم:

$$4x - 1 = 0 \rightarrow 4x = 1 \rightarrow x = \frac{1}{4}$$

طبقه‌بندی: طرفین معادله را بر ضریب متغیر، یعنی ۴ عدد ۱ را به سمت راست برد
و علامتش را عوض می‌کنیم.
 تقسیم می‌کنیم.

۱ معادله درجه اول

هر معادله‌ای را که پس از ساده‌سازی، به شکل $ax + b = 0$ تبدیل شود، معادله درجه اول می‌نامیم. در این معادله، a و b اعداد حقیقی و a مخالف صفر و تنها جواب (ریشه) آن برابر $x = -\frac{b}{a}$ است.

در حالت کلی مراحل زیر را برای حل معادله به ترتیب انجام می‌دهیم:

- ۱ ابتدا پرانتزها را (در صورت وجود) با عملیات ضرب از بین می‌بریم.
- ۲ در صورت وجود عدد در مخرج‌ها، طرفین را در مخرج مشترک آنها (ک.م.م مخرج‌ها) ضرب می‌کنیم.
- ۳ جملات شامل مجهول را در یک سمت تساوی و جملات معلوم (اعداد) را به سمت دیگر تساوی منتقل می‌کنیم. (توجه کنید در انتقال به سمت دیگر، علامت عبارت عوض می‌شود). پس از ساده‌سازی، با تقسیم طرفین معادله بر ضریب مجهول، جواب معادله را می‌یابیم.

مثال: معادلات زیر را حل کنید.

$$(a) 3x - 5 = 7x + \frac{1}{2}$$

$$(b) 8(2y - 4) - 6(\frac{1}{2}y + 1) = 14$$

$$(c) \frac{4t + 3}{5} = 2 - \frac{t}{3}$$

$$(a) 3x - 5 = 7x + \frac{1}{2} \rightarrow 3x - 7x = \frac{1}{2} + 5 \Rightarrow -4x = \frac{11}{2} \div (-4) \rightarrow x = -\frac{11}{8}$$

$$(b) 8(2y - 4) - 6(\frac{1}{2}y + 1) = 14 \rightarrow (16y - 32) - (3y + 6) = 14 \rightarrow 13y - 38 = 14 \rightarrow 13y = 38 + 14 \rightarrow 13y = 52 \div 13 \rightarrow y = \frac{52}{13} = 4$$

$$(c) \frac{4t + 3}{5} = 2 - \frac{t}{3} \rightarrow 3(4t + 3) = 2 \times 15 - 5t \Rightarrow 12t + 9 = 30 - 5t \Rightarrow 12t + 5t = 30 - 9 \Rightarrow 17t = 21 \Rightarrow t = \frac{21}{17}$$

حل:

تذکر ۱۱ ریشه هر معادله‌ای در خود آن معادله صدق می‌کند. این موضوع در تست‌هایی که معادله دارای پارامتر مجهول (\dots, m, n, k) است، راهگشاست. همچنین اگر دو معادله دارای ریشه مشترک باشند، این ریشه در هر دو معادله صدق می‌کند.

$$(۱) \text{ تست} \quad \text{اگر } x = 1 \text{ ریشه معادله } \frac{x}{2k+1} - \frac{k+3}{2} = 3 \text{ باشد، آنگاه جواب معادله } \frac{2x+k}{3} - 3x = \frac{x-5}{2} \text{ کدام است؟}$$

۱۲ (۴)

۱۵ (۳)

۱۱ (۲)

۱۰ (۱)

پاسخ **گزینه «۳»**: می‌دانیم ریشه معادله در خود معادله صدق می‌کند، پس می‌توانیم در معادله، به جای x ها، عدد ۱ را قرار دهیم:

$$\frac{2x+k}{3} - 3x = \frac{x-5}{2} \rightarrow \frac{x-5}{2} = \frac{2+k}{3} - 3 \Rightarrow \frac{1-5}{2} = \frac{2+k}{3} - 3 \Rightarrow \frac{-4}{2} = \frac{2+k}{3} - 3 \Rightarrow \frac{2+k}{3} = -2 + 3 \Rightarrow \frac{2+k}{3} = 1 \Rightarrow 2+k = 3 \Rightarrow k = 1$$

حال $k = 1$ را در معادله دوم قرار داده و ریشه آن را می‌یابیم:

$$\frac{x}{2k+1} - \frac{k+3}{2} = 3 \rightarrow \frac{x}{2+1} - \frac{1+3}{2} = 3 \Rightarrow \frac{x}{3} - 2 = 3 \Rightarrow \frac{x}{3} = 5 \Rightarrow x = 15$$

۲ مسائل توصیفی


در این بخش، با روش‌های تشکیل معادله آشنا می‌شویم. در واقع به دنبال تبدیل یک مسئله، از زبان فارسی (کلامی) به زبان ریاضی و یافتن مجهول (خواسته مسئله) خواهیم بود. در زیر، روش کلی را برای اینکه دچار اشتباه نشویم، ارائه می‌کنیم. در تبدیل کلامی (زبان فارسی) به زبان ریاضی، مراحل زیر را به ترتیب انجام می‌دهیم:

۱ مجهول عبارت را x فرض می‌کنیم.

۲ در تبدیل کلامی به ریاضی، جدول زیر راهگشاست.

کلامی (زبان فارسی)	a	k	a واحد کمتر از k	k واحد بیشتر از a	a برابر عدد k
زبان ریاضی	$a + k$		$a - k$	$b - a$	$k \times a$

در نوشتن جمله ریاضی، از آخر جمله، به اول جمله پیش می‌رویم. همواره ضرب، مقدم به جمع و تفاضل است.



حال که روش تبدیل یک جمله از زبان کلامی به ریاضی را یاد گرفتیم، برای حل مسئله کافی است **مجهول مسئله را x** فرض کرده و هر یک از داده‌های کلامی یا عددی را بر حسب x نوشتیم، معادله را تشکیل داده و حل کنیم.

(تست) ۵۲ واحد بیشتر از قرینه سه برابر عددی، مساوی ربع آن عدد است. مجموع ارقام این عدد کدام است؟

- ۷ (۴) ۸ (۳) ۶ (۲) ۹ (۱)

پاسخ گزینه ۴ اگر عدد را x فرض کنیم، سه برابر آن $3x$ و قرینه سه برابر یعنی $-3x$ ، بنابراین «۵۲ واحد بیشتر از قرینه سه برابر عدد» یعنی $+52 - (-3x) = 52 + 3x$ است، بنابراین: $52 + 3x = 4 \times 16 \Rightarrow 3x = 4 \times 16 - 52 = 4 \times 7 = 28 \Rightarrow x = 28 / 3 = 9 \frac{1}{3}$ ربع عدد برابر $\frac{x}{4}$ است، بنابراین:

ذکر ۴۴ در مواردی که **دو مجهول** در مسئله داریم، یکی را x و دیگری را y فرض کرده و از **حل دستگاه** دو معادله دو مجهولی یا با نوشتن یکی بر حسب دیگری، مسئله را حل می‌کنیم.

(تست) نیما از خواهرش ۱۰ سال بزرگتر است. ۱۰ سال بعد، سن نیما از دو برابر سن خواهرش، ۸ سال کمتر است. در حال حاضر سن نیما چند سال است؟
(آزمون کانون - ۲۲ مهر - ۱۴۰۱)

- ۱۸ (۴) ۱۷ (۳) ۱۴ (۲) ۱۲ (۱)

پاسخ گزینه ۴ فرض کنیم سن نیما x و سن خواهرش y باشد، بنابراین: ۱۰ سال بعد، سن نیما $x + 10$ و سن خواهرش $y + 10$ است. بنابراین طبق فرض مسئله داریم:

$$x + 10 = 2(y + 10) - 8 \Rightarrow x + 10 = 2y + 12 \Rightarrow x - 2y = 2 \quad (\text{II})$$

دو معادله (I) و (II) تشکیل یک دستگاه دو معادله دو مجهولی داده و با حل آن، x و y را می‌یابیم:

$$\begin{cases} x - y = 10 \\ x - 2y = 2 \end{cases} \xrightarrow{\times(-1)} \begin{cases} x - y = 10 \\ -x + 2y = -2 \end{cases} \xrightarrow{\oplus} y = 8 \xrightarrow{x-y=10} x = 8 + 10 = 18$$

۲۱	۲۰	۲۱
پیمانه‌های ۲۱	پیمانه ۲۰	پرسش‌های چهارگزینه‌ای ۲۱



۱

صفحه‌های ۱۰ تا ۱۷ ریاضی و آمار (۱)

معادله درجه اول

۱. جواب معادله $(-\frac{X}{5} + 7) = 3(\frac{X}{5} + 3)$ کدام است؟

$$-\frac{165}{17} \quad -\frac{165}{23} \quad -\frac{45}{23} \quad -\frac{45}{17}$$

۲. جواب معادله $6 - \frac{5}{2}x = \frac{5}{2}x - 6$ از جواب معادله $5(0 + 0) + 0 / 3x = 5(0 + 0) + 0 / 25$ چند واحد کمتر است؟

$$4 (۴) \quad 3 (۳) \quad 2 (۲) \quad 1 (۱)$$

۳. جواب معادله $12x - 12x^2 = 9(x+1)^2 + 16 - 12x$ کدام است؟

$$-\frac{1}{2} (۴) \quad -2 (۳) \quad -3 (۲) \quad -\frac{3}{2} (۱)$$

۴. اگر $x = 2$ ریشه معادله $\frac{kx-1}{3} - \frac{3x+2k}{2} = \frac{x-18}{4}$ باشد، آنگاه k کدام است؟

$$4 (۴) \quad -2 (۳) \quad 8 (۲) \quad 2 (۱)$$

۵. اگر دو معادله $\frac{k+x}{3} = -k - 2x + 5$ و $8x + 3 = 5x + 12$ دارای جواب یکسان باشند، k کدام است؟

$$3 (۴) \quad \frac{3}{2} (۳) \quad -\frac{3}{2} (۲) \quad -3 (۱)$$

۶. تفاضل عددی از ۱۵، برابر یک چهارم مجموع همان عدد با ۲۵ است، آن عدد کدام است؟

۷. مرتبط با صفحه ۱۴-۱-تمرين-الف (آزمون کانون - ۲۹ خرداد - ۱۴۰۰)

صفحه‌های ۱۰ تا ۱۷ ریاضی و آمار (۱)


مسائل توصیفی

۲

۸. مرتبط با صفحه ۱۴-۱-تمرين-الف (آزمون کانون - ۲۲ مهر - ۱۴۰۱)

- ۹ (۴) ۹ (۳) ۱۰ (۲) ۱۹ (۱)



- .۷ سه برابر نصف قرینه عددی، بعلاوه ۱۸، مساوی ۷ برابر آن عدد، منهای ۱۶ است، آن عدد کدام است؟
 (مرتبه با صفحه ۱۴- مشابه تمرین ۱- الف) (آزمون کانون- ۲۳ مهر ۱۴۰۰)
 -۴ (۴) ۴ (۳) -۵ / ۴ (۲) ۵ / ۴ (۱)
- .۸ مجموع چهار عدد متولی مضرب ۶، برابر ۲۵۲ است، باقی مانده تقسیم کوچکترین آنها بر ۵ کدام است؟
 (مرتبه با صفحه ۱۴- تمرین ۱- الف) (آزمون کانون- ۲۳ مهر ۱۴۰۰)
 ۴ (۴) ۲ (۳) ۱ (۲) ۱ صفر
- .۹ طول مستطیلی از سه برابر عرض آن، چهار واحد کمتر است. اگر محیط مستطیل ۴۰ واحد باشد، در این صورت مساحت آن کدام است؟
 (مرتبه با صفحه ۱۵- تمرین ۱- تمرین ۴) (آزمون کانون- ۲۳ مهر ۱۴۰۰)
 ۳۱۹ (۴) ۱۵۲ (۳) ۱۰۸ (۲) ۸۴ (۱)
- .۱۰ طول ضلع دوم مثلثی از دو برابر ضلع اول، ۳ متر کمتر و ضلع دوم از نصف ضلع سوم، $\frac{1}{5}$ متر بیشتر است. اگر محیط مثلث ۲۳ متر باشد، ضلع کوچکتر چند متر است؟
 (مرتبه با صفحه ۱۵- تمرین ۴) (آزمون کانون- ۳ تیر ۱۴۰۱)
 ۵ / ۵ (۴) ۵ (۳) ۴ / ۵ (۲) ۴ (۱)
- .۱۱ مساحت مثلث و مستطیل شکل زیر، با هم برابرند. محیط مستطیل کدام است?
 (مرتبه با صفحه ۱۲- تمرین ۴) (آزمون کانون- ۷ دی ۱۴۰۱)
 ۱۴ (۱) ۱۸ (۲) ۲۰ (۳) ۲۲ (۴)
- .۱۲ در ذوزنقه شکل زیر، اگر مساحت مثلث، $\frac{1}{4}$ مساحت مربع باشد، در این صورت x کدام است؟
 (مرتبه با صفحه ۱۲- تمرین ۴) (آزمون کانون- ۲۲ مهر ۱۴۰۱)

 ۶ (۲) ۱۰ (۴) ۴ (۱) ۸ (۳)
- .۱۳ از تعداد کتاب‌هایی که احمد در کتابخانه اش داشت، نیمی را به رضا و ثلث بقیه‌اش را به حسین و ربع باقی‌مانده را به نیما داده و برای خودش، ۱۲ کتاب باقی‌مانده است. به حسین چند کتاب داده است؟
 (مشابه صفحه ۱۱- کار در کلاس)
 ۹ (۴) ۶ (۳) ۸ (۲) ۷ (۱)
- .۱۴ احمد با خود قرار گذاشته از روز شنبه هر روز پس انداز خود را دو برابر کند. در پایان روز پنج‌شنبه، پس انداز احمد ۴۸۰ هزار تومان است. اختلاف پس انداز احمد در پایان روزهای سه‌شنبه و یکشنبه چند هزار تومان است؟
 (صفحة ۱۴- مکمل تمرین ۳)
 ۸۰ (۴) ۱۲۰ (۳) ۱۸۰ (۲) ۹۰ (۱)
- .۱۵ یک کارگاه تولیدی در یک هفته از روز شنبه، هر روز تولید خود را طوری افزایش می‌دهد که از دو برابر روز قبل، ۲۰ واحد کالا کمتر تولید کند. اگر کل تولید از شنبه تا چهارشنبه ۱۳۴۰ واحد کالا باشد، تولید روز دوشنبه چند واحد است؟
 (صفحة ۱۴- مکمل تمرین ۳) (آزمون کانون- ۲۳ مهر ۱۴۰۰)
 ۲۸۰ (۴) ۲۴۰ (۳) ۱۸۰ (۲) ۱۲۰ (۱)
- .۱۶ در یک کارخانه، حقوق مهندس خط تولید سه برابر کارگر فنی و $\frac{3}{5}$ حقوق مدیر خط تولید است. بخش تولید این کارخانه، ۴ مدیر خط تولید، ۶ مهندس خط تولید و ۱۸ کارگر فنی دارد. مدیر عامل این کارخانه برای بخش تولید حقوق ۵۶۰ میلیون تومانی در ماه پرداخت می‌کند، اختلاف حقوق مدیر بخش تولید و مهندس خط تولید چند میلیون تومان است؟
 (منطبق بر کتاب درسی - صفحه ۱۴- تمرین ۲)
 ۱۲ (۴) ۲۰ (۳) ۱۵ (۲) ۱۰ (۱)
- .۱۷ ۵ سال دیگر، مجموع سن حمید و سعید برابر ۳۰ سال خواهد شد. اگر سال گذشته سن حمید دو برابر سن سعید بوده باشد، سن فعلی سعید چند سال است؟
 (صفحة ۱۴- مکمل کار در کلاس) (آزمون کانون- ۷ بهمن ۱۴۰۱)
 ۸ (۴) ۷ (۳) ۶ (۲) ۱۳ (۱)
- .۱۸ در یک خانواده ۳ فرزندی، سن فرزند بزرگتر، سه برابر سن فرزند کوچکتر و $\frac{1}{5}$ برابر سن فرزند وسطی است. ۸ سال قبل، سن فرزند وسطی، چهار برابر سن فرزند کوچکتر بود، در حال حاضر مجموع سن فرزندان این خانواده چند سال است؟
 (صفحة ۱۴- مکمل تمرین ۳)
 ۷۲ (۴) ۷۸ (۳) ۸۴ (۲) ۶۸ (۱)
- .۱۹ یک دبیرستان شامل سه رشته ریاضی، تجربی و انسانی است. تعداد دانش آموزان انسانی از دو برابر تعداد دانش آموزان ریاضی، ۳ نفر کمتر و تعداد دانش آموزان انسانی از ثلث تعداد دانش آموزان تجربی، ۳۶ نفر بیشتر است. اگر این دبیرستان ۱۹۵ دانش آموز داشته باشد، تعداد دانش آموزان تجربی چند نفر از دانش آموزان ریاضی بیشتر است؟
 (صفحة ۱۴- مکمل تمرین ۲) (آزمون کانون- ۷ بهمن ۱۴۰۱)
 ۶۷ (۴) ۵۸ (۳) ۴۷ (۲) ۳۵ (۱)
- .۲۰ حروف الفبای فارسی از (الف) تا (ی) را به ترتیب با شماره‌های ۱، ۲، ... و ۳۲ شماره‌گذاری کرده‌ایم. هر حرف بدون نقطه با شماره آن حرف و حروف نقطه‌دار به صورت ax^n مشخص شده‌اند که در آن، a شماره حرف الفبا و n تعداد نقاط حرف مورد نظر است. در این صورت معادل کلمه «شیوا» کدام است؟
 (صفحة ۱۶- مکمل تمرین ۵) (آزمون کانون- ۲۱ مهر ۱۴۰۲)
 $16x^3 + 32x^2 + 30 + 1$ (۴) $16x^3 + 32x^2 + 29 + 1$ (۳) $15x^3 + 32x^2 + 29 + 1$ (۲) $15x^3 + 32x + 30 + 1$ (۱)

حل معادله درجه دوم و کاربردها

۲

ریاضی و آمار (۱) - پایه دهم - فصل اول - صفحه‌های ۱۹ تا ۳۲

$$x^2 + (x+1)^2 = (x+2)^2$$

$$x^2 + (x^2 + 2x + 1) = x^2 + 4x + 4$$

$$x^2 - 2x - 3 = 0$$

این معادله که بزرگترین درجه متغیر آن پس از ساده‌سازی ۲ است را یک معادله درجه دوم می‌نامیم. جواب‌های این معادله اعدادی هستند که به ازای آن تساوی برقرار باشد. در این بخش به روش‌های حل این گونه معادلات می‌پردازیم.

در بخش قبل با معادله درجه اول آشنا شدیم. حال به معادله روبه‌رو توجه کنید:

برای حل این معادله ابتدا با استفاده از اتحاد مربع دوجمله‌ای خواهیم داشت:

با ساده‌سازی و انتقال به سمت چپ همه عبارت‌ها، به معادله روبه‌رو می‌رسیم:

این معادله که بزرگترین درجه متغیر آن پس از ساده‌سازی ۲ است را یک معادله درجه دوم می‌نامیم. جواب‌های این معادله اعدادی هستند که به ازای آن تساوی برقرار باشد. در این بخش به روش‌های حل این گونه معادلات می‌پردازیم.

معادله درجه دو

هر معادله که پس از ساده‌سازی، به شکل $ax^2 + bx + c = 0$ تبدیل شود، را معادله درجه دوم می‌نامیم. در این معادله a ، b و c اعداد حقیقی و البته a مخالف صفر است. بدعبارت دیگر، هر معادله که پس از ساده‌سازی بزرگترین درجه مجهولش (متغیر آن) ۲ باشد، یک معادله درجه دوم نامیده می‌شود.

الف- در معادله درجه دوم، a ضریب عبارت درجه دوم، b ضریب عبارت درجه اول و c عدد ثابت معادله نامیده می‌شود.

ب- با توجه به ضرایب معادله، معادله درجه دوم می‌تواند دارای دو ریشه حقیقی یا دارای یک ریشه مضاعف (دو ریشه برابر) باشد یا اصلاً ریشه حقیقی نداشته باشد.

به عنوان مثال $3x^2 - 5x - 4 = 0$ یک معادله درجه دوم است که در آن $a = 3$ ، $b = -5$ و $c = -4$ است.

همچنین $5x^2 - 3x - 5 = 0$ یک معادله درجه دوم است که در آن $a = 5$ ، $b = -3$ و $c = 0$ است.

توجه کنید که معادله $-5 - 4x^2 - 3x = 0$ درجه دوم نیست زیرا بزرگترین درجه متغیر آن، دو نیست.

مثال ۱: همواره ریشه معادله در خود معادله صدق می‌کند. یعنی اگر $x = k$ یک ریشه معادله باشد، می‌توانیم به جای تمام x ‌ها در معادله، k بگذاریم.

مثال ۲: یکی از جواب‌های معادله درجه دوم $= 0 + 13x + c = 0 + 5x^2 - 3$ برابر -3 است، c را ببایید.

حل: ریشه معادله در خود معادله صدق می‌کند، بنابراین به جای تمام x ‌ها در معادله، -3 قرار می‌دهیم:

$$5x^2 + 13x + c = 0 \xrightarrow{x=-3} 5(-3)^2 + 13(-3) + c = 0 \Rightarrow 5 \times 9 - 39 + c = 0 \Rightarrow 45 - 39 + c = 0 \Rightarrow 6 + c = 0 \Rightarrow c = -6$$

حل معادله به روش تجزیه و ریشه‌گیری

۱

روش تجزیه ▶ ابتدا به خاصیت زیر که به «خاصیت حاصل ضرب صفر» معروف است، توجه کنید:

اگر A و B دو عبارت جبری باشند به طوری که حاصل ضرب آنها صفر باشد، آنگاه حداقل یکی از آنها برابر صفر است، یعنی:

$$AB = 0 \Rightarrow A = 0 \quad \text{یا} \quad B = 0$$

به عنوان مثال، در معادله $(2x-3)(x-1) = 0$ ، باید تک تک پرانتزها را برابر صفر قرار دهیم: $x = 1$ یا $2x - 3 = 0 \Rightarrow x = \frac{3}{2}$ یا $2x - 3 = 0 \Rightarrow x = 1.5$

مثال ۱: اگر دو ریشه معادله مانند α و β در اختیار باشند، برای نوشتن معادله درجه دوم از رابطه زیر استفاده می‌کنیم:

$$ax^2 + bx + c = 0 \xrightarrow{\text{و ریشه‌های معادله‌اند.}} a(x-\alpha)(x-\beta) = 0$$

به عنوان مثال، اگر ریشه‌های معادله درجه دوم 4 و 6 باشند، آنگاه صورت کلی آن را می‌توانیم به صورت $0 = a(x-4)(x-6)$ بنویسیم.

مثال ۲: در یک معادله می‌توانیم طرفین را در عددی ضرب کنیم یا از عددی فاکتور بگیریم، این موضوع تغییری در جواب‌ها به وجود نمی‌آورد.

$$-\frac{1}{2}x^2 + 3x - 5 = 0 \xrightarrow{x=(-2)} x^2 - 6x + 10 = 0 \quad \text{مثال: } 3x^2 + 3x - 9 = 0 \xrightarrow{3(x^2+x-3)=0} x^2 + x - 3 = 0$$

مسئله ۱: اگر 2 و -3 - ریشه‌های معادله درجه دوم $0 = ax^2 + bx + c = 0$ باشند و a کوچکترین عدد اول باشد، آنگاه $b - c$ کدام است؟

۱۴ (۴) ۷ (۳) ۲ (۲) ۱ (۱)

پاسخ گزینه ۴: 2 و -3 - ریشه‌های معادله هستند، بنابراین سمت چپ معادله را می‌توانیم به شکل زیر بنویسیم:

$$ax^2 + bx + c = a(x-2)(x+3) = a(x^2 + 3x - 2x - 6) = a(x^2 + x - 6) = 2x^2 + 2x - 12 = 0$$

با مقایسه ضرایب معادله، $b = 2$ و $c = -12$ به دست می‌آید.

مسئله ۲: می‌دانیم تجزیه یک عبارت به این معنی است که آن را به حاصل ضرب حداقل دو عامل تبدیل کنیم. این موضوع در حل معادله درجه دوم کاربرد زیادی دارد. مهم‌ترین تجزیه عبارت‌هایی که در حل معادله درجه دوم کاربرد دارند استفاده از **فاکتورگیری** و **اتحادها** است.

$$ax^2 + bx = 0 \Rightarrow x(ax+b) = 0$$

$$a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$$

ضرب دو عدد

$$x^2 + \underbrace{(a+b)}_{\text{جمع دو عدد}} x + \underbrace{ab}_{\text{کوچکترین عدد اول}} = (x+a)(x+b)$$

$$a^2 \pm 2ab + b^2 = (a \pm b)^2$$

● همانچنان: هر یک از معادلات درجه دوم زیر را با روش مناسب حل کنید.

$$(a) 3x^2 - 5x = 0 \quad \xrightarrow{\text{فاکتورگیری}} x(3x - 5) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ 3x - 5 = 0 \Rightarrow 3x = 5 \Rightarrow x = \frac{5}{3} \end{cases}$$

$$(b) x(2-x) = 4(x-2) \quad \xrightarrow[\text{و مساوی صفر}]{\text{انتقال به سمت چپ}} x(2-x) - 4(x-2) = 0 \quad \xrightarrow{\text{فاکتور از } 2-x \text{ برداشت}} (2-x)(x-4(-1)) = 0 \Rightarrow \begin{cases} 2-x = 0 \Rightarrow x = 2 \\ x+4 = 0 \Rightarrow x = -4 \end{cases}$$

$$(c) x^2 - 4 = 0 \quad \xrightarrow{\text{اتحاد مزدوج}} (x-2)(x+2) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x-2 = 0 \Rightarrow x = 2 \\ x+2 = 0 \Rightarrow x = -2 \end{cases}$$

معادله دو ریشهٔ قرینه دارد.

(d) $x^2 - 6x + 9 = 0 \quad \xrightarrow{\text{اتحاد مربع دو جمله‌ای}} (x-3)^2 = 0 \Rightarrow x-3 = 0 \Rightarrow x = 3$ دو جواب یکسان است که آن را **ریشهٔ مضاعف** می‌نامیم.

$$(e) x^2 - 8x + 12 = 0 \quad \xrightarrow{\text{اتحاد جمله‌مشترک}} (x-2)(x-6) = 0$$

عبارت $x^2 - 8x + 12$ را به صورت $(x-2)(x-6)$ نوشت و طبق اتحاد جملهٔ مشترک، دو عدد می‌یابیم که مجموعشان -8 و ضربشان 12 باشد، این دو عدد -2 و -6 هستند که در جاهای خالی جایگزین می‌کنیم.

$$(f) 4x^2 - 4x - 3 = 0 \quad \xrightarrow{\text{اتحاد جملهٔ مشترک}} (2x-3)(2x+1) = 0$$

دو عدد می‌یابیم که مجموعشان -2 و ضربشان -3 باشد، این دو عدد -3 و $+1$ هستند که در جاهای خالی جایگزین می‌کنیم.

$$4x^2 - 4x - 3 = (2x-3)(2x+1) = 0 \Rightarrow x = \frac{3}{2} \quad \text{یا} \quad x = -\frac{1}{2}$$

تذکر ۴۴ ممکن است معادلهٔ داده شده از درجات بالاتر از 2 باشد ولی به کمک فاکتورگیری و تجزیهٔ بتوانیم آن را حل کنیم.

به عنوان مثال برای حل معادله $x^4 - 9x^2 = 0$ ، داریم:

$$x^4 - 9x^2 = 0 \quad \xrightarrow{\text{فاکتور از } x^2 \text{ برداشت}} x^2(x^2 - 9) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x^2 = 0 \Rightarrow x = 0 \\ x^2 - 9 = 0 \Rightarrow (x-3)(x+3) = 0 \Rightarrow x = 3 \quad \text{یا} \quad x = -3 \end{cases}$$

روش ریشه‌گیری ◀ دیدیم که با استفاده از تجزیه به کمک اتحاد مزدوج، ریشه‌های معادلهٔ درجهٔ دوم $= -4x^2 - 4$ را دو عدد قرینهٔ 2 و -2 به دست آوردیم. این معادله را بنویسیم آن به شکل $= 4x^2$ و یافتن ریشه‌های آن نیز می‌توانیم حل کنیم. به تعریف زیر توجه کنید:

اگر a یک عدد بزرگتر یا مساوی صفر باشد، ریشه‌های معادلهٔ درجهٔ دوم $x^2 = a$ عبارتند از: $x = \sqrt{a}$ و $x = -\sqrt{a}$

$$x^2 = a \xrightarrow{a \geq 0} x = \pm\sqrt{a}$$

$$x^2 = 16 \Rightarrow x = \pm\sqrt{16} = \pm 4$$

تذکر ۴۵ اگر a منفی باشد، معادله $= a$ جواب ندارد. زیرا مربع هیچ عدد حقیقی، منفی نخواهد بود. به عنوان مثال معادله $= -16$ جواب حقیقی ندارد.

تذکر ۴۶ معادلهٔ بالا را می‌توانیم تعمیم دهیم، یعنی به جای x و a در معادله $a^2 = x$ ، یک عبارت درجهٔ اول قرار گیرد. در این حالت، از ویژگی‌های زیر استفاده می‌کنیم:

$$(1) a^2 = b \Rightarrow a = \pm\sqrt{b} \quad (2) a^2 = b^2 \Rightarrow a = \pm b$$

به عنوان مثال برای حل معادله $= 81$ با استفاده از خاصیت ریشه‌گیری داریم:

$$(2x+1)^2 = 81 \Rightarrow 2x+1 = \pm\sqrt{81} \Rightarrow 2x+1 = \pm 9 \Rightarrow \begin{cases} 2x+1 = 9 \Rightarrow 2x = 8 \Rightarrow x = 4 \\ 2x+1 = -9 \Rightarrow 2x = -10 \Rightarrow x = -5 \end{cases}$$

حل معادله به روش مربع کامل

۲

در این روش باید معادلهٔ درجهٔ دوم $= ax^2 + bx + c = 0$ را به شکل $(x-h)^2 = k$ تبدیل کرده و سپس از روش ریشه‌گیری جواب‌ها را یابیم. فرض کنید می‌خواهیم معادلهٔ زیر را به روش مربع کامل کردن حل کنیم:

$$2x^2 + 5x - 3 = 0$$

مراحل زیر را برای حل معادله به ترتیب انجام می‌دهیم:

$$2x^2 + 5x = 3$$

$$\xrightarrow{\div 2} x^2 + \frac{5}{2}x = \frac{3}{2}$$

۱ عدد ثابت را به سمت راست تساوی و جملات شامل x و x^2 را در سمت چپ در نظر می‌گیریم.

۲ اگر ضریب x^2 یک نبود، طرفین را بر آن ضریب تقسیم می‌کنیم.

۳ نصف ضریب x را به توان 2 رسانده و به طرفین تساوی اضافه می‌کنیم. یعنی مربع نصف ضریب x را باید به طرفین اضافه کنیم.

$$\xrightarrow{+(\frac{5}{4})^2 = \frac{25}{16}} x^2 + \frac{5}{2}x + \frac{25}{16} = \frac{3}{2} + \frac{25}{16} \Rightarrow x^2 + \frac{5}{2}x + \frac{25}{16} = \frac{24+25}{16} \Rightarrow x^2 + \frac{5}{2}x + \frac{25}{16} = \frac{49}{16}$$

$$x^2 + \frac{5}{2}x + \frac{25}{16} = \frac{49}{16} \rightarrow \text{مربع کامل کردن سمت چپ}$$

۴. عبارت سمت چپ را به شکل اتحاد مربيع دو جمله‌ای می‌نویسیم.

۵. از خاصیت ریشه‌گیری (جذر از دو طرف) استفاده کرده و ریشه‌ها را می‌یابیم.

$$\begin{array}{l} \text{ریشه‌گیری} \\ \xrightarrow{x + \frac{5}{4} = \pm \frac{\sqrt{49}}{4}} \left\{ \begin{array}{l} x + \frac{5}{4} = \frac{\sqrt{49}}{4} \Rightarrow x = \frac{\sqrt{49}}{4} - \frac{5}{4} = \frac{2}{4} \Rightarrow x = \frac{1}{2} \\ x + \frac{5}{4} = -\frac{\sqrt{49}}{4} \Rightarrow x = -\frac{\sqrt{49}}{4} - \frac{5}{4} = -\frac{12}{4} \Rightarrow x = -3 \end{array} \right. \end{array}$$

در حل معادله درجه دوم $ax^2 + bx + c = 0$ به روش مربيع کامل: $(\Delta = b^2 - 4ac)$

عددی که به طرفین تساوی اضافه می‌شود، برابر $\frac{b^2}{4a^2}$ است.

پیمانه‌های ۲۰ و ۲۱

پرسش‌های چهارگزینه‌ای



صفحه‌های ۱۹ تا ۲۲ ریاضی و آمار (۱)

حل معادله به روش تجزیه و ریشه‌گیری

۱

صفحة ۲۱- مکمل تمرین (۱) (ازمون کانون- ۳ مرداد ۹۹)

۲۱. اگر $x = 2$ ریشه معادله $ax^2 + 5x + a = 0$ باشد، a کدام است؟

-۲ (۴)

-۳ (۳)

-۱ (۲)

$-\frac{3}{2}$ (۱)

(منطبق بر کتاب درسی - صفحه ۲۱- تمرین ۱)

$$x^2 = x - \frac{1}{4}$$

$$x^4 - 2x^2 = 0$$

$$2x^2 - 8 = 0 \quad (x+2)(x-2) = 3 - x$$

(منطبق بر کتاب درسی - صفحه ۲۱- تمرین ۱)

$$9x^2 + 3x - 2 = 0$$

$$x^2 - 5x + 6 = 0$$

$$\frac{x^2}{3} = x \quad x^2 + 4x + 4 = 0$$

صفحة ۲۱- مکمل تمرین ۱- ب) (ازمون کانون- ۲۳ مهر ۱۴۰۰)

۷ (۴)

۳ صفر

-۵ (۲)

(۱)

صفحة ۲۱- مکمل تمرین ۲

۴ (۴)

۸ (۳)

۱۶ (۲)

۳۲ (۱)

۲۶. اگر a کوچکترین عدد طبیعی و $\frac{2}{3}$ و -3 - ریشه‌های معادله درجه دوم $ax^2 + bx + c = 0$ باشند، آنگاه $b + c$ کدام است؟

صفحة ۲۱- مکمل تمرین ۳

$-\frac{2}{3}$ (۴)

$\frac{1}{3}$ (۳)

$\frac{2}{3}$ (۲)

$-\frac{1}{3}$ (۱)

صفحة ۲۱- مکمل تمرین ۳

۵ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

صفحة ۲۱- مشابه تمرین ۱- د) (ازمون کانون- ۶ آبان ۱۴۰۱)

-۲ (۴)

-۷ (۳)

۷ (۲)

-۳ (۱)

صفحة ۲۱- مشابه تمرین ۱- د) (ازمون کانون- ۶ آبان ۱۴۰۱)

$-\frac{4}{5}$ (۴)

$-\frac{4}{5}$ (۳)

$\frac{1}{5}$ (۲)

$-\frac{1}{5}$ (۱)

۳۰. اگر جواب‌های معادله $2x^2 - 7x + b = 0$ با جواب‌های معادله $4x(a)x - 2 = 0$ مشترک باشند، آنگاه $a + b$ کدام است؟

صفحة ۲۱- مکمل تمرین ۳

۶ (۴)

۹ (۳)

۱۲ (۲)

۱) صفر

صفحة ۲۱- مشابه تمرین ۱- ذ) (ازمون کانون- ۷ فروردین ۱۴۰۱)

$\frac{7}{2}$ (۴)

$\frac{7}{4}$ (۳)

$\frac{5}{2}$ (۲)

$\frac{5}{4}$ (۱)

صفحة ۲۱- مشابه تمرین ۱- ذ) (ازمون کانون- ۶ آبان ۱۴۰۱)

$-\frac{3}{4}$ (۴)

$-\frac{3}{4}$ (۳)

$-\frac{5}{4}$ (۲)

$\frac{5}{4}$ (۱)

۳۳. هر یک از ریشه‌های معادله $x^2 - 2x - 16 = 0$ یک واحد از ریشه‌های معادله $9x^2 + ax + b = 0$ بیشتر است. کدام است؟
 (صفحه ۲۱- مرتبط با تمرین ۱)

-۲۵ (۴) ۵ (۳) -۵ (۲) ۲۵ (۱)

۳۴. اگر $\frac{1}{2}x$ ریشه مشترک دو معادله $x^2 - a = 0$ و $(x - 8a)(x - 8a) = 0$ باشد، آنگاه مجموع ریشه‌های غیرمشترک دو معادله کدام است؟
 (صفحه ۲۱- مرتبط با تمرین ۱)

۱ (۴) ۵ (۳) ۴ (۲) ۳ (۱)

۳۵. مثلثی که رئوس آن مبدأ مختصات، نقطه‌ای با عرض c و نقطه‌ای با طول یکی از ریشه‌های معادله $x^2 + 5x + c = 0$ روی محورهای مختصات باشد را در نظر بگیرید. اگر مساحت مثلث برابر c^2 باشد، مقدار c کدام است؟ ($c \neq 0$)
 (سوال توکیبی- حل معادله درجه دوم و مساحت و خط) (سراسری انسانی- تیر ۱۴۰۲)

-۲/۷۵ (۴) -۱/۷۵ (۳) ۲/۷۵ (۲) ۱/۷۵ (۱)

حل معادله به روش مربع کامل

۲

(صفحه‌های ۲۳ تا ۲۷ ریاضی و آمار (۱))

۳۶. در حل معادله $2x^2 + 7x - 4 = 0$ به روش مربع کامل کردن، پس از یک شدن ضریب x^2 ، جه عددی را باید به دو طرف تساوی اضافه کنیم؟
 (مکمل صفحه‌های ۲۴ و ۲۳)

$\frac{1}{4}$ (۴) $\frac{25}{16}$ (۳) $\frac{49}{64}$ (۲) $\frac{49}{16}$ (۱)

۳۷. در حل معادله $5x^2 + 3x - 5 = 0$ به روش مربع کامل کردن، به تساوی $k(x + a)^2 = k$ رسیده‌ایم. مقدار $\frac{k}{a}$ کدام است؟
 (مکمل صفحه‌های ۲۴ و ۲۳)

$\frac{49}{16}$ (۴) $\frac{49}{4}$ (۳) $\frac{49}{8}$ (۲) $\frac{49}{12}$ (۱)

۳۸. در حل معادله $9x^2 + ax - 2 = 0$ ، پس از مربع کامل کردن طرف چپ تساوی، در سمت راست از عدد $\frac{1}{4}$ جذر گرفته شده است، a^2 کدام است؟
 (مکمل صفحه‌های ۲۴ و ۲۳)

۲ (۴) ۴ (۳) ۳ (۲) ۹ (۱)

۳۹. اگر معادله $2x^2 - ax - 4 = 0$ را به روش مربع کامل حل کنیم، به صورت $b = -\frac{3}{4}(x - \frac{3}{4})^2$ در می‌آید. $a - b$ کدام است؟
 (مکمل صفحه‌های ۲۳ و ۲۴) (آزمون کانون ۱۹ آذر ۱۴۰۰)

$\frac{29}{4}$ (۴) $\frac{17}{4}$ (۳) $\frac{89}{16}$ (۲) $\frac{7}{16}$ (۱)

۴۰. جواب‌های دو معادله $a(x + \frac{2}{c})^2 = 1$ و $5x^2 + 4cx + \frac{31}{a} = 0$ با هم برابرند. c کدام است؟
 (مکمل صفحه‌های ۲۴ و ۲۳)

۱۰ (۴) ۴ (۳) ۵ (۲) ۳ (۱)

حل معادله درجه دوم و کاربردها

۲

ریاضی و آمار (۱)- پایه دهم- فصل اول- صفحه‌های ۱۹ تا ۳۲

روش کلی حل معادله درجه دوم (روش دلتا)

۳

با استفاده از روش مربع کامل کردن، می‌توانیم روش کلی برای حل معادله درجه دوم $ax^2 + bx + c = 0$ بیابیم.

فرمول کلی حل معادله درجه دوم (روش دلتا)

فرمول کلی حل معادله درجه دوم $ax^2 + bx + c = 0$ به صورت زیر به دست می‌آید که به **فرمول دلتا** معروف است.

$$x_1, x_2 = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

که در آن $\Delta = b^2 - 4ac$ است. عبارت دلتا (Δ) را **میان** معادله نیز می‌نامیم.

در حل معادله به روش دلتا، همواره باید معادله به **شكل استاندارد** $ax^2 + bx + c = 0$ باشد، با تعیین ضرایب معادله و تشکیل Δ (در صورت بزرگتر یا مساوی صفر بودن) جواب‌ها را می‌باییم.

۶. گزینه

اگر عدد مورد نظر را x در نظر بگیریم، تفاضل عدد از ۱۵ یعنی $x - 15$ و یک چهارم مجموع همان عدد با ۲۵ یعنی $\frac{1}{4}(x + 25)$ ، پس طبق فرض داریم:

$$15 - x = \frac{1}{4}(x + 25) \xrightarrow{x \leftarrow 4} 60 - 4x = x + 25$$

$$\Rightarrow -4x - x = 25 - 60 \Rightarrow -5x = -35 \Rightarrow x = 7$$

۷. گزینه

اگر عدد مورد نظر را x در نظر بگیریم، سه برابر نصف قرینه عدد یعنی $\frac{3}{2}(-x - 3)$ و سه برابر نصف قرینه عدد، بعلاوه ۱۸، یعنی $\frac{3}{2}x + 18$ و ۷ برابر آن عدد، منهای ۱۶ یعنی $-7x - 16$ ، پس طبق فرض داریم:

$$-\frac{3}{2}x + 18 = 7x - 16 \xrightarrow{x \leftarrow 2} -3x + 36 = 14x - 32$$

$$\Rightarrow -3x - 14x = -32 - 36 \Rightarrow -17x = -68 \Rightarrow x = \frac{-68}{-17}$$

۸. گزینه

اولین عدد مورد نظر را x در نظر می‌گیریم. با اضافه کردن عدد ۶ به آن، مضربهای بعدی عدد ۶ به دست می‌آید. بنابراین چهار عدد متوالی مضرب ۶ به صورت $x + 6, x + 12, x + 18, x + 24$ است. طبق فرض مجموع این چهار عدد برابر با ۲۵۲ است:

$$x + (x + 6) + (x + 12) + (x + 18) = 252 \Rightarrow 4x + 36 = 252$$

$$\Rightarrow 4x = 252 - 36 \Rightarrow 4x = 216 \Rightarrow x = \frac{216}{4} = 54$$

کوچکترین عدد ۵۴ است که باقیمانده تقسیم آن بر عدد ۵ برابر با ۴ است.

۹. گزینه

عرض مستطیل را x و طول مستطیل را y در نظر می‌گیریم. طول مستطیل از سه برابر عرض آن چهار واحد کمتر است، یعنی $y = 3x - 4$. محیط مستطیل ۴۰ واحد است، پس داریم:

$$2(x + y) = 40 \xrightarrow{y = 3x - 4} 2(x + 3x - 4) = 40 = 2(4x - 4)$$

$$\xrightarrow{+2} 20 = 4x - 4 \Rightarrow 24 = 4x \Rightarrow x = 6$$

$$y = 3 \times 6 - 4 = 14 \quad x \text{ و طول مستطیل}$$

است و مساحت آن برابر است با:

$$S = xy = 6 \times 14 = 84$$

۱۰. گزینه

طول ضلع اول، دوم و سوم را به ترتیب a_1, a_2 و a_3 در نظر می‌گیریم. طبق فرض مسئله داریم:

$$\begin{cases} a_2 = 2a_1 - 3 \\ a_3 = \frac{a_1 + 1}{5} + \frac{3}{2} \end{cases} \Rightarrow a_2 = 2a_1 - 3 - \text{ضلع اول} \times 2 = \text{ضلع دوم}$$

با مساوی قرار دادن دو تساوی بالا، ضلع سوم را بر حسب ضلع اول به دست می‌آوریم:

$$\frac{a_1 + 1}{5} + \frac{3}{2} = 2a_1 - 3 \xrightarrow{x \leftarrow 2} a_1 + 3 = 4a_1 - 6 \Rightarrow a_3 = 4a_1 - 9$$

محیط مثلث ۲۳ متر است، پس داریم:

$$a_1 + a_2 + a_3 = 23$$

$$\frac{a_1 + 3}{2} + a_3 = 23 \xrightarrow{a_1 = 4a_1 - 9} a_1 + (2a_1 - 3) + (4a_1 - 9) = 23$$

$$\Rightarrow 7a_1 - 12 = 23 \Rightarrow 7a_1 = 35 \Rightarrow a_1 = 5$$

بنابراین طول ضلع اول $a_1 = 5$ است. طول اضلاع دیگر را می‌باشیم:

$$\begin{cases} a_2 = 2a_1 - 3 = 2 \times 5 - 3 = 7 \\ a_3 = 4a_1 - 9 = 4 \times 5 - 9 = 11 \end{cases}$$

پس کوچکترین ضلع $a_1 = 5$ است.

پاسخ تشریحی معادله درجه دوم

پاسخ تشریحی: فرزانه دانایی

۱. گزینه

ابتدا اعداد را در پرانتزها ضرب می‌کنیم:

$$4(-x + 3) = 3\left(\frac{x}{5} + 7\right) \Rightarrow -4x + 12 = \frac{3x}{5} + 21$$

$$\xrightarrow{\times 5} -20x + 60 = 3x + 105$$

مجهولات یک طرف و اعداد ثابت را به طرف دیگر تساوی منتقل می‌کنیم:

$$-20x - 3x = 105 - 60 \Rightarrow -23x = 45 \Rightarrow x = -\frac{45}{23}$$

۲. گزینه

هر یک از معادلات را جداگانه حل می‌کنیم. برای حل معادلات، ابتدا اعداد را در پرانتزها ضرب کرده و سپس معادله را ساده می‌کنیم.

حل معادله اول:

$$4 - 3\left(\frac{1}{2}x - 2\right) = \frac{5}{2}x - 6 \Rightarrow 4 - \frac{3}{2}x + 6 = \frac{5}{2}x - 6$$

$$\Rightarrow -\frac{5}{2}x - \frac{3}{2}x = -6 - 6 - 4 \Rightarrow -4x = -16 \xrightarrow{+(-4)} x = 4$$

$$0 / 2x + 0 / 3x = 0 / 4x + 0 / 25$$

حل معادله دوم:

$$0 / 2x + 0 / 3x = 0 / 2x + 1 / 25$$

$$\Rightarrow 0 / 3x - 0 / 2x = 1 / 25 - 0 / 25 \Rightarrow 0 / 1x = 0 / 5$$

$$\xrightarrow{+0/1} x = 5$$

بنابراین جواب معادله اول، یک واحد از جواب معادله دوم کمتر است.

۳. گزینه

با استفاده از اتحاد $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ معادله را بازنویسی کرده و سپس ساده می‌کنیم:

$$(3x - 1)^2 = 9(x + 1)^2 + 16 - 12x$$

$$\Rightarrow 9x^2 - 6x + 1 = 9(x^2 + 2x + 1) + 16 - 12x$$

$$\Rightarrow 9x^2 - 6x + 1 = 9x^2 + 18x + 9 + 16 - 12x$$

$$\Rightarrow -6x + 1 = 6x + 25 \Rightarrow -6x - 6x = 25 - 1$$

$$\Rightarrow -12x = 24 \xrightarrow{+(-12)} x = -2$$

۴. گزینه

ریشه معادله در خود معادله صدق می‌کند. بنابراین با جایگذاری $x = 2$ در معادله خواهیم داشت:

$$\frac{kx - 1}{3} - \frac{3x + 2k}{2} = \frac{x - 18}{4}$$

$$\xrightarrow{x=2} \frac{2k - 1}{3} - \frac{6 + 2k}{2} = \frac{-16}{4}$$

$$\Rightarrow \frac{2k - 1}{3} - (\frac{3 + k}{3}) = -4 \xrightarrow{x \leftarrow 3} 2k - 1 - 9 - 3k = -12$$

$$\Rightarrow -k - 10 = -12 \Rightarrow -k = -2 \Rightarrow k = 2$$

$$\Rightarrow k^2 - 2k = 2^2 - 2 \times 2 = 0$$

۵. گزینه

ابتدا معادله $8x + 3 = 5x + 12$ را حل می‌کنیم:

$$8x - 5x = 12 - 3 \Rightarrow 3x = 9 \Rightarrow x = 3$$

بنابراین $x = 3$ جواب معادله در خود معادله صدق می‌کند، پس داریم:

$$\frac{k+x}{3} = -k - 2x + 5 \xrightarrow{x=3} \frac{k+3}{3} = -k - 6 + 5$$

$$\xrightarrow{x \leftarrow 3} k + 3 = -3k - 3 \Rightarrow k + 3k = -3 - 3 \Rightarrow 4k = -6$$

$$\Rightarrow k = -\frac{6}{4} = -\frac{3}{2}$$

۱۱. گزینه

۱۱

$$\frac{\text{قاعده} \times \text{ارتفاع}}{2} = \text{عرض} \times \text{طول} \Rightarrow \text{مساحت مثلث} = \text{مساحت مستطيل}$$


$$\begin{aligned} & \Rightarrow (x+1)(3x+2) = \frac{2x(3x+6)}{2} \\ & \Rightarrow (x+1)(3x+2) = x(3x+6) \\ & \Rightarrow 3x^2 + 2x + 3x + 2 = 3x^2 + 6x \Rightarrow 5x + 2 = 6x \\ & \Rightarrow 2 = 6x - 5x \Rightarrow x = 2 \end{aligned}$$

بنابراین اضلاع مستطیل برابرند با:

$$\begin{aligned} x+1 &= 2+1=3, \quad 3x+2=3\times 2+2=8 \\ & 2(3+8)=2\times 11=22 \end{aligned}$$

۱۲. گزینه

۱۲



۱۳. گزینه

۱۳

اگر تعداد کتاب‌های احمد را x در نظر بگیریم، طبق فرض داریم:

$$\begin{aligned} \frac{x}{2} &= \text{نصف احمد} = \text{رضا} \\ \text{رضا کل کتابها} &\downarrow \\ \frac{1}{3}(x-\frac{x}{2}) &= \frac{1}{3} \times \frac{x}{2} = \frac{x}{6} = \text{حسین} \\ \text{حسین رضا کل کتابها} &\downarrow \quad \downarrow \\ \frac{1}{4}(x-\frac{x}{2}-\frac{x}{6}) &= \frac{1}{4} \times \frac{x}{3} = \frac{x}{12} = \text{ربع باقیمانده کتابها} = \text{نیما} \\ \text{پس کل کتابها} &= \text{برابر با مجموع کتاب‌های رضا، حسین و نیما بعلاوه ۱۲} \\ \text{است:} & \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x &= \frac{x}{2} + \frac{x}{6} + \frac{x}{12} + 12 \\ & \text{ک.م.م مخرج‌ها } 12 \text{ است. طرفین تساوی را در } 12 \text{ ضرب می‌کنیم:} \\ 12x &= 12(\frac{x}{2}) + 12(\frac{x}{6}) + 12 \times 12 \\ & \Rightarrow 12x = 6x + 2x + x + 144 \Rightarrow 12x = 9x + 144 \Rightarrow 3x = 144 \\ & \Rightarrow x = \frac{144}{3} = 48 \Rightarrow \text{تعداد کتاب‌های حسین} = \frac{x}{6} = \frac{48}{6} = 8 \end{aligned}$$

۱۴. گزینه

۱۴

پس انداز احمد در پایان روز شنبه را x در نظر می‌گیریم. در هر روز، ۲ برابر روز قبل پس انداز می‌کند، بنابراین پس انداز او در هر روز به صورت زیر است:

روز	پنجشنبه	چهارشنبه	سهشنبه	دوشنبه	یکشنبه	شنبه	یکشنبه	دوشنبه	سهشنبه	چهارشنبه	پنجشنبه
پس انداز	x	$2x$	$4x$	$8x$	$16x$	$32x$	$64x$	$128x$	$256x$	$512x$	$1024x$

پس انداز احمد در پایان روز پنجشنبه 480 هزار تومان است، بنابراین داریم:

$$32x = 480 \Rightarrow x = \frac{480}{32} = 15$$

اختلاف پس انداز احمد در پایان روزهای سهشنبه و یکشنبه برابر است با:
 $8x - 2x = 6x = 6 \times 15 = 90$

$$\begin{aligned} & \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ \frac{x}{3} - 1 = 0 \Rightarrow \frac{x}{3} = 1 \Rightarrow x = 3 \end{cases} \\ & \text{«۳» : } x^2 - 5x + 6 = 0 \\ & \text{اتحاد جمله مشترک} \rightarrow (x-2)(x-3) = 0 \Rightarrow x = 2 \text{ یا } x = 3 \\ & \text{«۴» : } 9x^2 + 3x - 2 = 0 \Rightarrow (3x)^2 + 1(3x) - 2 = 0 \\ & \text{اتحاد جمله مشترک} \rightarrow (3x+2)(3x-1) = 0 \\ & \text{دو عدد که جمعشان ۱ و ضربشان -۲ باشد} \\ & \Rightarrow \begin{cases} 3x+2 = 0 \Rightarrow 3x = -2 \Rightarrow x = -\frac{2}{3} \\ 3x-1 = 0 \Rightarrow 3x = 1 \Rightarrow x = \frac{1}{3} \end{cases} \\ & \text{بنابراین معادله گزینه «۴» دو ریشه مختلف علامت دارد.} \\ & \text{نکته: برای آنکه معادله درجه دوم } ax^2 + bx + c = 0, \text{ دارای دو ریشه مختلف علامت باشد، کافی است } ac < 0. \end{aligned}$$

۴ گزینه

$$\begin{aligned} & x^2(-x+2) + 5x(x-2) = 0 \\ & -(x-2) \\ & \text{فاکتورگیری از } x(x-2)(-x+5) = 0 \\ & \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x-2 = 0 \Rightarrow x = 2 \\ -x+5 = 0 \Rightarrow x = 5 \end{cases} \rightarrow \text{مجموع جوابها} = 7 \end{aligned}$$

۵ گزینه

$$\begin{aligned} & \text{ابتدا طرف چپ معادله را با استفاده از اتحاد مربع دو جمله‌ای، بازنویسی می‌کنیم:} \\ & (x-2)^2 + (x+2)^2 = 3x^2 \\ & \Rightarrow x^2 - 4x + 4 + x^2 + 4x + 4 = 3x^2 \\ & \Rightarrow 2x^2 + 8 = 3x^2 \Rightarrow x^2 = 8 \Rightarrow x = \pm\sqrt{8} \\ & \Rightarrow (\sqrt{8})^2 + (-\sqrt{8})^2 = 8 + 8 = 16 \end{aligned}$$

۶ گزینه

$$\begin{aligned} & \text{اگر } x = m \text{ و } x = n \text{ ریشه‌های یک معادله درجه دوم باشند، می‌توان معادله را به صورت } a(x-n)(x-m) = 0 \text{ نوشت.} \\ & \text{می‌دانیم کوچک‌ترین عدد طبیعی، یک است پس } a = 1, \text{ از آنجا که ریشه‌های معادله } -3 \text{ و } \frac{2}{3} \text{ است، پس می‌توان معادله را به صورت زیر نوشت:} \\ & (x - \frac{2}{3})(x - (-3)) = 0 \Rightarrow (x - \frac{2}{3})(x + 3) = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \Rightarrow x^2 + 3x - \frac{2}{3}x - \frac{2}{3} \times 3 = 0 \Rightarrow x^2 + \frac{7}{3}x - 2 = 0 \\ & \xrightarrow{\text{مقایسه با}} \begin{cases} b = \frac{7}{3} \\ c = -2 \end{cases} \Rightarrow b + c = \frac{7}{3} - 2 = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

۷ گزینه

$$\begin{aligned} & \text{ریشه معادله در خود معادله صدق می‌کند، بنابراین داریم:} \\ & x^2 - 4x + a = 0 \xrightarrow{x=a} a^2 - 4a + a = 0 \Rightarrow a^2 - 3a = 0 \\ & \xrightarrow{\text{فاکتورگیری}} a(a-3) = 0 \Rightarrow \begin{cases} a = 0 \\ a - 3 = 0 \Rightarrow a = 3 \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{با توجه به شرط } a > 2, \text{ جواب } a = 3 \text{ قابل قبول است. با جایگذاری در معادله، به معادله } x^2 - 4x + 3 = 0 \text{ می‌رسیم، برای تجزیه معادله با استفاده از اتحاد جمله مشترک، دو عدد می‌خواهیم که مجموعشان ۴ و حاصل ضربشان ۳ شود، آن دو عدد } -1 \text{ و } -3 \text{ هستند، پس داریم:} \\ & x^2 - 4x + 3 = 0 \Rightarrow (x-1)(x-3) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x-1 = 0 \Rightarrow x = 1 \\ x-3 = 0 \Rightarrow x = 3 \end{cases} \end{aligned}$$

۱۹ گزینه

اگر تعداد دانش‌آموزان ریاضی را x و تعداد دانش‌آموزان تجربی را y در نظر بگیریم، طبق فرض مسئله تعداد دانش‌آموزان انسانی برابر است با:

$$2x - 3 = \frac{y}{3} + 36$$

$$\Rightarrow 2x - \frac{y}{3} = 39 \xrightarrow{x=3} 6x - y = 117$$

تعداد کل دانش‌آموزان برابر با ۱۹۵ است، بنابراین:

$$x + y + (2x - 3) = 195 \Rightarrow 3x + y = 198$$

دستگاه معادلات زیر را حل می‌کنیم:

$$\begin{cases} 6x - y = 117 \\ 3x + y = 198 \end{cases} \xrightarrow{\text{جمع طرفین}} 9x = 315 \Rightarrow x = \frac{315}{9} = 35$$

$$\xrightarrow{3 \times 35 + y = 198} 3 \times 35 + y = 198 \Rightarrow y = 198 - 105 = 93$$

اختلاف تعداد دانش‌آموزان ریاضی و تجربی $= y - x = 93 - 35 = 58$

۲۰ گزینه

شماره حروف کلمه «شیوا» به صورت زیر است:

$$\rightarrow \text{الف} \rightarrow ۳۰ \rightarrow \text{د} \rightarrow ۳۲ \rightarrow \text{ی} \rightarrow ۱۶$$

بنابراین حرف «ش» را با $16x^3$, حرف «د» را با $32x^3$, حرف «و» را با

عدد ۳۰ و حرف «ر» را با عدد ۱ مشخص می‌کنیم. پس معادل ریاضی

$$16x^3 + 32x^3 + 30 + 1$$

کلمه «شیوا» به صورت رو به رو است:

۲۱ گزینه

ریشه معادله در خود معادله صدق می‌کند، بنابراین با قرار دادن ۲ به جای همه x ها در معادله داریم:

$$ax^2 + dx + a = 0 \xrightarrow{x=2} a \times 2^2 + d \times 2 + a = 0$$

$$\Rightarrow 4a + 10 + a = 0 \Rightarrow 5a = -10 \Rightarrow a = -2$$

۲۲ گزینه

معادله هر یک از گزینه‌ها را حل می‌کنیم:

$$\text{«۱» : } (x+2)(x-3) = 3 - x$$

عبارت سمت راست را به چپ منتقل می‌کنیم.

$$\xrightarrow{\text{از } x-3 \text{ فاکتور می‌گیریم.}} (x-3)(x+2+1) = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x-3 = 0 \Rightarrow x = 3 \\ x+3 = 0 \Rightarrow x = -3 \end{cases}$$

$$\text{«۲» : } 2x^2 - 8 = 0 \Rightarrow 2x^2 = 8 \xrightarrow{+2} x^2 = 4 \Rightarrow x = \pm 2$$

$$\text{«۳» : } x^4 - 2x^2 = 0 \xrightarrow{\text{فاکتورگیری از } x^2} x^2(x^2 - 2) = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x^2 = 0 \Rightarrow x = 0 \\ x^2 - 2 = 0 \Rightarrow x^2 = 2 \Rightarrow x = \pm\sqrt{2} \end{cases}$$

$$\text{«۴» : } x^2 = x - \frac{1}{4} \Rightarrow x^2 - x + \frac{1}{4} = 0$$

با استفاده از اتحاد مربع دو جمله‌ای $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ داریم:

$$(x - \frac{1}{2})^2 = 0 \Rightarrow x - \frac{1}{2} = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{2}$$

بنابراین معادله گزینه «۴» فقط یک جواب حقیقی دارد.

۲۳ گزینه

معادله هر یک از گزینه‌ها را حل می‌کنیم:

$$\text{«۱» : } x^2 + 4x + 4 = 0 \xrightarrow{(x+2)^2 = 0}$$

$$\Rightarrow x + 2 = 0 \Rightarrow x = -2$$

$$\text{«۲» : } \frac{x^2}{3} = x \Rightarrow \frac{x^2}{3} - x = 0 \xrightarrow{\text{فاکتورگیری}} x(\frac{x}{3} - 1) = 0$$

۳. گزینه

۲۸

ریشه معادله در خود معادله صدق می‌کند، بنابراین داریم:

$$kx + 7 = \frac{x(x+1)}{2} - x \xrightarrow{x=2} 2k + 7 = \frac{2 \times 3}{2} - 2$$

$$\Rightarrow 2k + 7 = 1 \Rightarrow 2k = -6 \Rightarrow k = -3$$

با جایگذاری $k = -3$ و پس از آن مرتب کردن معادله، خواهیم داشت:

$$-3x + 7 = \frac{x(x+1)}{2} - x \xrightarrow{x \neq 2} -6x + 14 = \frac{x^2+x}{2} - 2x$$

$$\Rightarrow -6x + 14 = x^2 - x \Rightarrow x^2 + 5x - 14 = 0$$

برای تجزیه معادله بالا با استفاده از اتحاد جمله مشترک، دو عدد می‌خواهیم که مجموعشان $+5$ و حاصل ضربشان -14 شود، آن دو عدد $+7$ و -2 هستند، پس داریم:

$$x^2 + 5x - 14 = 0 \Rightarrow (x+7)(x-2) = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x+7=0 \Rightarrow x=-7 \\ x-2=0 \Rightarrow x=2 \end{cases}$$

۱. گزینه

۲۹

$$25x^2 = 15x + 4 \Rightarrow 25x^2 - 15x - 4 = 0$$

می‌توانیم معادله را به صورت $(5x)^2 - 3(5x) - 4 = 0$ (۵x) در نظر بگیریم. در این صورت می‌توان از اتحاد جمله مشترک استفاده کرد که جمله مشترک $5x$ است. پس دو عدد می‌خواهیم که مجموعشان -3 و حاصل ضربشان -4 باشد، آن دو عدد -4 و $+1$ هستند، پس داریم:

$$(5x)^2 - 3(5x) - 4 = 0 \Rightarrow (5x-4)(5x+1) = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 5x-4=0 \Rightarrow 5x=4 \Rightarrow x=\frac{4}{5} \\ 5x+1=0 \Rightarrow 5x=-1 \Rightarrow x=-\frac{1}{5} \end{cases}$$

۱. گزینه

۳۰

ابتدا پرانتزهای معادله دوم را در یکدیگر ضرب می‌کنیم:

$$(4x+a)(x-2) = 0 \Rightarrow 4x^2 - 8x + ax - 2a = 0$$

$$\Rightarrow 4x^2 + (a-8)x - 2a = 0 \quad (*)$$

از آنجا که جواب‌های دو معادله با هم برابرند، پس ضرایب دو معادله نیز باید برابر باشند، از آنجا که ضریب x^2 در معادله (*) برابر با 4 است، پس در معادله $2x^2 - 7x + b = 0$ ضریب x^2 را 4 می‌کنیم:

$$2x^2 - 7x + b = 0 \xrightarrow{x^2} 4x^2 - 14x + 2b = 0$$

حال ضرایب دو معادله را متحدد با هم قرار می‌دهیم:

$$\begin{cases} 4x^2 + (a-8)x - 2a = 0 \\ 4x^2 - 14x + 2b = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a-8 = -14 \Rightarrow a = -6 \\ -2a = 2b \Rightarrow b = -a = 6 \end{cases}$$

بنابراین داریم:

$$a+b = -6+6 = 0$$

۲. گزینه

۳۱

با توجه به خاصیت ریشه‌گیری، اگر $a^2 = b^2$ آنگاه $a = \pm b$ داریم:

$$(3-4x)^2 = 25 = 5^2 \xrightarrow{\text{ریشه‌گیری}} 3-4x = \pm 5$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 3-4x=5 \Rightarrow -4x=2 \Rightarrow x=-\frac{2}{4}=-\frac{1}{2} \\ 3-4x=-5 \Rightarrow -4x=-8 \Rightarrow x=\frac{-8}{-4}=2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow |2 - (-\frac{1}{2})| = \frac{5}{2} \quad \text{قدرتلخ اختلاف ریشه‌ها}$$

گزینه

۳۹

طرف چپ معادله $(x - \frac{3}{4})^2 = b$ را با استفاده از اتحاد مربع دو جمله‌ای باز می‌کنیم:

$$x^2 - 2x \cdot \frac{3}{4} + (\frac{3}{4})^2 = b \Rightarrow x^2 - \frac{3}{2}x + \frac{9}{16} - b = 0 \quad (*)$$

ضریب x^2 در معادله $2x^2 - ax - 4 = 0$ برابر با ۲ است، پس عدد ۲ را در معادله (*) ضرب می‌کنیم:

$$(*) \rightarrow 2x^2 - 3x + \frac{9}{4} - 2b = 0$$

$$\begin{cases} a = 3 \\ -\frac{9}{4} = -2b \Rightarrow b = \frac{41}{16} \end{cases} \Rightarrow b = \frac{41}{16}$$

$$\Rightarrow a - b = 3 - \frac{41}{16} = \frac{7}{16}$$

گزینه

۴۰

$$a(x + \frac{2}{c})^2 = 1 \Rightarrow (x + \frac{2}{c})^2 = \frac{1}{a}$$

طرف چپ معادله بالا را با استفاده از اتحاد مربع دو جمله‌ای باز می‌کنیم:

$$(x + \frac{2}{c})^2 = \frac{1}{a} \Rightarrow x^2 + \frac{4}{c}x + \frac{4}{c^2} = \frac{1}{a^2}$$

$$\Rightarrow x^2 + \frac{4}{c}x + \frac{4}{c^2} - \frac{1}{a^2} = 0 \quad (*)$$

ضریب معادله $5x^2 + 4cx + \frac{31}{a} = 0$ را با تقسیم طرفین بر ۵، یک می‌کنیم:

$$5x^2 + 4cx + \frac{31}{a} = 0 \rightarrow x^2 + \frac{4c}{5}x + \frac{31}{5a} = 0 \quad (**)$$

طبق فرض، دو معادله (*) و (**) دارای جواب‌های برابرند، پس ضرایب آنها با هم برابر است:

$$\frac{4}{c} = \frac{4c}{5} \Rightarrow 4c^2 = 20 \Rightarrow c^2 = 5$$

گزینه

۴۱

$$-2x^2 + 9x + 5 = 0 \rightarrow a = -2, b = 9, c = 5$$

$$\Delta = b^2 - 4ac = 9^2 - 4(-2)(5) = 81 + 40 = 121$$

گزینه

۴۲

جواب‌ها در صورتی گویا می‌شوند که $\sqrt{\Delta}$ عددی گویا باشد، پس برای هر یک از گزینه‌ها $\sqrt{\Delta}$ را محاسبه می‌کنیم:

$$\text{«۱»: } x^2 - 4x + 2 = 0 \rightarrow a = 1, b = -4, c = 2$$

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-4)^2 - 4(1)(2) = 16 - 8 = 8$$

$$\sqrt{\Delta} = \sqrt{8} \rightarrow \text{گویا نیست.}$$

$$\text{«۲»: } x^2 - 4x - 2 = 0 \rightarrow a = 1, b = -4, c = -2$$

$$\Delta = (-4)^2 - 4(1)(-2) = 16 + 8 = 24$$

$$\sqrt{\Delta} = \sqrt{24} \rightarrow \text{گویا نیست.}$$

$$\text{«۳»: } 2x^2 - 4x + \frac{7}{\lambda} = 0 \rightarrow a = 2, b = -4, c = \frac{7}{\lambda}$$

$$\Delta = (-4)^2 - 4(2)(-\frac{7}{\lambda}) = 16 + 28 = 44$$

$$\sqrt{\Delta} = \sqrt{44} = 2\sqrt{11} \rightarrow \text{گویا نیست.}$$

$$\text{«۴»: } 2x^2 - 4x - \frac{7}{\lambda} = 0 \rightarrow a = 2, b = -4, c = -\frac{7}{\lambda}$$

$$\Delta = (-4)^2 - 4(2)(-\frac{7}{\lambda}) = 16 + 28 = 44$$

$$\sqrt{\Delta} = \sqrt{44} \rightarrow \text{گویا نیست.}$$

گزینه

۴۳

$$(1+2x)(x-2) = 0 \Rightarrow \begin{cases} 1+2x = 0 \Rightarrow x = -\frac{1}{2} \\ x-2 = 0 \Rightarrow x = 2 \end{cases}$$

بنابراین مجموع ریشه‌های غیرمشترک دو معادله برابر با ۳ + ۲ = ۵ است.

گزینه

۴۴

اگر α یک ریشه معادله $x^2 + 5x + c = 0$ باشد، طبق فرض مسئله، نمودار فرضی مقابل را در نظر می‌گیریم.

بنابراین مثلث مورد نظر یک مثلث قائم‌الزاویه با ارتفاع $|c|$ و قاعده $|\alpha|$ است. توجه کنید که α و c می‌توانند اعداد منفی باشند، پس قدر مطلق آنها را در نظر می‌گیریم:

$$\frac{\text{ارتفاع} \times \text{قاعده}}{2} = \frac{|c| \times |\alpha|}{2} = c^2$$

$$\Rightarrow |c| \times |\alpha| = 2c^2 \xrightarrow[c \neq 0]{+|c|} |\alpha| = 2|c| \Rightarrow \alpha = \pm 2c$$

ابتدا فرض می‌کنیم: $\alpha = 2c$ ، بنابراین $2c$ ریشه معادله $x^2 + 5x + c = 0$ است. ریشه معادله در خود معادله صدق می‌کند، پس داریم:

$$(2c)^2 + 5(2c) + c = 0 \Rightarrow 4c^2 + 10c + c = 0$$

$$\Rightarrow 4c^2 + 11c = 0 \xrightarrow{\text{فاکتور گیری}} c(4c + 11) = 0$$

$$\xrightarrow[c \neq 0]{4c + 11 = 0} c = -\frac{11}{4} = -2.75$$

گزینه

۴۵

ابتدا باید ضریب x^2 را یک کنیم، پس طرفین تساوی را بر ۴ تقسیم می‌کنیم:

$$4x^2 + 7x = 2 \xrightarrow{+4} x^2 + \frac{7}{4}x = \frac{2}{4}$$

نصف ضریب x یعنی $\frac{7}{8}$ را به توان ۲ رسانده یعنی

$$\frac{7}{8} = \frac{49}{64} \text{ و آن را به طرفین تساوی اضافه می‌کنیم.}$$

گزینه

۴۶

$$2x^2 + 3x = 5 \xrightarrow{+2} x^2 + \frac{3}{2}x = \frac{5}{2}$$

$$\xrightarrow{\text{اضافه کردن مربع نصف ضریب } x \text{ به طرفین تساوی}} x^2 + \frac{3}{2}x + (\frac{3}{4})^2 = \frac{5}{2} + (\frac{3}{4})^2$$

$$\xrightarrow{\text{اتحاد مربع دو جمله‌ای}} (x + \frac{3}{4})^2 = \frac{5}{2} + \frac{9}{16} = \frac{49}{16}$$

$$\downarrow \quad \downarrow$$

$$\Rightarrow \frac{k}{a} = \frac{\frac{49}{16}}{\frac{3}{4}} = \frac{49}{16} \times \frac{4}{3} = \frac{49}{12}$$

گزینه

۴۷

$$9x^2 + ax - 2 = 0 \xrightarrow{\text{بردن عدد ثابت}} 9x^2 + ax = 2$$

$$\xrightarrow{+9} x^2 + \frac{a}{9}x = \frac{2}{9}$$

$$\xrightarrow{\text{اضافه کردن مربع نصف ضریب } x \text{ به طرفین تساوی}} x^2 + \frac{a}{9}x + (\frac{a}{18})^2 = \frac{2}{9} + (\frac{a}{18})^2$$

$$\xrightarrow{\text{اتحاد مربع دو جمله‌ای}} (x + \frac{a}{18})^2 = \frac{2}{9} + \frac{a^2}{18^2}$$

طبق فرض مسئله، در سمت راست از عدد $\frac{1}{4}$ جذر گرفته می‌شود، پس داریم:

$$\frac{2}{9} + \frac{a^2}{18^2} = \frac{1}{4} \Rightarrow \frac{a^2}{18^2} = \frac{1}{4} - \frac{2}{9} = \frac{1}{36} \Rightarrow a^2 = \frac{18 \times 18}{36} = 9$$